



**אשל**  
האגודה לתכנון ולפיתוח  
שירותים למען הזקן בישראל



**משאב**  
מאגר מידע ארצי לתכנון  
בתחום הזיקנה



**ג'וינט-מכון ברוקדייל**  
לגרונטולוגיה  
והתפתחות אדם וחברה

## קשישים בישראל שנתון סטטיסטי 2001

עורכים: ג'ני ברודסקי, יצחק שנור, שמואל באר  
יו"ר ועדת ההיגוי: דרור רותם

**פרק 2: מאפיינים בריאותיים של הקשישים  
ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים**

ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה  
והתפתחות אדם וחברה  
ת"ד 13087  
ירושלים 91130.

דואר אלקטרוני: [brook@jdc.org.il](mailto:brook@jdc.org.il)  
כתובת באינטרנט: [www.jdc.org.il/brookdale](http://www.jdc.org.il/brookdale)

## תוכן עניינים

### מבוא

### ממצאים עיקריים

### הגדרות והסברים

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

לוח 2.2: תוחלת חיים בגיל 65 לפי קבוצת אוכלוסייה ומין

לוח 2.3: תוחלת חיים בגילים נבחרים לפי מין

לוח 2.4: בני +65 העוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.5: בני +65 העוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית, לפי סוג הפעילות, ולפי מין, גיל ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.6: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר מעשנים לפחות סיגרייה אחת ביום, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.7: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות דימות או קיבלו חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.8: נשים בנות +65 ובנות +40 אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה אחרונה, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.9: בני +65 וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלות שונות, לפי מין, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.10: בני +65 שדיווחו על בעיות ראייה, שמיעה ולעיסה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.11: בני +65 שדיווחו על בעיות בשליטה על סוגר השתן, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה -

נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.12: בני +65 בקהילה אשר נפלו במהלך חצי השנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.13: מידת היכולת של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.13ב: מידת היכולת של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.14: בני +65 המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות (ADL) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.15: בני +65 המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות (ADL), 1990-1999 - סוף שנה

לוח 2.16: מידת היכולת של בני +65 ללכת (להסתובב) מחוץ לבית מרחק של 400 מטר, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.17: בני +65 שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וסוג הנפגע, 1999

לוח 2.18: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל ומין, 1999

לוח 2.19: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

לוח 2.20: נהגים בני +65 וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 1999

לוח 2.21: פטירות של בני +65 לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 1999

לוח 2.22: פטירות של יהודים ואחרים בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 1999

לוח 2.23: סיבות פטירה של כלל האוכלוסייה ושל בני +65 לפי מין, 1997

לוח 2.24 א: התפלגות פטירות של גברים בני +65 לפי קבוצת גיל וסיבת פטירה, 1997

לוח 2.24 ב: התפלגות פטירות של נשים בנות +65 לפי קבוצת גיל וסיבת פטירה, 1997

לוח 2.25: בני +65 וכלל האוכלוסייה הממתינים לאשפוז לפי משך ההמתנה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.26: בני+65 אשר אושפזו בשנה האחרונה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.27: אשפוזים במחלקות כלליות של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

לוח 2.28: אשפוזים של בני +65 במחלקות כלליות מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

לוח 2.29: בני +65 מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות

לוח 2.30: התפלגות האשפוזים בקרב בני +65 במחלקות כלליות, לפי מין, 1998

לוח 2.31: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 1998

לוח 2.32: בני +65 וכלל האוכלוסייה המאושפזים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, סוף 1999

לוח 2.33: בני +65 וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, סוף 1999

לוח 2.34: בני +65 המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני +65, והמאושפזים בכלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות - סוף שנה

לוח 2.35: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

לוח 2.36: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 1999

לוח 2.37: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, 1999

לוח 2.38: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה, רופא מומחה או רופא שיניים בשבועיים אחרונים, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.39: ביקורים של בני +65, של בני +75 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא בשנה, לפי גיל, מין והתמחות הרופא, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000


לוח 2.40: ביקורים של בני +65 אצל רופא מתוך סך הביקורים (כלל האוכלוסייה), אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000, לפי התמחות הרופא ומין

לוח 2.41: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +65 בין קופות החולים, לפי גיל

לוח 2.42: בני +65 מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות

לוח 2.43: בעלי ביטוח בריאות משלים בקרב בני +65 ובכלל האוכלוסייה, לפי שנה ומין

## 2. מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



### מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני הבריאות של הקשישים בישראל ועל דפוסי השימוש של הקשישים בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים שונים, ותופעות בריאותיות מסוימות נעשות שכיחות יותר עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא הוא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד ובשמירה על בריאות הקשישים.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות, פוגעת קשות באיכות החיים של הקשיש. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מתייחס למדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, תמותה, מחלות ומוגבלות, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. כן, מובאים נתונים על דפוסי שימוש של קשישים בשירותי בריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

בשנתון זה מובאים מספר לוחות מתוך סקר בריאות שנערך על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000. לוחות אלו מציגים נתונים על משך ההמתנה לאשפוז, על ביצוע בדיקות שונות, על מחלות שאובחנו אצל קשישים וכדומה.

כמו כן, אנו עושים שימוש בנתוני סקר בני 60 ומעלה שנערך ב-1997. עושר הנתונים הקיים במקור זה מאפשר לנו להציג נתונים שבדרך כלל אינם בנמצא. למשל, ניתן לנו להציג בפירוט רחב יותר נתונים דמוגרפיים, לפי קבוצות אוכלוסייה ולפי קבוצות גיל. בנוסף, נתוני הסקר מאפשרים לנו להתייחס לנושאים אשר בדרך כלל אין לנו מקורות מידע עליהם, כגון התנהגות בריאותית ובעיות בריאות שונות.

## ממצאים עיקריים

♦ **תוחלת החיים בלידה** עומדת על 80.4 שנים לנשים ו-76.6 שנים לגברים. תוחלת החיים של היהודים גבוהה מזו של האוכלוסייה הערבית; בשנת 1999 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 2.6 שנים בקרב הנשים, ו-2.1 שנים בקרב הגברים (לוח 2.1).

- **תוחלת החיים בגיל 65** היא 18.6 שנים לנשים ו-16.5 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 84 בממוצע, וגבר - עד גיל 81 (לוח 2.2).

♦ כשליש (36%) מבני +65 **עוסקים בפעילות גופנית** באופן קבוע, גברים יותר מנשים (41% ו-31%, בהתאמה). העיסוק בפעילות גופנית יורד עם עליית הגיל. רק 22% מבני +80 עוסקים בפעילות גופנית לעומת 41% מבני 65-74. אחוז העוסקים בפעילות גופנית נמוך מאוד בקרב האוכלוסייה הערבית: 3% לעומת 38% בקרב היהודים (לוח 2.4).

- **הפעילות הגופנית הנפוצה** בקרב קשישים היא הליכה: כ-24% מכלל הקשישים, וכ-67% מבין הקשישים העוסקים בפעילות גופנית, דיווחו על הליכה באופן קבוע (לוח 2.5)

- ◆ תשעה אחוזים מהקשישים **מעשנים**. אחוז הגברים המעשנים יותר מכפול מאחוז הנשים המעשנות (13% לעומת 5%). אחוז הקשישים המעשנים בקרב בני דתות אחרות גבוה מאשר בקרב הקשישים היהודים (12% לעומת 8%). רק 5% מקרב עולי בריה"מ לשעבר מעשנים (לוח 2.6).
- ◆ עשרים וחמישה מכל 1,000 בני +65 ביצעו **בדיקת MRI** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), לעומת 11 מכל 1,000 בכלל האוכלוסייה. בקרב בני +65, שיעורם של הגברים אשר ביצעו בדיקת MRI גבוה פי 1.5 מאשר בקרב הנשים. בתקופה הנדונה ביצעו 163 מכל 1,000 בני +65 בדיקת CT, לעומת 55 איש מכל 1,000 בכלל האוכלוסייה (לוח 2.7).
- ◆ כ-45% מבני +65 קיבלו **חיסון נגד שפעת** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000). שיעורם של המקבלים חיסון נגד שפעת בקרב בני +65 גבוה פי חמישה מאשר בכלל האוכלוסייה. שיעור המקבלים חיסון בקרב עולי בריה"מ לשעבר הוא כמחצית השיעור בקרב היהודים (23% לעומת 45%, בהתאמה) (לוח 2.7).
- ◆ כ-40% מהקשישים דיווחו **שהרופא אבחן אצלם יתר לחץ-דם**, 16% דיווחו על אבחון **סוכרת** ו-14% - על אבחון של **התקף לב או אוטם שריר הלב**. כעשירית מהנשים דיווחו על אבחון של **התקף לב או אוטם שריר הלב**, לעומת 20% מהגברים (לוח 2.9).
- ◆ קצת למעלה משליש מהקשישים (34%) דיווחו על **בעיות ראייה** (28% מהגברים ו-39% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות ראייה עולה עם הגיל ומגיע ל-47% בקרב בני +80. עשרים ושמונה אחוזים מהקשישים דיווחו על **בעיות שמיעה** (31% מהגברים ו-26% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות שמיעה מגיע ל-48% בקרב בני +80 (לוח 2.10). שבעה עשר אחוזים מהקשישים דיווחו על **בעיות בשליטה על סוגר השתן** (13% מהגברים ו-19% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות בשליטה על סוגר השתן מגיע ל-33% בקרב בני +80 (26% מהגברים ו-39% מהנשים) (לוח 2.11).
- ◆ כחמישית מהקשישים בקהילה **נפלו** במהלך חצי השנה האחרונה. הגברים סובלים פחות מנפילות (14%) לעומת הנשים (24%). אחוז הקשישים שנפלו מגיע ל-31% בקרב בני +80 (לוח 2.12).



♦ בקרב הקשישים בני 65+ הגרים בקהילה (מחוץ למוסדות), 11% אינם יכולים להתרחץ או להתקלח ללא עזרה, 6% זקוקים לעזרה כדי להתלבש ו-3% מהקשישים זקוקים לעזרה באכילה. בנוסף, אחוז הקשישים שדיווחו על קושי לבצע פעולות אלה, למרות שהם יכולים לבצע אותן ללא עזרה, הגיע ל-13% ברחצה, ל-14% בבישה ול-6% באכילה (לוח 2.13).

- כאשר בוחנים את אחוז הקשישים המוגבלים הגרים בקהילה, דהיינו אלה שזקוקים לעזרה באחת מפעולות היומיום לפחות (להתרחץ או להתקלח, להתלבש, לאכול, לשבת ולקום מהכיסא, להיכנס ולצאת מהמיטה, להסתובב בתוך הבית) (ADL = Activities of Daily living), מתברר כי אחוז זה עומד על 12% (9% בקרב הגברים ו-14% בקרב הנשים). אחוז המוגבלים עולה בצורה חדה עם העלייה בגיל: 32% בקרב בני 80+ לעומת 6% בקרב בני 65-74. אחוז הקשישים המוגבלים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה פי שלושה לערך מהאחוז המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית (30% ו-11%, בהתאמה). אחוז גבוה יחסית של מוגבלים נמצא בקרב הקשישים היהודים ילידי אסיה ואפריקה (לוח 2.14).

- בין השנים 1990-1999 גדל מספר הקשישים המוגבלים בארץ ב-52% והגיע לכ-88,000 איש בסוף 1999. עשרים ושניים אחוזים מהקשישים המוגבלים הם דיירי המוסדות לטיפול ממושך ו-78% גרים בקהילה (לוח 2.15).

- בבדיקת יכולת הניידות של הקשישים מחוץ לבית מסתבר, כי קרוב לשלושה רבעים מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים ללכת מחוץ לבית למרחק של 400 מטר, ללא כל סיוע. הקשישים שיש להם קושי בניידות מחוץ לבית מתפלגים באופן הבא: 7% מסוגלים ללכת למרחק של 400 מטר בעזרת מכשיר (מקל או הליכון), 7% זקוקים לעזרתו של אדם אחר או שהם יושבים בכיסא גלגלים ו-12% מרותקים לבית. התמונה המתגלית לפי מאפיינים דמוגרפיים דומה מאוד לזו של הקשישים המוגבלים בפעולות היומיום (לוח 2.16).

♦ בשנת 1999 נפגעו בתאונות דרכים 2,178 קשישים. מתוכם, 5% נהרגו (109 קשישים), 16% נפצעו קשה (358 קשישים) ו-78% נפצעו קל (1,711 קשישים). שלושים ושבעה אחוזים מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 25% נהגו ברכב ו-32% נסעו ברכב. שישים ותשעה אחוזים מבין הקשישים שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (לוח 2.17).

- שיעור הקשישים שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 1999 נמוך מזה שבכלל האוכלוסייה (363 ו-743 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך **שיעור ההרוגים** מתוך הנפגעים גבוה פי 2.2 בקרב הקשישים. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בכלל האוכלוסייה והן בקרב הקשישים (לוח 2.18).

- בין השנים 1985-1997 חלה עלייה בשיעור הקשישים **שנפגעו בתאונות דרכים**, אך בין השנים 1990-1999 חלה ירידה (מ-459 ל-363 ל-100,000 נפש). לעומת זאת, בכלל האוכלוסייה חלה עלייה בשיעור הנפגעים בתאונות דרכים במהלך כל התקופה שבין 1985-1998, וירידה בשנת 1999 (לוח 2.19).

- **שיעור הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בכלל האוכלוסייה בשנת 1999 גבוה ב-56% משיעור הנהגים בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים (לוח 2.20).

◆ ב-1999 עמד **שיעור הפטירה** ל-1,000 בני +65 על 54 בקרב הגברים ועל 45 בקרב הנשים. שיעור הפטירה של הגברים היהודים נמוך מזה של הגברים באוכלוסייה הערבית עד גיל 79, ואילו בקרב בני +80 המצב הפוך. שיעור הפטירה של הנשים היהודיות נמוך מזה של הנשים באוכלוסייה הערבית (לוח 2.21).

- ב-1997 נפטרו 27,995 אנשים בגיל +65, שהם 78% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. **סיבות הפטירה העיקריות** בקרב הקשישים הן: מחלות במערכת הדם והלב (38% מהפטירות בקרב הגברים ו-40% בקרב הנשים, בהשוואה ל-33% בקרב הגברים בכלל האוכלוסייה ו-35% בקרב הנשים בכלל האוכלוסייה); וכן, שאתות ממאירות (23% מהפטירות בקרב הגברים ו-20% מהפטירות בקרב הנשים). בקרב הגברים, אין הבדל בין הקשישים לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתוך סך הפטירות; ובקרב הנשים השיעור בכלל האוכלוסייה (23.5%) גבוה מזה שבקרב הנשים הקשישות (לוחות 2.23; 2.24; א; ב).

- עם העלייה בגיל, עולה חלקן היחסי של מחלות לב וכלי דם בין סיבות פטירה (מ-36% בקרב גברים בני 65-74 ל-40% בקרב גברים בני +85; מ-32% בקרב נשים בנות 65-74 ל-45% בקרב בנות +85), ויורד חלקן היחסי של השאתות הממאירות (מ-29% בקרב גברים בני 65-74 ל-16% בקרב גברים בני +85; ומ-31% בקרב נשים בנות 65-74 ל-12% בקרב נשים בנות +85) (לוחות 2.24 ו-2.24ב).

- ◆ לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000, **המתינו** 16,700 בני 65+ **לאשפוז** במהלך השנה האחרונה, והם מהווים 3% מבני 65+, לעומת 0.1% שהמתינו לאשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. מכלל הקשישים הממתינים לאשפוז, 40% ממתינים לאשפוז שלושה חודשים ויותר (6,600 איש) (לוח 2.25).
- ◆ עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים דיווחו על **אשפוז** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), 26% בקרב הגברים ו-22% בקרב הנשים. בקרב היהודים אושפזו 23%, לעומת 30% בקרב הלא-יהודים. מבין היהודים, שיעור האשפוז הנמוך ביותר הוא של ילידי ישראל (18%) והגבוה ביותר הוא של ילידי אפריקה (27%) (לוח 2.26).
- ◆ **שיעורי האשפוז של הקשישים במחלקות האשפוז הכלליות** גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. בשנת 1998 נרשמו 560 אשפוזים ל-1,000 קשישים במחלקות האשפוז הכלליות, בהשוואה ל-156 ל-1,000 בכלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-451 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-874 בגיל 85+). שיעור האשפוז הכללי נמצא במגמת עלייה, הן בכלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב הקשישים (לוח 2.27).
- בבחינת **חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים** נמצא, כי בשנת 1998, כשליש (35%) מהאשפוזים היו של בני 65+ (וזאת בהשוואה להיותם פחות מ-10% מכלל האוכלוסייה), ו-19% מהאשפוזים היו של בני 75+ (וזאת בהשוואה להיותם כ-4% מכלל האוכלוסייה). שיעור הקשישים מכלל האשפוזים נמצא במגמת עלייה (לוח 2.28). חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים במחלקות הפנימיות גבוה במיוחד והגיע ל-60% בשנת 1998 (לוח 2.29).
- התפלגות **האשפוזים של הקשישים במחלקות האשפוז** מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר, ומהווה קצת מעל מחצית האשפוזים (לוח 2.30).
- **השהייה הממוצעת** של הקשישים גבוהה מזו של כלל האוכלוסייה, גם בקרב הגברים וגם בקרב הנשים. בחינת השהייה הממוצעת במחלקות השונות, מצביעה על שהות ממוצעת גבוהה יחסית במחלקות גריאטריה אקוטית ונוירוכירורגיה (לוח 2.31).

- ◆ ב-1999 היו 77 קשישים **באשפוז יום פסיכיאטרי**, והם היוו 6% מסך השוהים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 79% מכלל הקשישים השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.32).
- ◆ בסוף 1999 היו 1,177 קשישים מאושפזים **באשפוז פסיכיאטרי**, שיעור של שני מאושפזים ל-1,000 נפש. זאת, בהשוואה למאושפז אחד ל-1,000 נפש בקרב כלל האוכלוסייה. עשרים אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.33).
- במהלך 1999 היו 1,814 **קבלות לאשפוז פסיכיאטרי** של בני 65+, ואלה היוו 10% מסך הקבלות לאשפוז. כשני שלישים מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (לוח 2.35). שלוש האבחנות **השכיחות** לקבלה לאשפוז (90% מהקבלות) היו: הפרעות אפקטיביות, סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות והפרעות אורגניות (לוח 2.36).
- שנים עשר אחוזים מכלל **הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי** בשנת 1999 היו של בני 65+ (מרביתם בני 65-74, ורק מיעוטם בני 85+) (לוח 2.37).
- ◆ כמעט 40% מהקשישים **ביקרו אצל רופא** לפחות פעם אחת בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), אחוז כפול מהאחוז בכלל האוכלוסייה. אצל רופא משפחה ביקרו 32% ואצל רופא מומחה כ-10% (לוח 2.38).
- ◆ קשיש **מבקר אצל רופא** בממוצע כ-15 פעמים בשנה, מתוכן 11.5 פעמים אצל רופא משפחה ו-3.6 פעמים אצל רופא מומחה. ממוצע ביקורים אצל רופא בשנה בכלל האוכלוסייה הוא כשבעה ביקורים (לוח 2.39).
- ממוצע **הביקורים לנפש של קשישים אצל רופא שיניים** בשנה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000) היה 2.5, ובקרב בני 75+ היה ממוצע הביקורים לנפש נמוך יותר (2.0) (לוח 2.39).

- הקשישים אחראים ל-22% מתוך סך הביקורים אצל רופא משפחה, ל-19% מסך הביקורים אצל רופא מומחה ול-9% מסך הביקורים אצל רופא שיניים. חלקן של הנשים הקשישות מתוך סך הביקורים אצל רופא משפחה הוא 13%, לעומת 9% בקרב הגברים הקשישים (לוח 2.40).

♦ בנובמבר שנת 2000, היו 74% מהקשישים **מבוטחים** בשירותי בריאות כללית (בהשוואה ל-56% מכלל האוכלוסייה), 13% במכבי שירותי בריאות (בהשוואה ל-23% מכלל האוכלוסייה), 7% בקופת חולים לאומית ו-5% בקופת חולים מאוחדת (בהשוואה ל-10% מכלל האוכלוסייה בכל אחת מקופות אלו) (לוח 2.41). שלושה עשר אחוזים מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם קשישים, בהשוואה ל-8% במכבי, 5% בלאומית ו-6% במאוחדת (לוח 2.42).

♦ ב-1999 היה ל-34% מהקשישים **ביטוח בריאות משלים**, לעומת 51% בכלל האוכלוסייה. בקרב הקשישים, אחוז הגברים בעלי ביטוח בריאות משלים גבוה יותר מאחוז הנשים (37% ו-32%, בהתאמה), ואילו בכלל האוכלוסייה אין הבדל משמעותי בין גברים לנשים. בהשוואה לשנת 1997, חלה עלייה באחוז הקשישים בעלי ביטוח משלים, אך עיקר העלייה חלה בקרב הגברים, בעוד שבקרב הנשים לא היה שינוי משמעותי (לוח 2.43).

## הגדרות והסברים

**קבוצות אוכלוסייה ודת:** החל משנת 1999, שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם (כגון סקר בריאות), הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד, וקבוצת "בני דתות אחרות" הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים, ואנשים ללא סיווג דת. יש לציין כי סקר בני 60 ומעלה נערך בשנת 1997 על-פי ההגדרה החדשה.

**תמותה:** הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תושבים ישראליים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

**תוחלת החיים** בגיל מסוים היא מספר שנות החיים הממוצע הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל ומחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

**אשפוז במחלקות כלליות:** הנתונים מתייחסים לאשפוז במחלקות כלליות בבתי החולים הכלליים בלבד, כפי שמפורט בלוחות. הנתונים אינם כוללים אשפוז במחלקות יולדות ופסיכיאטריה. הנתונים כוללים אשפוזים במסגרת מחלקות האשפוז בלבד ואינם כוללים מחלקות לאשפוז יום.

מספר האשפוזים **במחלקה** מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת **סך-כל המחלקות הכלליות** אינו כולל העברות.

**ימי אשפוז** הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך מחושב יום אחד).

**שהייה ממוצעת** היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

### **אשפוז פסיכיאטרי**

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות.

**קבלות ראשונות לאשפוז:** אנשים שהתקבלו לראשונה בחייהם לבית חולים פסיכיאטרי.

**סך-כל הקבלות לאשפוז** כוללות קבלות ראשונות, וכן קבלות חוזרות. הקבלות לאשפוז אינן כוללות קבלות לטיפול יום.

### **נתונים מסקר בריאות**

**אשפוז:** אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוזים במחלקות יום בבתי חולים.

**רופא משפחה:** רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים.

**רופא שיניים:** רופא שיניים ומרפא שיניים, אורטודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

**ביקור אצל רופא:** ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים, במרפאת חוץ של בית חולים, בתחנת "מגן דוד אדום", בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית בביתו של הרופא וביקור בבית החולה. לא נכללו התייעצויות בטלפון או ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

**מבקר:** אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

**חולה במחלות כרוניות:** אדם המדווח שהמחלה הכרונית אובחנה אצלו אי-פעם על-ידי רופא.

### **סימנים מיוחדים**

ריק = נתונים שאין להם משמעות בגלל מבנה הלוח  
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40%  
 .. = נתונים בלתי-ידועים או נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-40%

### **הערה**

סיכום הנתונים המופיעים בלוחות שונים אינו זהה בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול הנתונים.

**מקורות**

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; משרד הבריאות; המוסד לביטוח לאומי וג'וינט-מכון ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.



לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
..	..	73.2	70.5	..	..	1965
..	..	73.3	69.8	..	..	1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.2	75.1	80.3	76.6	80.0	76.3	1996
76.8	74.3	80.6	76.4	80.1	76.0	1997
76.8	74.4	80.7	76.4	80.3	76.1	1998
<b>78.1</b>	<b>74.9</b>	<b>80.7</b>	<b>77.0</b>	<b>80.4</b>	<b>76.6</b>	<b>1999</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, שנים נבחרות

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

**לוח 2.2: תוחלת חיים בגיל 65 לפי קבוצת אוכלוסייה ומין**

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.7	15.3	14.8	13.7	14.9	13.8	1974-1970
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
16.4	16.0	17.9	15.8	17.9	15.8	1995-1991
16.8	16.1	18.1	16.0	18.0	16.0	1996-1992
17.0	16.4	18.3	16.2	18.2	16.2	1997-1993
17.0	16.4	18.5	16.3	18.4	16.3	1998-1994
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
<b>16.6</b>	<b>16.6</b>	<b>18.7</b>	<b>16.5</b>	<b>18.6</b>	<b>16.5</b>	<b>1999-1996</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, שנים נבחרות

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.3: תוחלת חיים בגילים נבחרים לפי מין

בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
5.8	5.5	8.0	7.3	10.8	9.7	1995-1991
5.8	5.5	8.0	7.4	10.8	9.8	1996-1992
5.9	5.5	8.2	7.4	11.0	9.9	1997-1993
5.9	5.5	8.2	7.4	11.1	10.0	1998-1994
<b>5.8</b>	<b>5.6</b>	<b>8.2</b>	<b>7.6</b>	<b>11.2</b>	<b>10.2</b>	<b>1999-1996</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, שנים נבחרות

לוח 2.4: בני +65 העוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

סה"כ	גברים	נשים	
35.6	41.0	31.4	כלל בני +65
			גיל
40.6	47.3	35.5	בני 65-74
33.6	35.7	31.9	בני 75-79
21.9	26.5	18.6	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
37.6	43.5	33.2	יהודים ואחרים*
37.3	48.9	29.9	מזה: עולי בריה"מ לשעבר**
3.0	(5.3)	..	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים*
48.0	45.1	50.2	ישראל
24.5	30.3	19.6	אסיה-אפריקה
42.1	49.4	36.8	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  
\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.5: בני 65+ העוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית, לפי סוג הפעילות, ולפי מין, גיל ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997**

שחייה		התעמלות או ריקוד				הליכה		
מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	
<b>15.2</b>	<b>5.4</b>	<b>8.0</b>	<b>2.8</b>	<b>45.2</b>	<b>16.0</b>	<b>66.5</b>	<b>23.6</b>	<b>כלל בני 65+</b>
16.1	6.6	11.7	4.8	34.0	13.8	73.4	30.0	<b>מין</b>
14.3	4.4	4.3	1.3	56.3	17.6	59.6	18.7	גברים
								נשים
18.1	7.3	8.7	3.5	45.0	18.2	67.8	27.5	<b>גיל</b>
9.6	3.2	7.1	2.4	39.3	12.9	68.9	23.1	בני 74-65
(7.3)	(1.6)	(5.1)	(1.1)	55.3	12.1	55.3	12.0	בני 79-65
								בני 80+
<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים*</b>								
26.0	12.5	(12.3)	(5.9)	52.7	25.0	59.7	28.7	ישראל
11.2	2.7	10.7	2.6	50.3	12.3	61.0	14.9	אסיה-אפריקה
14.8	6.2	6.7	2.8	43.1	18.0	68.7	28.8	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.6: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר מעשנים לפחות סיגרייה אחת ביום, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (אחוזים)

המעשנים	
24.1	כלל האוכלוסייה
<b>8.6</b>	<b>כלל בני +65</b>
	<b>מין</b>
13.1	גברים
5.2	נשים
	<b>גיל</b>
11.1	בני 65-74
4.9	בני 75+
	<b>קבוצת אוכלוסייה</b>
8.4	יהודים
11.6	בני דתות אחרות
	<b>יבשת לידה של יהודים</b>
14.1	ישראל
12.8	אסיה
8.4	אפריקה
7.5	אירופה-אמריקה
4.6	בריה"מ לשעבר*

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

\* שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.7: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות דימות או קיבלו חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ובשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (שיעורים ל-1,000 נפש)

חיסון נגד שפעת	CT	MRI	
90	55	11	כלל האוכלוסייה
<b>447</b>	<b>163</b>	<b>25</b>	<b>כלל בני +65</b>
			<b>מין</b>
473	173	31	גברים
427	155	19	נשים
			<b>גיל</b>
414	153	22	בני 65-74
496	177	28	בני +75
			<b>קבוצות אוכלוסייה</b>
452	162	25	יהודים
372	178	..	בני דתות אחרות
			<b>יבשת לידה של יהודים</b>
515	163	..	ישראל
444	157	(26)	אסיה
487	116	30	אפריקה
533	183	(30)	אירופה-אמריקה
230	149	(16)	בריה"מ לשעבר*

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

\* שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.8: נשים בנות +65 ובנות +40 אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה אחרונה, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (שיעורים ל-1,000 נפש)

שיעורים ל-1,000 נפש	
305	בנות +40
298	בנות +65
	גיל
382	בנות 65-74
172	בנות +75
	קבוצת אוכלוסייה
309	יהודיות
156	בנות דתות אחרות
	יבשת לידה של יהודיות
468	ישראל
255	אסיה
230	אפריקה
361	אירופה-אמריקה
222	בריה"מ לשעבר*

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

\* שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודיות



לוח 2.9: בני +65 וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלות שונות, לפי מין, אוקטובר 1999 – ספטמבר 2000 (שיעורים ל-1,000 נפש)

נשים	גברים	סה"כ	
<b>בני +65</b>			
448	369	414	יתר-לחץ דם
97	206	144	התקף לב, אוטם שריר הלב
39	54	45	שבץ מוח
160	159	159	סוכרת
58	46	53	אסטמה
52	42	48	מחלת ריאה
96	104	99	כיב במערכת העיכול
55	52	54	מחלה ממארת (סרטן)
<b>כלל האוכלוסייה</b>			
100	78	89	יתר-לחץ דם
15	32	23	התקף לב, אוטם שריר הלב
6	7	6	שבץ מוח
37	32	34	סוכרת
33	39	36	אסטמה
15	12	14	מחלת ריאה
27	30	28	כיב במערכת העיכול
14	7	11	מחלה ממארת (סרטן)

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

לוח 2.10: בני +65 שדיווחו על בעיות ראייה, שמיעה ולעיסה\* (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

בעיות ראייה	בעיות שמיעה	בעיות לעיסה	
34.3	27.9	31.4	<b>כלל בני +65</b>
			<b>מין</b>
27.6	31.1	28.7	גברים
39.3	25.5	33.3	נשים
			<b>גיל</b>
29.6	21.7	29.1	בני 65-74
35.5	27.7	32.8	בני 75-79
47.4	47.5	36.7	בני 80+
			<b>קבוצת אוכלוסייה</b>
33.5	28.0	30.5	יהודים ואחרים**
39.0	32.4	34.8	מזה: עולי בריה"מ לשעבר***
44.4	18.7	45.0	אוכלוסייה ערבית
			<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים**</b>
21.3	17.7	17.1	ישראל
42.0	30.1	42.0	אסיה-אפריקה
31.5	29.1	27.1	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

- \* בעיות ראייה: קשיים בראייה מרחוק ו/או מקרוב (גם כאשר מרכיבים משקפיים)  
 בעיות שמיעה: קשיים בשמיעה (גם כאשר משתמשים במכשיר שמיעה)  
 בעיות לעיסה: קשיים באכילה עם שיניים תותבות או בעיות בלעיסה למי שאין להם שיניים תותבות
- \*\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
- \*\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.11: בני 65+ שדיווחו על בעיות בשליטה על סוגר השתן\*, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

נשים	גברים	סה"כ	
19.3	12.7	16.5	כלל בני 65+
			גיל
12.8	8.1	10.8	בני 65-74
19.6	14.2	17.2	בני 75-79
39.1	25.8	33.4	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
19.7	12.6	16.6	יהודים ואחרים**
20.2	12.7	17.2	מזה: עולי בריה"מ לשעבר***
13.9	12.6	13.3	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים**
9.5	6.5	8.2	ישראל
24.4	17.4	21.2	אסיה-אפריקה
18.9	11.3	15.7	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

\* קורה שיש להם בריחת שתן או שאינם מספיקים להגיע לשירותים  
 \*\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  
 \*\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.12: בני +65 בקהילה אשר נפלו במהלך חצי השנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

נשים	גברים	סה"כ	
23.9	14.0	19.6	כלל בני +65
			גיל
19.8	9.0	15.1	בני 65-74
26.5	15.6	21.7	בני 75-79
33.7	27.9	31.2	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
24.4	14.3	20.1	יהודים ואחרים*
23.4	10.3	18.3	מזה: עולי בריה"מ לשעבר**
15.0	8.1	11.8	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים*
18.9	12.8	16.2	ישראל
30.6	19.6	25.6	אסיה-אפריקה
22.5	12.1	18.2	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  
\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.13 א: מידת היכולת של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

סה"כ	להתלבש			להתקלח או להתרחץ			לאכול		סה"כ
	יכול ללא קושי	יכול אך קשה	לא יכול	יכול ללא קושי	יכול אך קשה	לא יכול	יכול אך קשה	לא יכול	
<b>סה"כ בני +65</b>	<b>80.0</b>	<b>13.8</b>	<b>6.2</b>	<b>76.1</b>	<b>13.3</b>	<b>10.6</b>	<b>92.0</b>	<b>5.5</b>	<b>2.5</b>
<b>מין</b>									
גברים	82.8	11.6	5.6	81.1	11.1	7.8	94.0	4.1	1.9
נשים	77.8	15.5	6.6	72.3	14.9	12.8	90.5	6.6	2.9
<b>גיל</b>									
בני 74-65	87.2	9.6	3.2	85.0	10.1	4.8	95.5	2.9	1.7
בני 79-75	80.0	14.0	6.0	76.7	14.0	9.3	93.3	4.8	1.9
בני 80+	57.8	26.5	15.7	48.0	22.3	29.7	80.0	14.2	5.7
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>									
יהודים ואחרים* מזה: עולי בריה"מ	81.2	13.6	5.2	77.3	13.0	9.8	93.1	5.1	1.8
לשעבר** אוכלוסייה ערבית	81.1	13.7	5.2	73.9	13.3	12.8	92.5	5.1	2.4
	60.5	17.1	22.4	57.7	18.3	24.0	74.6	12.3	13.1
<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים*</b>									
ישראל-אסיה	90.7	(6.9)	..	91.1	(5.9)	(3.1)	97.1	..	..
אפריקה-אירופה	73.7	17.7	8.6	70.5	16.7	12.8	90.1	7.1	2.8
אמריקה	83.4	12.7	4.0	78.6	12.2	9.2	93.9	4.5	1.5

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  
\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.13: מידת היכולת של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997**

סה"כ	להיכנס למיטה ולצאת ממנה			להתיישב על כיסא ולקום ממנו			לנוע (להסתובב) בתוך הבית	
	יכול ללא קושי	יכול אך קשה	לא יכול	יכול ללא קושי	יכול אך קשה	לא יכול	יכול*	לא יכול
<b>סה"כ בני +65</b>	<b>81.9</b>	<b>14.4</b>	<b>3.7</b>	<b>81.7</b>	<b>14.6</b>	<b>3.8</b>	<b>95.8</b>	<b>4.2</b>
<b>מין</b>								
גברים	86.4	10.5	3.2	86.1	10.8	3.1	96.1	3.9
נשים	78.5	17.5	4.0	78.3	17.5	4.3	95.5	4.5
<b>גיל</b>								
בני 65-74	88.1	9.7	2.1	88.6	9.2	2.2	97.8	2.2
בני 75-79	82.6	14.9	2.5	80.1	17.0	2.9	96.0	4.0
בני 80+	61.9	28.4	9.7	62.0	28.6	9.4	89.2	10.8
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>								
יהודים ואחרים**	82.7	14.4	2.8	82.6	14.6	2.8	96.8	3.2
מוזה: עולי בריה"מ לשעבר***	80.1	17.1	2.8	83.1	13.3	3.6	95.9	4.1
אוכלוסייה ערבית	68.3	14.4	17.2	67.4	13.8	18.8	79.6	20.4
<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים**</b>								
ישראל-אסיה-	91.0	8.2	..	91.2	8.1	..	99.0	..
אפריקה-אירופה-	75.9	19.1	5.0	75.7	19.7	4.6	95.2	4.8
אמריקה	84.7	13.2	2.1	84.5	13.2	2.3	97.2	2.8

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

\* עם או בלי מכשיר (כגון מקל או הליכון)  
 \*\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  
 \*\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.14: בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות (ADL) \* (אחוזים) – נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

סה"כ	גברים	נשים	
11.7	9.0	13.8	כלל בני 65+
			גיל
5.5	4.0	6.7	בני 65-74
10.3	9.1	11.3	בני 75-79
32.2	24.7	37.7	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
10.5	8.2	12.3	יהודים ואחרים**
13.4	8.5	16.4	מזה: עולי בריה"מ לשעבר***
30.3	20.5	38.9	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים**
(3.1)	..	..	ישראל
14.1	11.5	16.2	אסיה-אפריקה
9.9	7.3	11.7	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

- \* זקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, ניידות בתוך הבית בשנתון הקודם (2000) התייחסו הנתונים לשלוש פעולות בלבד: רחצה, הלבשה ואכילה
- \*\* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
- \*\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.15: בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות (ADL), 1990-1999 - סוף שנה

אחוז המוגבלים מתוך בני 65+	אחוזים	אלפים	
			<b>1990</b>
<b>13.2</b>	<b>100.0</b>	<b>58.3</b>	<b>סה"כ מוגבלים</b>
	80.1	46.7	בקהילה*
	19.9	11.6	במוסדות לטיפול ממושך**
			<b>1999</b>
<b>14.5</b>	<b>100.0</b>	<b>88.4</b>	<b>סה"כ מוגבלים</b>
	78.1	69.0	בקהילה*
	21.9	19.4	במוסדות לטיפול ממושך**
<b>10</b>		<b>52</b>	<b>אחוז הגידול בסה"כ מוגבלים 1999-1990</b>

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997; "משאב", מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך, 1999

- \* זקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, ניידות בתוך הבית
- \*\* דיירים תשושים, סיעודיים ותשושי נפש



לוח 2.16: מידת היכולת של בני +65 ללכת (להסתובב) מחוץ לבית מרחק של 400 מטר, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

מסוגל בעזרת אדם אחר או יושב בכיסא גלגלים	מסוגל בעזרת מכשיר (מקל, הליכון)	מסוגל ללא עזרת אדם או מכשיר	סה"כ		
12.4	7.4	7.2	73.0	100.0	<b>סה"כ בני +65</b>
					<b>מין</b>
9.2	5.2	7.3	78.3	100.0	גברים
14.9	9.0	7.1	68.9	100.0	נשים
					<b>גיל</b>
7.3	4.7	4.1	83.9	100.0	בני 65-74
12.9	7.9	9.5	69.7	100.0	בני 75-79
27.8	15.0	14.5	42.6	100.0	בני 80+
					<b>קבוצת אוכלוסייה</b>
11.7	6.9	6.7	74.6	100.0	יהודים ואחרים* מזה: עולי בריה"מ לשעבר**
10.9	9.7	6.7	72.7	100.0	אוכלוסייה ערבית
23.6	15.0	14.4	47.0	100.0	
					<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים*</b>
7.1	..	(3.2)	87.2	100.0	ישראל
18.0	7.0	8.3	66.8	100.0	אסיה-אפריקה
9.6	7.4	6.5	76.5	100.0	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  
\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.17: בני +65 שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וסוג הנפגע, 1999 (מספרים מוחלטים)

פצועים קל	פצועים קשה	הרוגים	סה"כ	
				<b>בני +65</b>
<b>1,711</b>	<b>358</b>	<b>109</b>	<b>2,178</b>	<b>סה"כ</b>
948	185	63	1,196	גברים
763	173	46	982	נשים
				<b>בני 65-74</b>
1,136	180	46	1,362	סה"כ
632	101	22	755	גברים
504	79	24	607	נשים
				<b>בני +75</b>
575	178	63	816	סה"כ
316	84	41	441	גברים
259	94	22	375	נשים
				<b>בני +65 לפי סוג הנפגע</b>
511	225	75	811	הולך רגל
505	43	6	554	נהג רכב
622	64	21	707	נוסע רכב
73	26	7	106	אחר

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים 1999, חלק א': סיכומים כלליים

לוח 2.18: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל ומין, 1999 (שיעורים ל-100,000 נפש)

פצועים קל	פצועים קשה	הרוגים	סה"כ	
<b>כלל האוכלוסייה</b>				
684	51	8	743	<b>סה"כ</b>
865	69	11	944	גברים
508	34	5	547	נשים
<b>בני +65</b>				
285	60	18	363	<b>סה"כ</b>
370	72	25	467	גברים
221	50	13	285	נשים
<b>בני 65-74</b>				
332	53	13	398	<b>סה"כ</b>
424	68	15	506	גברים
261	41	12	315	נשים
<b>בני +75</b>				
222	69	24	316	<b>סה"כ</b>
296	79	38	413	גברים
171	62	15	247	נשים

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים 1999, חלק א': סיכומים כלליים למ"ס, אוכלוסייה, תנועות דמוגרפיות ומשקי בית, 1999

לוח 2.19: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות  
(שיעורים ל-100,000 נפש)

מזה: הרוגים		סה"כ נפגעים		
בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה	
24	9	378	442	1985
23	9	459	594	1990
23	9	408	818	1996
21	9	385	814	1997
21	9	379	826	1998
<b>18</b>	<b>8</b>	<b>363</b>	<b>743</b>	<b>1999</b>

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב, בריאות בישראל, נתונים נבחרים  
למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים (שנים נבחרות) חלק א': סיכומים כלליים

לוח 2.20: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 1999

תאונות				
קלות	קשות	קטלניות	סה"כ	
<b>1,412</b>	<b>146</b>	<b>33</b>	<b>1,591</b>	<b>מספרים מוחלטים סה"כ בני 65+</b>
				<b>גיל</b>
1,035	95	22	1,152	בני 65-74
377	51	11	439	בני 75+
				<b>מין</b>
1,205	122	27	1,354	גברים
207	24	6	237	נשים
				<b>שיעורים ל-10,000 נהגים*</b>
<b>152</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>169</b>	<b>כלל הנהגים**</b>
188	20	4	212	גברים
87	5	1	93	נשים
				<b>בני 65+</b>
<b>96</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>108</b>	<b>סה"כ</b>
110	11	2	123	גברים
63	7	2	72	נשים

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים 1999, חלק א': סיכומים כלליים, פרסום מספר 1139; למ"ס, מצבת הנהגים בישראל 1998, לקט ממצאים סטטיסטיים מספר 3, 1999; למ"ס, מצבת הנהגים בישראל 1999, לקט ממצאים סטטיסטיים מספר 7, 2000

\* ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 1998 ובסוף 1999  
\*\* כולל מין לא ידוע

לוח 2.21: פטירות של בני 65+ לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 1999  
(שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה)

קבוצת גיל	סה"כ		יהודים ואחרים*		אוכלוסייה ערבית	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
<b>בני 65+</b>						
שיעורים גולמיים	54.2	44.9	54.2	44.8	54.4	46.1
שיעורים מתוקננים**	56.0	43.7	55.9	43.1	57.4	53.8
בני 65-69	21.8	13.4	21.4	12.9	26.4	20.4
בני 70-74	34.5	22.9	34.2	22.2	39.1	34.5
בני 75-79	52.1	39.0	51.7	38.5	59.8	49.5
בני 80-84	89.4	76.6	90.1	76.4	77.0	82.2
בני 85+	178.6	155.8	179.5	155.1	165.2	174.4

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, 2001 ועיבוד מיוחד מבוסס על נתוני הלמ"ס

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  
\*\* אוכלוסיית התקן היא סך כל האוכלוסייה הממוצעת (גברים ונשים) בשנת 1999, לפי קבוצת גיל

לוח 2.22: פטירות של יהודים ואחרים\* בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 1999  
(שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה)

	בני 75+	בני 74-65	בני 65+	
<b>גברים</b>				
סה"כ**	91	27	54	
אסיה	93	28	52	
אפריקה	99	32	53	
אירופה-אמריקה	91	27	58	
מזה: עולי בריה"מ לשעבר***	88	31	50	
<b>נשים</b>				
סה"כ**	78	18	44	
אסיה	77	17	39	
אפריקה	88	22	44	
אירופה-אמריקה	78	17	48	
מזה: עולי בריה"מ לשעבר***	75	19	43	

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, 2001; למ"ס, אוכלוסייה, תנועות דמוגרפיות ומשקי בית, 1999

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  
\*\* כולל ילידי ישראל ויבשת לידה לא ידועה  
\*\*\* שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.23: סיבות פטירה של כלל האוכלוסייה ושל בני 65+ לפי מין, 1997  
(שיעורים ל-100,000 נפש)

בני 65+		כלל האוכלוסייה		סה"כ
נשים	גברים	נשים	גברים	
4,400	5,483	596	644	
92	101	12	12	מחלות זיהומיות
880	1,260	140	145	שאתות ממאירות
334	370	42	38	סוכרת
117	93	14	9	יתר לחץ-דם
290	368	35	39	אוטם חריף של שריר הלב
564	740	66	74	מחלת לב איסכמית אחרת
309	341	39	37	מחלות לב אחרות
432	497	51	48	מחלות של כלי דם במוח
44	63	5	6	מחלות אחרות של מחזור הדם
128	161	15	16	דלקת ריאות
31	42	4	4	דלקת סמפונות, נפחת וגנחת
21	36	3	5	מחלות כבד
112	177	14	17	מחלות כליה
				סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
252	304	38	56	
694	768	98	93	כל המחלות האחרות*
13	29	5	14	תאונות של רכב ממונע
11	31	3	10	התאבדות
70	102	12	21	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד מבוסס על נתוני למ"ס משנתון סטטיסטי 1999

\* כולל: מומים מולדים וסיבות מסב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בני 65+



לוח 2.24: התפלגות פטירות של גברים בני +65 לפי קבוצת גיל וסיבת פטירה, 1997

קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה	סה"כ פטירות במספרים מוחלטים
בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+		
3,968	5,406	4,160	13,534	18,510	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
2.2	1.8	1.5	1.8	1.9	מחלות זיהומיות
16.3	23.0	29.3	23.0	22.5	שאתות ממאירות
5.5	7.2	7.4	6.7	5.9	סוכרת
1.8	1.9	1.3	1.7	1.4	יתר לחץ-דם
5.9	7.1	7.0	6.7	6.1	אוטם חריף של שריר הלב
14.7	13.6	12.2	13.5	11.5	מחלת לב איסכמית אחרת
7.1	6.3	5.3	6.2	5.7	מחלות לב אחרות
9.3	9.3	8.6	9.1	7.5	מחלות של כלי דם במוח
1.1	1.1	1.3	1.2	0.9	מחלות אחרות של מחזור הדם
5.0	2.6	1.4	2.9	2.5	דלקת ריאות
0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	דלקת סמפונות נפחת וגנחת
0.4	0.6	1.0	0.7	0.8	מחלות כבד
4.1	3.1	2.5	3.2	2.6	מחלות כליה
4.6	5.3	6.7	5.5	8.7	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
19.0	13.2	10.3	14.0	14.4	כל המחלות האחרות*
0.2	0.6	0.8	0.5	2.2	תאונות של רכב ממונע
0.3	0.6	0.8	0.0	1.6	התאבדות
1.9	1.7	1.9	1.9	3.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד מבוסס על נתוני למ"ס משנתון סטטיסטי 1999

\* כולל מומים מולדים וסיבות מסב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בני +65

לוח 2.24: התפלגות פטירות של נשים בנות +65 לפי קבוצת גיל וסיבת פטירה, 1997

קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה	סיבת פטירה
בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+		
5,076	5,725	3,660	14,461	17,596	סה"כ פטירות במספרים מוחלטים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
2.4	2.0	1.8	2.1	2.0	מחלות זיהומיות
11.5	20.4	31.2	20.0	23.5	שאתות ממאירות
5.9	7.4	10.3	7.6	7.0	סוכרת
3.2	2.8	1.6	2.7	2.3	יתר לחץ-דם
6.0	7.2	6.6	6.6	5.9	אוטם חריף של שריר הלב
14.8	13.0	9.7	12.8	11.1	מחלת לב איסכמית אחרת
8.6	6.9	5.0	7.0	6.5	מחלות לב אחרות
10.9	10.0	8.1	9.8	8.6	מחלות של כלי דם במוח
1.1	0.9	1.0	1.0	0.8	מחלות אחרות של מחזור הדם
4.6	2.4	1.4	2.9	2.5	דלקת ריאות
0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	דלקת סמפונות נפחת וגנחת
0.2	0.4	0.9	0.5	0.5	מחלות כבד
3.4	2.3	1.7	2.5	2.3	מחלות כליה
5.7	5.6	6.0	5.7	6.4	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
18.7	15.7	11.8	15.8	16.4	כל המחלות האחרות*
0.0	0.3	0.6	0.3	0.8	תאונות של רכב ממונע
0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	התאבדות
2.1	1.5	1.2	1.6	2.0	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד מבוסס על נתוני למ"ס משנתון סטטיסטי 1999

\* כולל מומים מולדים וסיבות מסב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בנות +65

לוח 2.25: בני +65 וכלל האוכלוסייה הממתינים לאשפוז לפי משך ההמתנה,  
אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

3 חודשים ויותר	2-1 חודשים	עד חודש	סה"כ	
19.8	10.7	18.2	50.0	<b>אלפים</b>
<b>6.6</b>	<b>(2.6)</b>	<b>7.1</b>	<b>16.7</b>	כלל האוכלוסייה
				<b>כלל בני +65</b>
3	2	3	9	<b>שיעורים ל-1,000 נפש</b>
<b>11</b>	<b>(5)</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	כלל האוכלוסייה
				<b>כלל בני +65</b>

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

לוח 2.26: בני+65 אשר אושפזו בשנה האחרונה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה  
ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (אחוזים)

סה"כ	גברים	נשים	
23.7	25.7	22.1	<b>כלל בני +65</b>
			<b>גיל</b>
21.0	23.9	18.8	בני 65-74
27.0	28.5	27.2	בני 75+
			<b>קבוצת אוכלוסייה</b>
23.2	25.1	21.8	יהודים
29.8	33.7	27.1	בני דתות אחרות
			<b>יבשת לידה של יהודים</b>
17.8	20.4	15.6	ישראל
24.1	26.5	22.1	אסיה
26.7	27.9	25.7	אפריקה
24.5	25.8	23.5	אירופה-אמריקה
20.7	23.7	18.8	בריה"מ לשעבר *

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

\* שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.27: אשפוזים במחלקות כלליות\* של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות (שיעורים ל-1,000 נפש)

	1998**	1995	1990	1987	
					<b>בני +65</b>
	<b>560.3</b>	<b>482.5</b>	<b>407.0</b>	<b>341.6</b>	<b>סה"כ</b>
		567.4	470.9	391.2	גברים
		418.1	354.3	299.0	נשים
					<b>בני 65-74</b>
	451.3	402.1	342.2	293.8	סה"כ
		478.7	400.8	338.9	גברים
		342.9	294.3	255.4	נשים
					<b>בני 75-84</b>
	658.7	572.7	477.4	402.9	סה"כ
		673.0	548.1	457.4	גברים
		498.8	419.3	354.3	נשים
					<b>בני +85</b>
	874.2	716.9	586.4	463.7	סה"כ
		825.7	671.2	529.0	גברים
		638.3	520.5	416.4	נשים
					<b>כלל האוכלוסייה*</b>
	155.6	144.1	123.3	110.4	סה"כ
		142.0	121.8	108.9	גברים
		145.7	124.8	111.9	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

\* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות  
 \*\* אומדן המבוסס על כ-80% מהאשפוזים לפי גיל מתוך "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"  
 ועל סך כל האשפוזים מתוך "מוסדות האשפוז בישראל"

לוח 2.28: אשפוזים של בני 65+ במחלקות כלליות\* מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות (אחוזים)

	1998**	1995	1990	1987	
					<b>בני 65+</b>
	<b>35.5</b>	<b>31.9</b>	<b>30.0</b>	<b>27.5</b>	<b>סה"כ</b>
	35.2	33.1	31.8	29.6	גברים
	35.8	30.9	28.2	25.4	נשים
					<b>בני 75+</b>
	18.9	15.9	15.4	13.4	סה"כ
	18.2	16.1	16.1	14.4	גברים
	19.6	15.8	14.7	12.4	נשים
					<b>בני 85+</b>
	5.6	4.1	3.0	2.3	סה"כ
	5.1	4.0	3.1	2.3	גברים
	6.1	4.1	3.0	2.3	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

\* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות  
\*\* בשנת 1998 כלל "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" כ-80% מהאשפוזים באשפוז הכללי

לוח 2.29: בני +65 מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות (אחוזים)

1998**	1995	1990	1987	
<b>35.5</b>	<b>31.9</b>	<b>30.0</b>	<b>27.5</b>	<b>סה"כ מחלקות כלליות*</b>
59.6	57.9	55.2	51.4	פנימית
51.1	48.0	46.4	43.6	ריאות
94.6	91.8	79.4	81.1	גריאטריה אקוטית
36.4	34.9	33.7	32.5	נירולוגיה
38.8	38.0	38.5	31.5	אונקולוגיה
32.0	33.7	31.1	33.5	עור ומין
47.5	47.2	43.8	44.6	טיפול נמרץ כללי
50.1	45.3	44.4	43.1	טיפול נמרץ לב
53.9	52.7	47.2	41.4	טיפול נמרץ נשימתי
32.3	27.5	26.2	26.3	כירורגיה כללית
31.8	30.0	25.2	22.6	אורתופדיה
42.3	40.4	41.7	40.6	אורולוגיה
27.8	22.6	23.7	21.5	נירוכירורגיה
48.2	43.8	36.4	30.4	כירורגיה חזה ולב
57.3	49.4	45.8	39.3	כירורגיה כלי דם
32.4	15.1	22.0	21.0	כירורגיה פלסטית
60.4	55.5	56.4	51.5	עיניים
12.7	10.6	10.0	11.1	אף-אוזן-גרון
11.7	14.8	15.1	9.8	פה ולסת
5.0	5.5	4.0	3.7	נשים
42.4	38.9	39.7	42.1	השהיה

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב, "מאגר מידע מרכזי אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

\* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות  
 \*\* בשנת 1988 כלל "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" כ-80% מהאשפוזים באשפוז הכללי

לוח 2.30: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 1998\*\*  
(אחוזים)

מחלקה	סה"כ	גברים	נשים
<b>כלל מחלקות כלליות*</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
פנימית	53.4	52.9	53.9
ריאות	0.6	0.7	0.5
גריאטריה אקוטית	3.3	2.8	3.7
נוירולוגיה	1.6	1.7	1.5
אונקולוגיה	1.1	1.3	1.0
עור ומין	0.4	0.4	0.5
טיפול נמרץ כללי	1.5	1.6	1.3
טיפול נמרץ לב	3.8	4.6	3.0
טיפול נמרץ נשימתי	0.2	0.2	0.2
כירורגיה כללית	10.8	10.7	11.0
אורתופדיה	5.0	3.4	6.6
אורולוגיה	4.1	6.7	1.4
נוירוכירורגיה	0.5	0.6	0.4
כירורגיה חזה ולב	1.5	1.9	1.1
כירורגיה כלי דם	1.4	1.8	1.0
כירורגיה פלסטית	0.6	0.6	0.5
עיניים	5.8	5.0	6.6
אף-אוזן-גרון	1.1	1.2	1.1
פה ולסת	0.1	0.1	0.1
נשים	1.2	0.0	2.4
השהיה	1.9	1.7	2.1

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"

\* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד  
\*\* בשנת 1998 כלל "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" כ-80% מהאשפוזים באשפוז הכללי



לוח 2.31: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה  
שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 1998\* (ימים)

מחלקות	כלל האוכלוסייה			בני +65		
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים
<b>סה"כ מחלקות כלליות**</b>	<b>4.5</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>5.7</b>	<b>5.6</b>	<b>5.9</b>
פנימית	4.4	4.3	4.6	4.9	4.8	5.0
ריאות	6.4	6.5	6.2	6.9	6.7	7.2
גריאטריה אקוטית	11.7	11.1	12.2	11.5	10.8	12.1
נוירולוגיה	6.6	6.5	6.7	8.4	8.0	8.9
אונקולוגיה	5.4	5.2	5.6	5.7	5.4	6.2
עור ומין	7.9	7.8	8.0	9.6	9.5	9.7
השתלת מוח עצם	9.6	9.9	9.0	5.6	6.9	2.7
טיפול נמרץ כללי	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.6
טיפול נמרץ לב	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2
טיפול נמרץ נשימתי	5.7	5.5	5.9	6.1	5.6	6.7
כירורגיה כללית	4.0	3.9	4.0	5.5	5.4	5.7
אורתופדיה	5.6	5.0	6.3	8.0	7.7	8.2
אורולוגיה	4.4	4.4	4.5	5.4	5.4	5.2
נוירוכירורגיה	8.0	7.3	8.9	10.1	9.3	11.3
כירורגיה חזה ולב	6.6	6.5	6.8	7.2	7.1	7.4
כירורגיה כלי דם	4.9	4.9	4.8	5.3	5.1	5.6
כירורגיה פלסטית	6.9	7.1	6.4	7.0	6.4	7.7
עיניים	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6
אף-אוזן-גרון	3.1	3.1	3.2	4.6	4.6	4.5
פה ולסת	3.6	3.7	3.5	4.6	4.2	4.9
נשים	2.4	1.1	2.4	4.4	2.3	4.4
השהיה	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"

\* בשנת 1998 כלל "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" כ-80% מהאשפוזים באשפוז הכללי  
\*\* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל שהייה במחלקות יולדות

**לוח 2.32: בני +65 וכלל האוכלוסייה המאושפזים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, סוף 1999 (מספרים מוחלטים)**

נשים	גברים	סה"כ	
<b>40</b>	<b>37</b>	<b>77</b>	<b>בני +65</b>
32	29	61	בני 65-74
7	8	15	בני 75-84
1	0	1	בני +85
492	690	1,182	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

**לוח 2.33: בני +65 וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, סוף 1999**

נשים	גברים	סה"כ	
			<b>מספרים מוחלטים</b>
<b>688</b>	<b>489</b>	<b>1,177</b>	<b>כלל בני +65</b>
393	336	729	בני 65-74
224	124	348	בני 75-84
71	29	100	בני +85
2,356	3,557	5,913	כלל האוכלוסייה
			<b>שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה</b>
<b>2.0</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>	<b>כלל בני +65</b>
2.0	2.3	2.1	בני 65-74
2.0	1.5	1.8	בני 75-84
1.9	1.2	1.6	בני +85
0.8	1.2	1.0	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.34: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+,  
 והמאושפזים בכלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים  
 נבחרות - סוף שנה (שיעורים ל-1,000 נפש)

	1999	1998	1997	1990	
					<b>כלל בני 65+</b>
	<b>2.0</b>	<b>2.3</b>	<b>2.5</b>	<b>3.5</b>	<b>סה"כ</b>
	1.9	2.1	2.3	3.1	גברים
	2.0	2.4	2.6	3.9	נשים
					<b>בני 74-65</b>
	2.1	2.5	2.7	3.6	סה"כ
	2.3	2.5	2.7	3.7	גברים
	2.0	2.4	2.7	3.5	נשים
					<b>בני 84-75</b>
	1.8	2.0	2.2	3.6	סה"כ
	1.5	1.7	1.8	2.3	גברים
	2.0	2.3	2.5	4.5	נשים
					<b>בני 85+</b>
	1.6	1.9	2.0	3.1	סה"כ
	1.2	1.4	1.1	1.8	גברים
	1.9	2.2	2.5	4.0	נשים
					<b>כלל האוכלוסייה</b>
	1.0	1.0	1.1	1.8	סה"כ
	1.2	1.2	1.3	2.1	גברים
	0.8	0.8	0.9	1.5	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.35: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות (מספרים מוחלטים)

1999	1998	1997	1996	1990	
					<b>כלל בני +65</b>
<b>1,814</b>	<b>1,983</b>	<b>1,869</b>	<b>1,815</b>	<b>1,412</b>	סה"כ
<b>643</b>	674	652	611	526	גברים
<b>1,171</b>	1,309	1,217	1,204	886	נשים
					<b>בני 74-65</b>
<b>1,111</b>	1,272	1,246	1,177	892	סה"כ
<b>391</b>	442	440	372	321	גברים
<b>720</b>	830	806	805	571	נשים
					<b>בני 84-75</b>
<b>568</b>	594	498	546	467	סה"כ
<b>179</b>	171	157	196	181	גברים
<b>389</b>	423	341	350	286	נשים
					<b>בני +85</b>
<b>135</b>	117	125	92	53	סה"כ
<b>73</b>	61	55	43	24	גברים
<b>62</b>	56	70	49	29	נשים
					<b>כלל האוכלוסייה</b>
<b>17,640</b>	17,210	16,181	15,154	12,262	סה"כ
<b>10,350</b>	9,971	9,331	8,521	6,788	גברים
<b>7,290</b>	7,239	6,850	6,633	5,474	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.36: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 1999

בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	סוג האבחנה
<b>מספרים מוחלטים</b>				
135	568	1,111	<b>1,814</b>	<b>סה"כ קבלות</b>
11	113	407	<b>531</b>	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
4	14	15	<b>33</b>	הפרעות פסיכוטיות חריפות
33	252	486	<b>771</b>	הפרעות אפקטיביות
72	137	129	<b>338</b>	הפרעות אורגניות
12	27	44	<b>83</b>	הפרעות ניאורוטיות
1	10	16	<b>27</b>	הפרעות אישיות
0	5	6	<b>11</b>	סמים ואלכוהול
0	1	3	<b>4</b>	פיגור שכלי
2	9	5	<b>16</b>	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
<b>אחוזים</b>				
100.0	100.0	100.0	<b>100.0</b>	<b>סה"כ קבלות</b>
8.1	19.9	36.6	<b>29.3</b>	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
3.0	2.5	1.4	<b>1.8</b>	הפרעות פסיכוטיות חריפות
24.4	44.4	43.7	<b>42.5</b>	הפרעות אפקטיביות
53.3	24.1	11.6	<b>18.6</b>	הפרעות אורגניות
8.9	4.8	4.0	<b>4.6</b>	הפרעות ניאורוטיות
0.7	1.8	1.4	<b>1.5</b>	הפרעות אישיות
0.0	0.9	0.5	<b>0.6</b>	סמים ואלכוהול
0.0	0.2	0.3	<b>0.2</b>	פיגור שכלי
1.5	1.6	0.5	<b>0.9</b>	גורמי פנייה אחרים (Z codes)

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.37: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, 1999

נשים	גברים	סה"כ	
			<b>מספרים מוחלטים</b>
<b>294</b>	<b>229</b>	<b>523</b>	<b>כלל בני +65</b>
148	111	259	בני 74-65
111	75	186	בני 84-75
35	43	78	בני +85
1,864	2,532	4,396	כלל האוכלוסייה
			<b>שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה</b>
<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>כלל בני +65</b>
0.8	0.7	0.8	בני 74-65
1.0	0.9	1.0	בני 84-75
0.9	1.7	1.3	בני +85
0.6	0.8	0.7	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.38: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה, רופא מומחה או רופא שיניים בשבועיים אחרונים, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (אחוזים)

	רופא משפחה ומומחה	רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
כלל האוכלוסייה	18.7	14.9	5.0	6.8	
<b>כלל בני +65</b>	<b>38.3</b>	<b>32.0</b>	<b>9.7</b>	<b>5.9</b>	
<b>מין</b>					
גברים	34.6	28.6	9.2	6.4	
נשים	41.2	34.6	10.0	5.5	
<b>גיל</b>					
בני 65-74	38.0	31.2	10.4	6.8	
בני 75+	38.9	33.4	8.6	4.5	
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>					
יהודים	38.5	31.9	9.9	6.0	
בני דתות אחרות	36.8	33.8	(6.6)	(4.9)	
<b>יבשת לידה של יהודים</b>					
ישראל	34.1	24.0	11.1	8.2	
אסיה	40.1	35.2	7.4	7.0	
אפריקה	40.3	36.9	6.3	(4.9)	
אירופה-אמריקה	40.5	32.3	12.3	6.4	
בריה"מ לשעבר*	34.0	29.5	8.4	3.6	

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

\* שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.39: ביקורים של בני +65, של בני +75 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא בשנה, לפי גיל, מין והתמחות הרופא, אוקטובר 1999 – ספטמבר 2000 (ממוצע לנפש)

רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
			<b>בני +65</b>
<b>11.5</b>	<b>3.6</b>	<b>2.5</b>	<b>סה"כ</b>
10.6	3.4	2.7	גברים
12.1	3.7	2.3	נשים
			<b>בני +75</b>
11.5	3.0	2.0	סה"כ
10.9	2.7	2.1	גברים
12.0	3.2	2.0	נשים
			<b>כלל האוכלוסייה</b>
5.3	1.8	2.6	סה"כ
4.8	1.4	2.1	גברים
5.7	2.3	3.1	נשים

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

לוח 2.40: ביקורים של בני +65 אצל רופא מתוך סך הביקורים (של כלל האוכלוסייה), אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000, לפי התמחות הרופא ומין (אחוזים)

התמחות הרופא	סה"כ	גברים	נשים
<b>סה"כ*</b>	<b>17.8</b>	<b>7.3</b>	<b>10.5</b>
רופא משפחה	21.5	8.6	13.0
רופא מומחה	19.4	8.0	11.4
רופא שיניים	9.4	4.5	4.9

מקור: למ"ס, סקר בריאות 1999/00

\* לא כולל רופא שיניים



לוח 2.41: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל (אחוזים)

קופת החולים	כלל האוכלוסייה	בני 65+	בני 74-65	בני 75+
<b>נובמבר 1996</b>				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
כללית	60.2	78.1	77.1	79.6
מכבי	20.4	10.6	11.2	9.7
לאומית	9.6	7.0	7.4	6.5
מאוחדת	9.8	4.3	4.3	4.2
<b>נובמבר 1997</b>				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
כללית	58.6	77.1	75.8	78.9
מכבי	21.1	11.2	11.9	10.2
לאומית	10.1	7.2	7.6	6.6
מאוחדת	10.3	4.5	4.7	4.3
<b>נובמבר 1998</b>				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
כללית	58.0	76.2	74.8	78.0
מכבי	21.7	11.8	12.6	10.8
לאומית	9.9	7.3	7.7	6.7
מאוחדת	10.3	4.7	4.9	4.5
<b>נובמבר 1999</b>				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
כללית	57.2	75.1	73.5	77.2
מכבי	22.4	12.6	13.6	11.4
לאומית	10.0	7.4	7.8	6.9
מאוחדת	10.5	4.9	5.2	4.6
<b>נובמבר 2000</b>				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
כללית	56.3	73.9	72.0	76.4
מכבי	23.1	13.4	14.6	11.9
לאומית	9.9	7.5	7.9	7.0
מאוחדת	10.7	5.2	5.5	4.8

מקור: המוסד לביטוח לאומי, חברות בקופת חולים, שנים נבחרות

**לוח 2.42: בני +65 מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות (אחוזים)**

מאוחדת	לאומית	מכבי	כללית	סה"כ	
4.1	7.2	4.9	13.1	10.2	דצמבר 1994
4.4	7.4	5.1	12.9	10.1	דצמבר 1995
4.4	7.3	5.2	13.0	10.0	נובמבר 1996
4.4	7.2	5.4	13.2	10.1	נובמבר 1997
4.6	7.4	5.5	13.2	10.0	נובמבר 1998
5.6	4.7	7.4	13.1	10.0	נובמבר 1999
<b>5.8</b>	<b>4.8</b>	<b>7.5</b>	<b>13.1</b>	<b>10.0</b>	<b>נובמבר 2000</b>

מקור: המוסד לביטוח לאומי, חברות בקופות-חולים, שנים נבחרות

**לוח 2.43: בעלי ביטוח בריאות משלים בקרב בני +65 ובכלל האוכלוסייה, לפי שנה ומין (אחוזים)**

כלל האוכלוסייה			בני +65		סה"כ	
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים		
40.0	35.0	37.5	30.0	22.0	<b>27.0</b>	1997
52.0	50.0	51.0	31.5	37.0	<b>34.0</b>	1999

מקור: גרוס, ר.; ברמלי-גרינברג, ש. 2000. לקט נתונים על ביטוחי בריאות משלימים ומסחריים 1995-1999, ג'וינט-מכון ברוקדייל