



אשל
האגודה לתכנון ולפיתוח
שירותים למען הזקן בישראל



משאב
מאגר מידע ארצי לתכנון
בתחום הזיקנה



ג'וינט-מכון ברוקדייל
לגרונטולוגיה
והתפתחות אדם וחברה

קשישים בישראל שנתון סטטיסטי 2002

עורכים:

ג'ני ברודסקי, יצחק שנוור, שמואל באר
יו"ר ועדת ההיגוי: דרור רותם

**פרק 2: מאפיינים בריאותיים של הקשישים
ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים**



ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה
והתפתחות אדם וחברה
ת"ד 13087
ירושלים 91130.

דואר אלקטרוני: brook@jdc.org.il
כתובת באינטרנט: www.jdc.org.il/brookdale

תוכן עניינים

מבוא

ממצאים עיקריים

הגדרות והסברים

לוח 2.1 : תוחלת החיים בלידה לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

לוח 2.2 : תוחלת חיים בגיל 65 לפי קבוצת אוכלוסייה ומין

לוח 2.3 : תוחלת חיים בגילים נבחרים לפי מין

לוח 2.4 : בני +65 העוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.5 : בני +65 העוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית, לפי סוג הפעילות, ולפי מין, גיל ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60

לוח 2.6 : בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר מעשנים לפחות סיגרייה אחת ביום, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.7 : בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות דימות או קיבלו חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.8 : נשים בנות +65 ובנות +40 אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.9 : בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה, רופא מומחה או רופא שיניים בשבועיים אחרונים, לפי מין, גיל ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.10 : ביקורים של בני +65, של בני +75 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא בשנה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

לוח 2.11 : ביקורים של בני +65 אצל רופא מתוך סך הביקורים (של כלל האוכלוסייה), אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000, לפי התמחות הרופא ומין

- לוח 2.12: בני +65 שדיווחו על בעיות ראייה, שמיעה ולעיסה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה 1997
- לוח 2.13: בני +65 שדיווחו על בעיות בשליטה על סוגר השתן, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997
- לוח 2.14א: גברים בני +65 ובכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000
- לוח 2.14ב: נשים בנות +65 ובכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלן אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000
- לוח 2.15: מידת היכולת של בני +65 ללכת (להסתובב) מחוץ לבית מרחק של 400 מטר, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997
- לוח 2.16א: מידת היכולת של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997
- לוח 2.16ב: מידת היכולת של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997
- לוח 2.17: אומדן בני +65 המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות (ADL), סוף 2001
- לוח 2.18: אומדן בני +65 המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות (ADL), 1990-2001 - סוף שנה
- לוח 2.19: בני +65 בקהילה אשר נפלו במהלך חצי השנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997
- לוח 2.20: בני +65 שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וסוג הנפגע, 2001
- לוח 2.21: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל ומין, 2001
- לוח 2.22: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות
- לוח 2.23: נהגים בני +65 וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2001
- לוח 2.24: בני +65 אשר אושפזו בשנה האחרונה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

- לוח 2.25 : אשפוזים במחלקות כלליות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות
- לוח 2.26 : אשפוזים של בני 65+ במחלקות כלליות מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות
- לוח 2.27 : בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות
- לוח 2.28 : התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2000
- לוח 2.29 : שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2000
- לוח 2.30 : בני 65+ וכלל האוכלוסייה הממתינים לאשפוז, לפי משך ההמתנה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000
- לוח 2.31 : בני 65+ וכלל האוכלוסייה המאושפזים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, סוף 2001
- לוח 2.32 : בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, סוף 2001
- לוח 2.33 : בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים בכלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות - סוף שנה
- לוח 2.34 : קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות
- לוח 2.35 : קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2001
- לוח 2.36 : קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2001
- לוח 2.37 : פטירות של בני 65+ לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2000
- לוח 2.38 : בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות
- לוח 2.39 : פטירות של יהודים ואחרים בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2000
- לוח 2.40 : סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה לפי מין, 1998
- לוח 2.41 : פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ לפי גיל, 1998

לוח 2.41 ב: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +65 לפי גיל, 1998

לוח 2.42: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +65 בין קופות החולים לפי גיל, שנים נבחרות

לוח 2.43: בני +65 מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות

לוח 2.44: בעלי ביטוח בריאות משלים וביטוחי בריאות נוספים בקרב בני +65 ובכלל האוכלוסייה, לפי שנה ומין

2. מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני הבריאות של הקשישים בישראל ועל דפוסי השימוש של הקשישים בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים שונים, ותופעות בריאותיות מסוימות נעשות שכיחות יותר עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא הוא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד ובשמירה על בריאות הקשישים.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות, פוגעת קשות באיכות החיים של הקשיש. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מתייחס למדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, תמותה, סגנון חיים, מחלות ומוגבלות, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. כן, מובאים נתונים על דפוסי שימוש של קשישים בשירותי בריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ◆ **תוחלת החיים בלידה** עולה בהדרגה והגיעה בשנת 2000 ל-80.9 שנים לנשים ו-76.7 שנים לגברים. תוחלת החיים של היהודים גבוהה מזו של האוכלוסייה הערבית; בשנת 2000 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 3.3 שנים בקרב הנשים, ו-2.5 שנים בקרב הגברים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** היא 18.7 שנים לנשים ו-16.6 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 84 בממוצע, וגבר - עד גיל 82 (לוח 2.2).
- ◆ כשליש (36%) מבני +65 **עוסקים בפעילות גופנית** באופן קבוע, גברים יותר מנשים (41% ו-31%, בהתאמה). העיסוק בפעילות גופנית יורד עם עליית הגיל. רק 22% מבני +80 עוסקים בפעילות גופנית לעומת 41% מבני 65-74. אחוז העוסקים בפעילות גופנית נמוך מאוד בקרב האוכלוסייה הערבית: 3% לעומת 38% בקרב היהודים (לוח 2.4).
- **הפעילות הגופנית הנפוצה** בקרב קשישים היא הליכה: כ-24% מכלל הקשישים, וכ-67% מבין הקשישים העוסקים בפעילות גופנית, דיווחו על הליכה באופן קבוע (לוח 2.5).
- ◆ תשעה אחוזים מהקשישים **מעשנים**. אחוז הגברים המעשנים יותר מכפול מאחוז הנשים המעשנות (13% לעומת 5%). אחוז הקשישים המעשנים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה מאשר בקרב הקשישים היהודים (13% לעומת 8%). רק 5% מקרב עולי בריה"מ לשעבר מעשנים לעומת 14% מקרב ילידי הארץ (לוח 2.6).
- ◆ עשרים וחמישה מכל 1,000 בני +65 ביצעו **בדיקת MRI** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), לעומת 11 מכל 1,000 בכלל האוכלוסייה. בקרב בני +65, שיעורם של הגברים אשר ביצעו בדיקת MRI גבוה פי 1.5 מאשר בקרב הנשים. בתקופה הנדונה ביצעו 163 מכל 1,000 בני +65 בדיקת CT, לעומת 55 מכל 1,000 בכלל האוכלוסייה (לוח 2.7).

- ◆ כ-45% מבני +65 קיבלו **חיסון נגד שפעת** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000). שיעורם של המקבלים חיסון נגד שפעת בקרב בני +65 גבוה פי חמישה מאשר בכלל האוכלוסייה. שיעור המקבלים חיסון בקרב עולי בריה"מ לשעבר הוא כמחצית השיעור בקרב היהודים ואחרים (23% לעומת 45%, בהתאמה) (לוח 2.7).
- ◆ מעט פחות משליש מהקשישות עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה. שיעור בנות ה-75 שעברו את הבדיקה הוא נמוך יותר מאשר בקרב בנות 65-74 (17% לעומת 38% בהתאמה) לוח (2.8).
- ◆ כמעט 40% מהקשישים **ביקרו אצל רופא** לפחות פעם אחת בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), כפול מהאחוז בכלל האוכלוסייה. אצל רופא משפחה ביקרו 32% ואצל רופא מומחה כ-10% (לוח 2.9).
- ◆ קשיש **מבקר אצל רופא** בממוצע כ-15 פעמים בשנה, מתוכן 11.5 פעמים אצל רופא משפחה ו-3.6 פעמים אצל רופא מומחה. ממוצע ביקורים אצל רופא בשנה בכלל האוכלוסייה הוא כשבעה ביקורים (לוח 2.10).
- ממוצע **הביקורים לנפש של קשישים אצל רופא שיניים** בשנה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000) היה 2.5, ובקרב בני +75 היה ממוצע הביקורים לנפש נמוך יותר (2.0 ביקורים) (לוח 2.10).
- עשרים ושניים אחוזים מסך הביקורים אצל רופא משפחה, 19% מסך הביקורים אצל רופא מומחה ו-9% מסך הביקורים אצל רופא שיניים, נעשים בידי קשישים. חלקן של הנשים הקשישות מתוך סך הביקורים אצל רופא משפחה הוא 13%, לעומת 9% בקרב הגברים הקשישים (לוח 2.11).
- ◆ קצת למעלה משליש מהקשישים (34%) דיווחו על **בעיות ראייה** (28% מהגברים ו-39% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות ראייה עולה עם הגיל ומגיע ל-47% בקרב בני +80. עשרים ושמונה אחוזים מהקשישים דיווחו על **בעיות שמיעה** (31% מהגברים ו-26% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות שמיעה מגיע ל-48% בקרב בני +80 (לוח 2.12). שבעה עשר אחוזים מהקשישים דיווחו על **בעיות בשליטה על סוגר**

השתן (13% מהגברים ו-19% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות בשליטה על סוגר השתן מגיע ל-33% בקרב בני 80+ (26% מהגברים ו-39% מהנשים) (לוח 2.13).

♦ שלושים ושמונה אחוזים מהגברים הקשישים היהודים ואחרים דיווחו **שהרופא אבחן אצלם יתר לחץ-דם**, בעוד שבקרב הגברים באוכלוסייה הערבית רק 24% דיווחו על כך. בקרב הנשים היהודיות אחוז גבוה יותר דיווחו על יתר לחץ-דם (45%). עשרים ואחד אחוזים מהגברים היהודים **דיווחו על אוטם בשריר הלב** (18% בקרב הגברים באוכלוסייה הערבית), לעומת 10% בקרב הנשים היהודיות. על אבחון **סוכרת** דיווחו 15% מהקשישים היהודים - נשים וגברים, לעומת 26% מהגברים ו-32% מהנשים באוכלוסייה הערבית. בקרב הנשים באוכלוסייה הערבית שיעור גבוה בהרבה מהגברים דיווחו על יתר לחץ דם (44%), 14% מהן דיווחו על אוטם שריר הלב ו-32% דיווחו על סוכרת (לוח 2.14 א' ו-ב').

♦ בבדיקת יכולת ה**ניידות של הקשישים מחוץ לבית** מסתבר, כי קרוב לשלושה רבעים מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים ללכת מחוץ לבית למרחק של 400 מטר, ללא כל סיוע. הקשישים שיש להם קושי בניידות מחוץ לבית מתפלגים באופן הבא: 7% מסוגלים ללכת למרחק של 400 מטר בעזרת מכשיר (מקל או הליכון), 7% זקוקים לעזרתו של אדם אחר או שהם יושבים בכיסא גלגלים ו-12% מרותקים לבית. שיעור המוגבלות עולה עם הגיל, והוא גבוה יותר בקרב האוכלוסייה הערבית לעומת היהודית (לוח 2.15).

♦ בקרב הקשישים בני 65+ הגרים בקהילה (מחוץ למוסדות), 11% **אינם יכולים להתרחץ או להתקלח ללא עזרה**, 6% זקוקים לעזרה כדי **להתלבש** ו-3% מהקשישים זקוקים לעזרה **באכילה**. בנוסף, אחוז הקשישים שדיווחו על קושי לבצע פעולות אלה, על אף שהם יכולים לבצע אותן ללא עזרה, הגיע ל-13% ברחצה, ל-14% בלבישה ול-6% באכילה. בנוסף, 4% מהקשישים הגרים בקהילה לא יכולים באופן עצמאי להיכנס ולצאת מהמיטה, להתיישב ולקום מהכיסא ולנוע בתוך הבית (לוח 2.16 א, ב).

♦ אומדן **אחוז הקשישים המוגבלים, דהיינו הזקוקים לעזרה באחת מפעולות היומיום לפחות** (להתרחץ או להתקלח, להתלבש, לאכול, לשבת ולקום מהכיסא, להיכנס ולצאת מהמיטה, להסתובב בתוך הבית) (ADL = Activities of Daily Living), עומד בסוף 2001 על 15% (11% בקרב הגברים ו-18% בקרב הנשים). אחוז

המוגבלים עולה בצורה חדה עם העלייה בגיל: 39% בקרב בני +80 לעומת 7% בקרב בני 65-74. אחוז הקשישים המוגבלים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה פי שניים לערך מהאחוז המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית (31% ו-14%, בהתאמה). (לוח 2.17).

- בין השנים 1990-2001 גדל **מספר הקשישים המוגבלים** בארץ ב-67% והגיע לכ-97,400 איש בסוף 2001. עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים המוגבלים הם דיירי המוסדות לטיפול ממושך ו-76% גרים בקהילה (לוח 2.18).

♦ **כחמישית מהקשישים בקהילה נפלו** במהלך חצי השנה האחרונה. הגברים סובלים פחות מנפילות (14%) מאשר הנשים (24%). אחוז הקשישים שנפלו מגיע ל-31% בקרב בני +80 (לוח 2.19).

♦ בשנת 2001 נפגעו **בתאונות דרכים** 1,788 קשישים. מתוכם, 5% נהרגו (96 קשישים), 17% נפצעו קשה (297 קשישים) ו-78% נפצעו קל (1,395 קשישים). שלושים ושישה אחוזים מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 32% נהגו ברכב ו-28% נסעו ברכב. כמחצית הקשישים שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (לוח 2.20).

- שיעור הקשישים שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2001 נמוך מזה שבכלל האוכלוסייה (174 ו-584 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך **שיעור ההרוגים** מתוך הנפגעים דומה. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בכלל האוכלוסייה והן בקרב הקשישים (לוח 2.21).

- בשנת 2001 חלה ירידה משמעותית בשיעור הקשישים **שנפגעו בתאונות דרכים**, לעומת שנת 1999 (מ-363 ל-174 ל-100,000 נפש). גם אחוז ההרוגים בני ה-65+ קטן בחצי בין 1999 ל-2001. בכלל האוכלוסייה פחת מספר הנפגעים בתאונות דרכים בחמישית, ולא חל שינוי בשיעור ההרוגים (לוח 2.22).

- **שיעור הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בכלל האוכלוסייה בשנת 2001 גבוה ב-49% משיעור הנהגים בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים (לוח 2.23).

♦ עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים דיווחו על **אשפוז** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), 26% בקרב הגברים ו-22% בקרב הנשים. שיעור האשפוזים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה יותר ועומד על 31% לעומת שיעור האשפוזים בקרב היהודים ואחרים (23%). מבין היהודים, שיעור האשפוז הנמוך ביותר הוא של ילידי ישראל (18%) והגבוה ביותר הוא של ילידי אפריקה (27%) (לוח 2.24).

♦ **שיעורי האשפוז של הקשישים במחלקות האשפוז הכלליות** גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. בשנת 2000 נרשמו 529 אשפוזים ל-1,000 קשישים במחלקות האשפוז הכלליות, בהשוואה ל-152 ל-1,000 בכלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-423 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-831 בגיל +85). שיעור האשפוז הכללי נמצא במגמת עלייה, הן בכלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב הקשישים (לוח 2.25).

- בבחינת **חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים** נמצא, כי בשנת 2000, כשליש (34%) מהאשפוזים היו של בני +65 (על אף שהם מהווים פחות מ-10% מכלל האוכלוסייה), ו-19% מהאשפוזים היו של בני +75 (על אף שהם מהווים כ-4% מכלל האוכלוסייה). שיעור הקשישים מכלל האשפוזים נמצא במגמת עלייה (לוח 2.26). חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים במחלקות הפנימיות גבוה במיוחד והגיע ל-58% בשנת 2000 (לוח 2.27).

- התפלגות **האשפוזים של הקשישים במחלקות האשפוז** מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר, ומהווה קצת מעל מחצית האשפוזים (לוח 2.28).

- **השהייה הממוצעת** של הקשישים גבוהה מזו של כלל האוכלוסייה, גם בקרב הגברים וגם בקרב הנשים. בחינת השהייה הממוצעת במחלקות השונות, מצביעה על שהות ממוצעת גבוהה יחסית במחלקות גריאטריה אקוטית ונוירוכירורגיה (לוח 2.29).

♦ לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000, **המתינו** 16,700 בני +65 **לאשפוז** במהלך השנה האחרונה, והם מהווים 3% מבני +65, לעומת 0.1%

שהמתינו לאשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. מכלל הקשישים הממתינים לאשפוז, 40% ממתינים לאשפוז שלושה חודשים ויותר (6,600 איש) (לוח 2.30).

♦ ב-2001 היו 63 קשישים **באשפוז יום פסיכיאטרי**, והם היוו 6% מסך השוהים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 83% מכלל הקשישים השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.31).

♦ בסוף 2001 היו 869 קשישים מאושפזים **באשפוז פסיכיאטרי**, שיעור של 1.4 מאושפזים ל-1,000 נפש. זאת, בהשוואה ל-0.8 מאושפזים ל-1,000 נפש בקרב כלל האוכלוסייה. שבעה עשר אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.32). משנת 1990 ועד שנת 2001 חלה ירידה בשיעור הקשישים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-1.4 ל-1,000 נפש) (לוח 2.33).

- במהלך 2001 היו 1,751 **קבלות לאשפוז פסיכיאטרי** של בני 65+, ואלה היוו 10% מסך הקבלות לאשפוז. כשני שלישים מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (לוח 2.34). שלוש **האבחנות השכיחות** לקבלה לאשפוז (91% מהקבלות) היו: הפרעות אפקטיביות, סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות והפרעות אורגניות (לוח 2.35).

- שנים עשר אחוזים מכלל **הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי** בשנת 2001 היו של בני 65+ (מרביתם בני 65-84, ורק מיעוטם בני 85+) (לוח 2.36).

♦ ב-2000 עמד **שיעור הפטירה** ל-1,000 בני 65+ על 53 בקרב הגברים ועל 44 בקרב הנשים. שיעור הפטירה של הגברים היהודים ואחרים נמוך מזה של הגברים באוכלוסייה הערבית עד גיל 84, ואילו בקרב בני 85+ המצב הפוך. שיעור הפטירה של הנשים היהודיות נמוך מזה של הנשים באוכלוסייה הערבית (לוח 2.37).

♦ שישים ותשעה אחוזים מהקשישים **נפטרו בבית חולים** בשנת 2000, לעומת 61% בקרב בני 0-64. בקרב הקשישים 70% מהגברים ו-67% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 56% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 70% מהנשים (לוח 2.38).

- ב-1998 נפטרו 28,762 אנשים בגיל +65, שהם 78% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. **סיבות הפטירה העיקריות** בקרב הקשישים הן: מחלות במערכת הדם והלב (39% מהפטירות בקרב הגברים ו-41% בקרב הנשים, בהשוואה ל-34% בקרב הגברים בכלל האוכלוסייה ו-36% בקרב הנשים בכלל האוכלוסייה); וכן, שאתות ממאירות (24% מהפטירות בקרב הגברים ו-20% מהפטירות בקרב הנשים). בקרב הגברים, אין הבדל בין הקשישים לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתוך סך הפטירות; ובקרב הנשים השיעור בכלל האוכלוסייה (24%) גבוה מזה שבקרב הנשים הקשישות (לוחות 2.40; 2.41 א, ב).

- עם העלייה בגיל, עולה חלקן היחסי של מחלות לב וכלי דם בין סיבות פטירה: מ-34% בקרב גברים בני 65-74 ל-43% בקרב גברים בני +85; מ-32% בקרב נשים בנות 65-74 ל-47% בקרב בנות +85. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-31% בקרב גברים בני 65-74 ל-17% בקרב גברים בני +85; ומ-33% בקרב נשים בנות 65-74 ל-12% בקרב נשים בנות +85 (לוחות 2.41 א, ב).

♦ בנובמבר שנת 2001, היו 73% מהקשישים **מבוטחים** בשירותי בריאות כללית (בהשוואה ל-56% מכלל האוכלוסייה), 14% במכבי שירותי בריאות (בהשוואה ל-23% מכלל האוכלוסייה), 8% בקופת חולים לאומית ו-5% בקופת חולים מאוחדת (בהשוואה ל-11% מכלל האוכלוסייה). ישנה ירידה לאורך השנים באחוז הקשישים המבוטחים בקופת חולים כללית (לוח 2.42). שלושה עשר אחוזים מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם קשישים, בהשוואה ל-8% במכבי, 5% בלאומית ו-6% במאוחדת (לוח 2.43).

♦ ב-2001 היה ל-58% מהקשישים **ביטוח בריאות משלים**, לעומת 65% בכלל האוכלוסייה. מאז שנת 1997 גדל מספר הקשישים בעלי הביטוח המשלים ביותר מפי שניים (בשנת 1997 ל-27% מהקשישים היה ביטוח משלים). לחמישית מהגברים הקשישים, לעומת 5% מהנשים הקשישות יש **ביטוח בריאות פרטי**. אחוז הקשישים בעלי ביטוח הבריאות הפרטי הוא נמוך יחסית לאוכלוסייה הכללית (29% מהגברים ו-22% מהנשים בכלל האוכלוסייה). כמו כן, רבע מהקשישים מבוטחים ב**ביטוח סיעודי פרטי**, בדומה לאחוז באוכלוסייה הכללית (לוח 2.44).

הגדרות והסברים

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999, שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד, וקבוצת "בני דתות אחרות" הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת. יש לציין כי סקר בני 60 ומעלה נערך בשנת 1997 על-פי ההגדרה החדשה. לוח אחד כולל התייחסות לפי דת: יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ו"ללא סיווג דת" - קבוצה הכוללת גם דתות שלא פורטו בנפרד.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תושבים ישראליים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מתייחסים לאשפוז במחלקות כלליות בבתי החולים הכלליים בלבד, כפי שמפורט בלוחות. הנתונים אינם כוללים אשפוז במחלקות יולדות ופסיכיאטריה. הנתונים כוללים אשפוזים במסגרת מחלקות האשפוז בלבד ואינם כוללים מחלקות לאשפוז יום.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפרסם אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה בידי המחלקה למידע והערכה באגף בריאות הנפש, כתוצאה מעדכונים מאוחרים מבתי החולים.

קבלות ראשונות לאשפוז: אנשים שהתקבלו לראשונה בחייהם לבית חולים פסיכיאטרי.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות. הקבלות לאשפוז אינן כוללות קבלות לטיפול יום.

נתונים מסקר בריאות

אשפוז: אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוז יום בבתי חולים.

רופא משפחה: רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים.

רופא שיניים: רופא שיניים ומרפא שיניים, אורטודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

ביקור אצל רופא: ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים, במרפאת חוץ של בית חולים, בתחנת "מגן דוד אדום", בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית בביתו של הרופא וביקור בבית

החולה. לא נכללו התייעצויות בטלפון או ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

מבקר: אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

חולה במחלות כרוניות: אדם המדווח שאי-פעם הרופא אבחן אצלו מחלה כרונית.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
 .. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-40%
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40%

הערה

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי וג'וינט-מכון ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.2	75.1	80.3	76.6	80.0	76.3	1996
76.8	74.3	80.6	76.4	80.1	76.0	1997
76.8	74.4	80.7	76.4	80.3	76.1	1998
78.1	74.9	80.7	77.0	80.4	76.6	1999
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, שנים נבחרות

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת חיים בגיל 65 לפי קבוצת אוכלוסייה ומין

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.7	15.3	14.8	13.7	14.9	13.8	1974-1970
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
16.4	16.0	17.9	15.8	17.9	15.8	1995-1991
16.8	16.1	18.1	16.0	18.0	16.0	1996-1992
17.0	16.4	18.3	16.2	18.2	16.2	1997-1993
17.0	16.4	18.5	16.3	18.4	16.3	1998-1994
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
16.6	16.6	18.7	16.5	18.6	16.5	1999-1996
16.6	16.5	18.8	16.7	18.7	16.6	2000-1996

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, שנים נבחרות

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.3: תוחלת חיים בגילים נבחרים לפי מין

בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
5.8	5.5	8.0	7.3	10.8	9.7	1995-1991
5.8	5.5	8.0	7.4	10.8	9.8	1996-1992
5.9	5.5	8.2	7.4	11.0	9.9	1997-1993
5.9	5.5	8.2	7.4	11.1	10.0	1998-1994
5.8	5.6	8.2	7.6	11.2	10.2	1999-1996
5.9	5.7	8.2	7.6	11.3	10.2	2000-1996

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, שנים נבחרות

לוח 2.4: בני +65 העוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

נשים	גברים	סה"כ	
31.4	41.0	35.6	כלל בני +65
			גיל
35.5	47.3	40.6	בני 65-74
31.9	35.7	33.6	בני 75-79
18.6	26.5	21.9	בני +80
			קבוצת אוכלוסייה
33.2	43.5	37.6	יהודים ואחרים*
29.9	48.9	37.3	מזה: עולי בריה"מ לשעבר [#]
..	(5.3)	3.0	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים*
50.2	45.1	48.0	ישראל
19.6	30.3	24.5	אסיה-אפריקה
36.8	49.4	42.1	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[#] שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.5: בני 65+ העוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית, לפי סוג הפעילות, ולפי מין, גיל ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

שחייה		רכיבה על אופניים		התעמלות או ריקוד		הליכה		
מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	
15.2	5.4	8.0	2.8	45.2	16.0	66.5	23.6	כלל בני 65+
16.1	6.6	11.7	4.8	34.0	13.8	73.4	30.0	מין
14.3	4.4	4.3	1.3	56.3	17.6	59.6	18.7	גברים
								נשים
18.1	7.3	8.7	3.5	45.0	18.2	67.8	27.5	גיל
9.6	3.2	7.1	2.4	39.3	12.9	68.9	23.1	בני 65-74
(7.3)	(1.6)	(5.1)	(1.1)	55.3	12.1	55.3	12.0	בני 65-79
								בני 80+
יבשת לידה של יהודים ואחרים*								
26.0	12.5	(12.3)	(5.9)	52.7	25.0	59.7	28.7	ישראל
11.2	2.7	10.7	2.6	50.3	12.3	61.0	14.9	אסיה-אפריקה
14.8	6.2	6.7	2.8	43.1	18.0	68.7	28.8	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.6: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר מעשנים לפחות סיגרייה אחת ביום, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (אחוזים)

נשים	גברים	סה"כ	
15.4	34.0	24.1	כלל האוכלוסייה
5.2	13.1	8.6	כלל בני +65
6.9	16.7	11.1	בני 65-74
2.7	7.8	4.9	בני +75
			קבוצת אוכלוסייה
5.3	12.4	8.4	יהודים ואחרים*
..	24.0	13.1	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים
		14.1	ישראל
		12.8	אסיה
		8.4	אפריקה
		7.5	אירופה-אמריקה
		4.6	בריה"מ לשעבר [#]

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[#] שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.7: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות דימות או קיבלו חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (שיעורים ל-1,000 נפש)

חיסון נגד שפעת	CT	MRI	
90	55	11	כלל האוכלוסייה
447	163	25	כלל בני +65
			מין
473	173	31	גברים
427	155	19	נשים
			גיל
414	153	22	בני 65-74
496	177	28	בני +75
			קבוצות אוכלוסייה
449	161	25	יהודים ואחרים*
405	183	..	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים*
515	163	..	ישראל
444	157	(26)	אסיה
487	116	30	אפריקה
533	183	(30)	אירופה-אמריקה
230	149	(16)	בריה"מ לשעבר [#]

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[#] שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.8: נשים בנות +65 ובנות +40 אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (שיעורים ל-1,000 נפש)

שיעורים ל-1,000 נפש	
298	בנות +65
305	בנות +40
	גיל
382	בנות 65-74
(172)	בנות 75+
	קבוצת אוכלוסייה
309	יהודיות ואחרות*
(121)	אוכלוסייה ערבית
	יבשת לידה של יהודיות ואחרות*
468	ישראל
255	אסיה
230	אפריקה
361	אירופה-אמריקה
222	בריה"מ לשעבר [#]

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

* כולל: יהודיות, נוצריות שאינן ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[#] שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודיות

לוח 2.9: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה, רופא מומחה או רופא שיניים בשבועיים אחרונים, לפי מין, גיל ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (אחוזים)

רופא משפחה ומומחה	רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
18.7	14.9	5.0	6.8	כלל האוכלוסייה
38.3	32.0	9.7	5.9	כלל בני +65
34.6	28.6	9.2	6.4	מין גברים
41.2	34.6	10.0	5.5	נשים
38.0	31.2	10.4	6.8	גיל בני 65-74
38.9	33.4	8.6	4.5	בני 75+
34.1	24.0	11.1	8.2	יבשת לידה של יהודים ואחרים*
40.1	35.2	7.4	7.0	ישראל
40.3	36.9	6.3	(4.9)	אסיה
40.5	32.3	12.3	6.4	אפריקה
34.0	29.5	8.4	3.6	אירופה-אמריקה בריה"מ לשעבר [#]

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[#] שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.10: ביקורים של בני +65, של בני +75 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא בשנה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (ממוצע לנפש)

רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
11.5	3.6	2.5	בני +65
10.6	3.4	2.7	סה"כ
12.1	3.7	2.3	גברים
			נשים
			קבוצות אוכלוסייה
11.1	3.6	2.5	יהודים ואחרים*
17.2	..	(2.0)	אוכלוסייה ערבית
			בני +75
11.5	3.0	2.0	סה"כ
10.9	2.7	2.1	גברים
12.0	3.2	2.0	נשים
			כלל האוכלוסייה
5.3	1.8	2.6	סה"כ
4.8	1.4	2.1	גברים
5.7	2.3	3.1	נשים

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

*כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.11: ביקורים של בני +65 אצל רופא מתוך סך הביקורים (של כלל האוכלוסייה), אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000, לפי התמחות הרופא ומין (אחוזים)

רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
17.8	7.3	10.5	סה"כ*
21.5	8.6	13.0	רופא משפחה
19.4	8.0	11.4	רופא מומחה
9.4	4.5	4.9	רופא שיניים

מקור: למ"ס, סקר בריאות 1999/2000

* לא כולל רופא שיניים

לוח 2.12: בני +65 שדיווחו על בעיות ראייה, שמיעה ולעיסה*, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

בעיות לעיסה	בעיות שמיעה	בעיות ראייה	
31.4	27.9	34.3	כלל בני +65
			מין
28.7	31.1	27.6	גברים
33.3	25.5	39.3	נשים
			גיל
29.1	21.7	29.6	בני 65-74
32.8	27.7	35.5	בני 75-79
36.7	47.5	47.4	בני +80
			קבוצת אוכלוסייה
30.5	28.0	33.5	יהודים ואחרים [#]
34.8	32.4	39.0	מזה: עולי בריה"מ לשעבר [^]
45.0	18.7	44.4	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים
			ואחרים [#]
17.1	17.7	21.3	ישראל
42.0	30.1	42.0	אסיה-אפריקה
27.1	29.1	31.5	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

* בעיות ראייה: קשיים בראייה מרחוק ו/או מקרוב (גם כאשר מרכיבים משקפיים)
 בעיות שמיעה: קשיים בשמיעה (גם כאשר משתמשים במכשיר שמיעה)
 בעיות לעיסה: קשיים באכילה עם שיניים תותבות או בעיות בלעיסה למי שאין להם שיניים תותבות
[#] כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[^] שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.13: בני +65 שדיווחו על בעיות בשליטה על סוגר השתן*, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

נשים	גברים	סה"כ	
19.3	12.7	16.5	כלל בני +65
			גיל
12.8	8.1	10.8	בני 65-74
19.6	14.2	17.2	בני 75-79
39.1	25.8	33.4	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
19.7	12.6	16.6	יהודים ואחרים [#]
20.2	12.7	17.2	מזה: עולי בריה"מ לשעבר [^]
13.9	12.6	13.3	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים [#]
9.5	6.5	8.2	ישראל
24.4	17.4	21.2	אסיה-אפריקה
18.9	11.3	15.7	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

* קורה שיש להם בריחת שתן או שאינם מספיקים להגיע לשירותים
[#] כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[^] שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.14 א: גברים בני 65+ ובכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם
 אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000
 (שיעורים ל-1,000 נפש)

75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה	
				יהודים ואחרים*
369	368	377	90	יתר-לחץ דם
211	205	208	35	אוטם שריר הלב
134	96	111	23	מחלת לב אחרת
..	..	54	7	שבץ מוח
130	167	152	33	סוכרת
..	..	46	43	אסטמה
..	..	42	15	מחלת ריאה
109	99	103	31	כיב במערכת העיכול
59	48	53	9	מחלה ממארת (סרטן)
				אוכלוסייה ערבית
(172)	282	237	25	יתר-לחץ דם
..	(173)	(176)	19	אוטם שריר הלב
(167)	..	(96)	13	מחלת לב אחרת
(308)	231	263	27	סוכרת

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

*כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.14: נשים בנות +65 ובכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלן אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (שיעורים ל-1,000 נפש)

75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה	
				יהודים ואחרים*
476	430	449	113	יתר-לחץ דם
109	84	95	16	אוטם שריר הלב
133	98	112	28	מחלת לב אחרת
..	..	39	6	שבץ מוח
143	155	150	37	סוכרת
45	28	58	38	אסטמה
..	..	52	15	מחלת ריאה
104	89	95	29	כיב במערכת העיכול
65	54	58	16	מחלה ממארת (סרטן)
				אוכלוסייה ערבית
444	432	436	41	יתר-לחץ דם
..	(144)	(143)	10	אוטם שריר הלב
..	(135)	(129)	11	מחלת לב אחרת
(248)	345	317	34	סוכרת
..	(141)	(111)	14	כיב במערכת העיכול

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

*כולל: יהודיות, נוצריות שאינם ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.15: מידת היכולת של בני 65+ ללכת (להסתובב) מחוץ לבית מרחק של 400 מטר, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

מסוגל בעזרת אדם אחר או יושב בכיסא גלגלים	מסוגל בעזרת מכשיר (מקל, הליכון)	מסוגל ללא עזרת אדם או מכשיר	סה"כ	
12.4	7.4	7.2	73.0	סה"כ בני 65+
				מין
9.2	5.2	7.3	78.3	גברים
14.9	9.0	7.1	68.9	נשים
				גיל
7.3	4.7	4.1	83.9	בני 65-74
12.9	7.9	9.5	69.7	בני 75-79
27.8	15.0	14.5	42.6	בני 80+
				קבוצת אוכלוסייה
11.7	6.9	6.7	74.6	יהודים ואחרים*
10.9	9.7	6.7	72.7	מזה: עולי בריה"מ לשעבר [#]
23.6	15.0	14.4	47.0	אוכלוסייה ערבית
				יבשת לידה של יהודים ואחרים*
7.1	..	(3.2)	87.2	ישראל
18.0	7.0	8.3	66.8	אסיה-אפריקה
9.6	7.4	6.5	76.5	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[#] שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.16א: מידת היכולת של בני 65+ לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לאכול			להתקלח או להתרחץ			להתלבש			סה"כ	
יכול ללא	יכול אך קשה	יכול ללא קושי	יכול ללא	יכול אך קשה	יכול ללא קושי	יכול ללא	יכול אך קשה	יכול ללא קושי		
2.5	5.5	92.0	10.6	13.3	76.1	6.2	13.8	80.0	100.0	סה"כ בני 65+
1.9	4.1	94.0	7.8	11.1	81.1	5.6	11.6	82.8	100.0	מין גברים
2.9	6.6	90.5	12.8	14.9	72.3	6.6	15.5	77.8	100.0	נשים
1.7	2.9	95.5	4.8	10.1	85.0	3.2	9.6	87.2	100.0	גיל בני 65-74
1.9	4.8	93.3	9.3	14.0	76.7	6.0	14.0	80.0	100.0	בני 75-79
5.7	14.2	80.0	29.7	22.3	48.0	15.7	26.5	57.8	100.0	בני 80+
1.8	5.1	93.1	9.8	13.0	77.3	5.2	13.6	81.2	100.0	קבוצת אוכלוסייה יהודים ואחרים*
2.4	5.1	92.5	12.8	13.3	73.9	5.2	13.7	81.1	100.0	מזה: עולי בריה"מ לשעבר#
13.1	12.3	74.6	24.0	18.3	57.7	22.4	17.1	60.5	100.0	אוכלוסייה ערבית
..	..	97.1	(3.1)	(5.9)	91.1	..	(6.9)	90.7	100.0	יבשת לידה של יהודים ואחרים*
2.8	7.1	90.1	12.8	16.7	70.5	8.6	17.7	73.7	100.0	ישראל-אסיה
1.5	4.5	93.9	9.2	12.2	78.6	4.0	12.7	83.4	100.0	אפריקה-אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.16: מידת היכולת של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לנוע (להסתובב) בתוך הבית	להתיישב על כיסא ולקום ממנו			להיכנס למיטה ולצאת ממנה			סה"כ		
	לא יכול*	יכול	לא יכול	יכול לא קשה	יכול לא קשה	יכול לא קשה			
4.2	95.8	3.8	14.6	81.7	3.7	14.4	81.9	100.0	סה"כ בני +65
3.9	96.1	3.1	10.8	86.1	3.2	10.5	86.4	100.0	מין
4.5	95.5	4.3	17.5	78.3	4.0	17.5	78.5	100.0	גברים
									נשים
2.2	97.8	2.2	9.2	88.6	2.1	9.7	88.1	100.0	גיל
4.0	96.0	2.9	17.0	80.1	2.5	14.9	82.6	100.0	בני 65-74
10.8	89.2	9.4	28.6	62.0	9.7	28.4	61.9	100.0	בני 75-79
									בני 80+
									קבוצת אוכלוסייה
3.2	96.8	2.8	14.6	82.6	2.8	14.4	82.7	100.0	יהודים
									ואחרים#
4.1	95.9	3.6	13.3	83.1	2.8	17.1	80.1	100.0	מזה: עולי
									בריה"מ
20.4	79.6	18.8	13.8	67.4	17.2	14.4	68.3	100.0	לשעבר^
									אוכלוסייה
									ערבית
									יבשת לידה של יהודים ואחרים#
..	99.0	..	8.1	91.2	..	8.2	91.0	100.0	ישראל
									אסיה-
4.8	95.2	4.6	19.7	75.7	5.0	19.1	75.9	100.0	אפריקה
									אירופה-
2.8	97.2	2.3	13.2	84.5	2.1	13.2	84.7	100.0	אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

* עם או בלי מכשיר (כגון מקל או הליכון)

כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

^ שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.17: אומדן בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות (ADL)*, סוף 2001 (אחוזים)

נשים	גברים	סה"כ	
18.1	11.4	15.2	כלל בני 65+
			גיל
7.8	4.8	6.5	בני 65-74
14.0	10.9	12.7	בני 75-79
45.7	29.5	39.1	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
16.8	10.8	14.3	יהודים ואחרים [#]
18.6	9.8	15.3	מזה: עולי בריה"מ לשעבר [^]
39.3	20.2	30.5	אוכלוסייה ערבית
			מקום לידה של יהודים ואחרים [#]
20.3	14.1	17.5	אסיה-אפריקה
15.6	9.5	13.0	אירופה-אמריקה וישראל

מקורות: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997 (עיבוד מיוחד); באר, ש. 2003. מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך, 1999

* כולל שתי אוכלוסיות: (א) קשישים הגרים בקהילה הזקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, נידות בתוך הבית; (ב) קשישים דיירי מוסדות לטיפול ממושך: תשושים, סיעודיים ותשושי נפש. בשנתון הקודם (2001) התייחסו הנתונים לאוכלוסייה הראשונה בלבד.
[#] כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[^] שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.18: אומדן בני +65 המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות (ADL),
2001-1990 - סוף שנה

אחוז המוגבלים מתוך בני +65*	אחוזים	אלפים	
			1990
13.2	100.0	58.3	סה"כ מוגבלים
11.0	80.1	46.7	בקהילה [#]
67.2	19.9	11.6	במוסדות לטיפול ממושך [^]
			2001
15.2	100.0	97.4	סה"כ מוגבלים
12.2	76.3	74.3	בקהילה [#]
83.9	23.7	23.1	במוסדות לטיפול ממושך [^]
			אחוז הגידול בסה"כ מוגבלים 2001-1990
15		67	

מקורות: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997, (עיבוד מיוחד);
באר, ש. 2003. מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך, 1999

* מתוך האוכלוסייה המתאימה
[#] זקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה
 מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, ניידות בתוך הבית
[^] דיירים תשושים, סיעודיים ותשושי נפש

לוח 2.19: בני +65 בקהילה אשר נפלו במהלך חצי השנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (אחוזים) - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

נשים	גברים	סה"כ	
23.9	14.0	19.6	כלל בני +65
			גיל
19.8	9.0	15.1	בני 65-74
26.5	15.6	21.7	בני 75-79
33.7	27.9	31.2	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
24.4	14.3	20.1	יהודים ואחרים*
23.4	10.3	18.3	מזה: עולי בריה"מ לשעבר [#]
15.0	8.1	11.8	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים*
18.9	12.8	16.2	ישראל
30.6	19.6	25.6	אסיה-אפריקה
22.5	12.1	18.2	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
[#] שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.20: בני +65 שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וסוג הנפגע, 2001 (מספרים מוחלטים)

פצועים קל	פצועים קשה	הרוגים	סה"כ	
1,395	297	96	1,788	בני +65
817	147	62	1,026	סה"כ
578	150	34	762	גברים
				נשים
				בני 65-74
913	158	43	1,114	סה"כ
562	68	26	656	גברים
351	90	17	458	נשים
				בני +75
482	139	53	674	סה"כ
255	79	36	370	גברים
227	60	17	304	נשים
				בני +65 לפי סוג הנפגע
413	187	50	650	הולך רגל
499	47	21	567	נהג רכב
430	51	17	498	נוסע ברכב
53	12	8	73	אחר

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים 2001, חלק א': סיכומים כלליים

לוח 2.21: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל ומין, 2001 (שיעורים ל-100,000 נפש)

פצועים קל	פצועים קשה	הרוגים	סה"כ	
				כלל האוכלוסייה
534	41	8	584	סה"כ
679	56	13	748	גברים
393	26	4	423	נשים
				בני +65
136	29	9	174	סה"כ
182	33	14	228	גברים
100	26	6	132	נשים
				בני 65-74
261	45	12	319	סה"כ
364	44	17	425	גברים
180	46	9	235	נשים
				בני +75
171	49	19	240	סה"כ
224	69	32	325	גברים
136	36	10	181	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים 2001, חלק א': סיכומים כלליים; למ"ס, שנתון סטטיסטי, 2002

לוח 2.22: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות
(שיעורים ל-100,000 נפש)

מזה: הרוגים		סה"כ נפגעים		
בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה	
24	9	378	442	1985
23	9	459	594	1990
23	9	408	818	1996
21	9	385	814	1997
21	9	379	826	1998
18	8	363	743	1999
9	8	174	584	2001

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב, בריאות בישראל, נתונים נבחרים; למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים (שנים נבחרות) חלק א': סיכומים כלליים

לוח 2.23: נהגים בני +65 וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2001

תאונות				
קלות	קשות	קטלניות	סה"כ	
1,210	130	49	1,389	מספרים מוחלטים
				סה"כ בני +65
				גיל
885	93	33	1,011	בני 65-74
325	37	16	378	בני 75+
				מין
1,046	112	48	1,206	גברים
164	18	1	183	נשים
				שיעורים ל-10,000 נהגים*
112	12	3	127	כלל הנהגים
141	16	4	162	גברים
62	4	1	67	נשים
				בני +65
74	8	3	85	סה"כ
84	9	4	97	גברים
42	5	0	46	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, 2001, חלק א': סיכומים כלליים; למ"ס, מצבת הנהגים בישראל, 2000; למ"ס, מצבת הנהגים בישראל, 2001

* ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2000 ובסוף 2001

לוח 2.24: בני +65 אשר אושפזו בשנה האחרונה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה
ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000 (אחוזים)

נשים	גברים	סה"כ	
22.1	25.7	23.7	כלל בני +65
			גיל
18.8	23.9	21.0	בני 65-74
27.2	28.5	27.0	בני +75
			קבוצת אוכלוסייה
21.7	25.2	23.2	יהודים ואחרים*
28.9	34.6	31.4	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים*
15.6	20.4	17.8	ישראל
22.1	26.5	24.1	אסיה
25.7	27.9	26.7	אפריקה
23.5	25.8	24.5	אירופה-אמריקה
18.8	23.7	20.7	בריה"מ לשעבר [#]

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.25: אשפוזים במחלקות כלליות* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות (שיעורים ל-1,000 נפש)

#2000	1995	1990	1987	
				בני 65+
528.9	482.5	407.0	341.6	סה"כ
612.5	567.4	470.9	391.2	גברים
466.9	418.1	354.3	299.0	נשים
				בני 74-65
				סה"כ
423.1	402.1	342.2	293.8	גברים
500.5	478.7	400.8	338.9	נשים
362.7	342.9	294.3	255.4	
				בני 84-75
				סה"כ
610.3	572.7	477.4	402.9	גברים
710.6	673.0	548.1	457.4	נשים
539.0	498.8	419.3	354.3	
				בני 85+
				סה"כ
831.2	716.9	586.4	463.7	גברים
951.9	825.7	671.2	529.0	נשים
754.9	638.3	520.5	416.4	
				כלל האוכלוסייה
				סה"כ
152.4	144.1	123.3	110.4	גברים
152.5	142.0	121.8	108.9	נשים
152.2	145.7	124.8	111.9	

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות
הנתון לשנת 2000 הוא אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל במשרד הבריאות, ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז כללי

לוח 2.26: אשפוזים של בני 65+ במחלקות כלליות* מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות (אחוזים)

	#2000	1995	1990	1987	
בני 65+					
סה"כ	34.0	31.9	30.0	27.5	
גברים	33.9	33.1	31.8	29.6	
נשים	34.0	30.9	28.2	25.4	
בני 75+					
סה"כ	18.7	15.9	15.4	13.4	
גברים	17.9	16.1	16.1	14.4	
נשים	19.5	15.8	14.7	12.4	
בני 85+					
סה"כ	5.7	4.1	3.0	2.3	
גברים	6.2	4.0	3.1	2.3	
נשים	5.1	4.1	3.0	2.3	

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות
 # הנתון לשנת 2000 הוא אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל במשרד הבריאות, ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז כללי

לוח 2.27: בני +65 מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות (אחוזים)

#2000	1995	1990	1987	
34.0	31.9	30.0	27.5	כלל המחלקות הכלליות*
58.2	57.9	55.2	51.4	פנימית
45.8	48.0	46.4	43.6	ריאות
96.0	91.8	79.4	81.1	גריאטריה אקוטית
34.0	34.9	33.7	32.5	נירולוגיה
38.1	38.0	38.5	31.5	אונקולוגיה
32.1	33.7	31.1	33.5	עור ומין
48.1	47.2	43.8	44.6	טיפול נמרץ כללי
50.1	45.3	44.4	43.1	טיפול נמרץ לב
60.5	52.7	47.2	41.4	טיפול נמרץ נשימתי
27.2	27.5	26.2	26.3	כירורגיה כללית
32.5	30.0	25.2	22.6	אורתופדיה
40.4	40.4	41.7	40.6	אורולוגיה
28.5	22.6	23.7	21.5	נירוכיורגיה
47.4	43.8	36.4	30.4	כירורגיה חזה ולב
55.4	49.4	45.8	39.3	כירורגיה כלי דם
28.3	15.1	22.0	21.0	כירורגיה פלסטית
58.5	55.5	56.4	51.5	עיניים
12.9	10.6	10.0	11.1	אף-אוזן-גרון
11.7	14.8	15.1	9.8	פה ולסת
4.0	5.5	4.0	3.7	נשים
37.3	38.9	39.7	42.1	השהיה

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב, "מאגר מידע מרכזי אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות
 # הנתון לשנת 2000 הוא אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי – אשפוזים" המנוהל במשרד הבריאות ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז כללי

לוח 2.28: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2000#
(אחוזים)

סה"כ	גברים	נשים	
100.0	100.0	100.0	סה"כ מחלקות כלליות*
54.5	53.5	55.4	פנימית
0.4	0.5	0.3	ריאות
3.4	2.9	3.9	גריאטריה אקוטית
1.5	1.6	1.3	נוירולוגיה
1.3	1.4	1.2	אונקולוגיה
0.4	0.4	0.4	עור ומין
1.5	1.6	1.3	טיפול נמרץ כללי
3.5	4.3	2.8	טיפול נמרץ לב
0.2	0.2	0.2	טיפול נמרץ נשימתי
12.2	12.2	12.2	כירורגיה כללית
4.7	3.2	6.2	אורתופדיה
3.6	6.0	1.2	אורולוגיה
0.6	0.6	0.5	נוירוכירורגיה
1.5	2.0	1.1	כירורגיה חזה ולב
1.2	1.5	0.8	כירורגיה כלי דם
0.6	0.7	0.5	כירורגיה פלסטית
4.6	4.0	5.2	עיניים
1.0	1.1	0.8	אף-אוזן-גרון
0.1	0.1	0.1	פה ולסת
1.0	0.0	1.9	נשים
2.3	2.1	2.5	השהיה

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"

* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות
הנתונים הם אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל במשרד הבריאות ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז כללי

לוח 2.29: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה
שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2000# (ימים)

בני 65+			כלל האוכלוסייה			כלל המחלקות הכלליות*
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
6.0	5.8	5.9	4.4	4.6	4.5	
5.2	5.0	5.1	4.7	4.4	4.5	פנימית
7.6	6.2	6.7	5.8	6.3	6.1	ריאות
11.9	11.5	11.7	12.0	11.6	11.8	גריאטריה אקוטית
10.1	8.4	9.1	7.2	6.7	6.9	נוירולוגיה
6.4	5.3	5.8	5.5	4.8	5.1	אונקולוגיה
9.3	9.7	9.5	8.0	8.1	8.0	עור ומין
4.7	10.1	8.0	13.0	13.8	13.5	השתלת מוח עצם
7.5	6.8	7.1	6.5	6.1	6.3	טיפול נמרץ כללי
3.3	3.4	3.4	3.1	3.3	3.2	טיפול נמרץ לב
8.3	6.8	7.5	7.2	6.1	6.5	טיפול נמרץ נשימתי
5.1	4.9	5.0	3.1	3.4	3.2	כירורגיה כללית
8.4	8.3	8.3	6.6	5.3	5.9	אורתופדיה
5.5	5.7	5.6	4.9	4.6	4.7	אורולוגיה
10.0	9.7	9.8	8.2	7.6	7.8	נוירוכירורגיה
8.1	7.8	7.9	7.5	7.0	7.1	כירורגיה חזה ולב
6.4	5.7	5.9	5.7	5.3	5.4	כירורגיה כלי דם
8.0	7.0	7.4	6.2	6.8	6.5	כירורגיה פלסטית
2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	2.8	עיניים
4.8	4.9	4.9	3.3	3.3	3.3	אף-אוזן-גרון
4.2	4.1	4.2	3.6	3.9	3.8	פה ולסת
4.7	0.0	4.7	2.5	1.1	2.5	נשים
1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	השהיה

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"

* לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל שהייה במחלקות יולדות
הנתונים הם אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל במשרד הבריאות ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז כללי

לוח 2.30: בני +65 וכלל האוכלוסייה הממתינים לאשפוז, לפי משך ההמתנה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

סה"כ	עד חודש	2-1 חודשים	3 חודשים ויותר	
				אלפים
50.0	18.2	10.7	19.8	כלל האוכלוסייה
16.7	7.1	(2.6)	6.6	כלל בני +65
				שיעורים ל-1,000 נפש
9	3	2	3	כלל האוכלוסייה
29	12	(5)	11	כלל בני +65

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

לוח 2.31: בני +65 וכלל האוכלוסייה המאושפזים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, סוף 2001 (מספרים מוחלטים)

סה"כ	גברים	נשים	
63	29	34	בני +65
52	24	28	בני 65-74
9	5	4	בני 75-84
2	0	2	בני +85
1,043	583	460	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.32: בני +65 וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, סוף 2001

נשים	גברים	סה"כ	
			מספרים מוחלטים
516	353	869	כלל בני +65
289	254	543	בני 74-65
185	83	268	בני 84-75
42	16	58	בני 85+
1,989	3,082	5,071	כלל האוכלוסייה
			שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה
1.4	1.3	1.4	כלל בני +65
1.5	1.6	1.5	בני 74-65
1.4	0.9	1.2	בני 84-75
1.0	0.6	0.9	בני 85+
0.6	1.0	0.8	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.33: בני +65 המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני +65, והמאושפזים בכלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות - סוף שנה (שיעורים ל-1,000 נפש)

	2001	2000	1999	1998	1990	
						כלל בני +65
	1.4	1.5	2.0	2.3	3.5	סה"כ
	1.3	1.4	1.9	2.1	3.1	גברים
	1.4	1.5	2.0	2.4	3.9	נשים
						בני 65-74
	1.5	1.7	2.1	2.5	3.6	סה"כ
	1.6	1.7	2.3	2.5	3.7	גברים
	1.5	1.6	2.0	2.4	3.5	נשים
						בני 75-84
	1.2	1.3	1.8	2.0	3.6	סה"כ
	0.9	1.0	1.5	1.7	2.3	גברים
	1.4	1.5	2.0	2.3	4.5	נשים
						בני +85
	0.9	1.0	1.6	1.9	3.1	סה"כ
	0.6	0.6	1.2	1.4	1.8	גברים
	1.0	1.2	1.9	2.2	4.0	נשים
						כלל האוכלוסייה
	0.8	0.8	1.0	1.0	1.8	סה"כ
	1.0	1.0	1.2	1.2	2.1	גברים
	0.6	0.7	0.8	0.8	1.5	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.34: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות (מספרים מוחלטים)

2001	2000	1999	1998	1997	1990	
						כלל בני +65
1,751	1,867	1,814	1,983	1,869	1,412	סה"כ
636	641	643	674	652	526	גברים
1,115	1,226	1,171	1,309	1,217	886	נשים
						בני 65-74
1,062	1,117	1,111	1,272	1,246	892	סה"כ
401	408	391	442	440	321	גברים
661	709	720	830	806	571	נשים
						בני 75-84
587	621	568	594	498	467	סה"כ
195	186	179	171	157	181	גברים
392	435	389	423	341	286	נשים
						בני +85
102	129	135	117	125	53	סה"כ
40	47	73	61	55	24	גברים
62	82	62	56	70	29	נשים
						כלל האוכלוסייה
17,869	18,172	17,640	17,210	16,181	12,262	סה"כ
10,594	10,632	10,350	9,971	9,331	6,788	גברים
7,275	7,540	7,290	7,239	6,850	5,474	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.35: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2001

בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	
מספרים מוחלטים				
סה"כ קבלות				
102	587	1,062	1,751	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
14	160	445	619	הפרעות פסיכוטיות חריפות
2	4	17	23	הפרעות אפקטיביות
20	243	405	668	הפרעות אורגניות
54	142	103	299	הפרעות ניאורוטיות
4	23	41	68	הפרעות אישיות
2	7	23	32	סמים ואלכוהול
2	3	8	13	פיגור שכלי
0	0	7	7	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
3	4	11	18	לא רשום/לא ידוע
1	1	2	4	
אחוזים				
סה"כ קבלות				
100.0	100.0	100.0	100.0	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
13.7	27.3	41.9	35.4	הפרעות פסיכוטיות חריפות
2.0	0.7	1.6	1.3	הפרעות אפקטיביות
19.6	41.4	38.1	38.1	הפרעות אורגניות
52.9	24.2	9.7	17.1	הפרעות ניאורוטיות
3.9	3.9	3.9	3.9	הפרעות אישיות
2.0	1.2	2.2	1.8	סמים ואלכוהול
2.0	0.5	0.8	0.7	פיגור שכלי
0.0	0.0	0.7	0.4	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
2.9	0.7	1.0	1.0	לא רשום/לא ידוע
1.0	0.2	0.2	0.2	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.36: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, 2001

נשים	גברים	סה"כ	
			מספרים מוחלטים
298	213	511	כלל בני +65
139	102	241	בני 74-65
118	81	199	בני 84-75
41	30	71	בני 85+
1,774	2,458	4,232	כלל האוכלוסייה
			שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה
0.8	0.8	0.8	כלל בני +65
0.7	0.7	0.7	בני 74-65
0.9	0.9	0.9	בני 84-75
1.0	1.2	1.1	בני 85+
0.5	0.8	0.7	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.37: פטירות של בני +65 לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2000
(שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה)

אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		סה"כ		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
בני +65						
46.6	57.4	43.7	52.7	43.9	53.0	שיעורים גולמיים
55.9	61.6	41.9	54.5	42.6	54.9	שיעורים מתוקננים [#]
19.2	27.6	12.2	20.3	12.7	20.9	בני 69-65
35.5	46.8	21.3	32.5	22.1	33.3	בני 74-70
47.9	61.4	37.7	52.5	38.2	52.9	בני 79-75
92.8	87.8	71.1	85.5	72.0	85.6	בני 84-80
183.9	163.6	151.7	172.9	152.8	172.2	בני +85

מקורות: למ"ס, שנתון סטטיסטי, 2002; עיבוד מיוחד מבוסס על נתוני הלמ"ס וקובץ אוכלוסייה לשנת 2000

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
אוכלוסיית התקן היא סך כל האוכלוסייה הממוצעת (גברים ונשים) בשנת 2000, לפי קבוצת גיל

לוח 2.38: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות (אחוזים)

סה"כ	נשים	גברים	
			1998
68.0	66.8	69.3	בני 65+
71.6	71.6	68.8	בני 74-65
67.3	65.4	69.6	בני 75+
62.4	70.8	57.4	בני 64-0
66.8	67.5	66.1	כלל האוכלוסייה
			1999
68.6	67.7	69.7	בני 65+
70.0	70.0	69.9	בני 74-65
68.2	67.0	69.6	בני 75+
62.1	71.1	56.5	בני 64-0
67.2	68.3	66.2	כלל האוכלוסייה
			2000
68.5	67.3	69.8	בני 65+
70.6	71.6	69.8	בני 74-65
67.8	66.1	69.8	בני 75+
60.8	69.4	55.8	בני 64-0
66.8	67.6	65.9	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות

* כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

לוח 2.39: פטירות של יהודים ואחרים* בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2000
(שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה)

	בני 75+	בני 65-74	בני +65	
				גברים
	88	26	53	כלל הגברים #
	90	27	50	אסיה
	102	32	55	אפריקה
	89	26	57	אירופה-אמריקה
	88	30	51	מזה: עולי בריה"מ לשעבר [^]
				נשים
	75	17	43	כלל הנשים #
	79	17	40	אסיה
	83	19	41	אפריקה
	75	17	47	אירופה-אמריקה
	74	19	43	מזה: עולי בריה"מ לשעבר [^]

מקורות: למ"ס, שנתון סטטיסטי, 2001, 2002; למ"ס, אוכלוסייה, תנועות דמוגרפיות ומשקי בית, 1999

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
כולל ילידי ישראל ויבשת לידה לא ידועה
[^] שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.40: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה לפי מין, 1998
(שיעורים ל-100,000 נפש)

כלל האוכלוסייה		בני 65+		סה"כ
נשים	גברים	נשים	גברים	
598	640	4,507	5,477	
12	13	91	106	מחלות זיהומיות
143	154	918	1,328	שאתות ממאירות
42	35	331	347	סוכרת
15	9	15	90	יתר לחץ-דם
29	35	244	319	אוטם חריף של שריר הלב
76	86	656	876	מחלת לב איסכמית אחרת
46	41	373	362	מחלות לב אחרות
48	41	405	422	מחלות של כלי דם במוח
4	6	56	56	מחלות אחרות של מחזור הדם
12	12	103	122	דלקת ריאות
8	9	90	90	יתר מחלות מערכת הנשימה
4	7	29	52	מחלות כבד
13	15	102	147	מחלות כליה
31	46	227	324	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
95	83	676	677	כל המחלות האחרות*
4	14	17	34	תאונות דרכים
3	8	7	23	פגיעה עצמית מכוונת
14	24	94	101	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד מבוסס על נתוני למ"ס משנתון סטטיסטי 2002

* כולל: מומים מולדים וסיבות מסב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בני 65+

לוח 2.41: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ לפי גיל, 1998

קבוצת גיל					כלל האוכלוסייה	סה"כ פטירות במספרים מוחלטים
בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	בני 65+		
4,141	5,412	4,157	13,710	18,853		
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים	
2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	מחלות זיהומיות	
17.4	24.4	30.9	24.3	24.1	שאתות ממאירות	
5.3	6.3	7.4	6.3	5.5	סוכרת	
1.6	1.8	1.4	1.6	1.4	יתר לחץ-דם	
5.0	6.5	5.7	5.8	5.5	אוטם חריף של שריר הלב	
18.5	15.9	13.6	16.0	13.4	מחלת לב איסכמית אחרת	
8.1	6.5	5.2	6.6	6.4	מחלות לב אחרות	
8.4	7.9	6.8	7.7	6.4	מחלות של כלי דם במוח	
0.9	1.1	0.9	1.0	0.9	מחלות אחרות של מחזור הדם	
3.6	1.9	1.2	2.2	1.9	דלקת ריאות	
2.1	1.5	1.4	1.7	1.4	יתר מחלות מערכת הנשימה	
0.5	1.1	1.3	1.0	1.1	מחלות כבד	
3.6	2.4	2.1	2.7	2.3	מחלות כליה	
4.8	5.4	7.8	5.9	7.2	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	
15.1	12.4	9.5	12.4	13.0	כל המחלות האחרות*	
0.3	0.7	0.8	0.6	2.2	תאונות דרכים	
0.3	0.4	0.6	0.4	1.3	פגיעה עצמית מכוונת	
2.3	1.9	1.3	1.8	3.8	כל הסיבות החיצוניות האחרות	

מקור: עיבוד מיוחד מבוסס על נתוני למ"ס משנתון סטטיסטי 2002

* כולל מומים מולדים וסיבות מסב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בני 65+

לוח 2.41: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +65 לפי גיל, 1998

קבוצת גיל					כלל האוכלוסייה	
בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	בני 65+		
5,705	5,820	3,527	15,052	18,100	סה"כ פטירות במספרים מוחלטים	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים	
2.5	1.7	1.8	2.0	2.0	מחלות זיהומיות	
12.4	20.6	33.2	20.4	23.9	שאתות ממאירות	
5.4	7.9	9.7	7.3	7.0	סוכרת	
3.9	2.6	1.8	2.9	2.5	יתר לחץ-דם	
4.5	6.3	5.5	5.4	4.8	אוטם חריף של שריר הלב	
18.0	13.6	10.4	14.6	12.7	מחלת לב איסכמית אחרת	
11.0	7.2	5.6	8.3	7.7	מחלות לב אחרות	
8.9	10.0	7.5	9.0	8.0	מחלות של כלי דם במוח	
0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	מחלות אחרות של מחזור הדם	
3.3	2.0	1.1	2.3	2.0	דלקת ריאות	
1.5	1.4	1.1	1.3	1.3	יתר מחלות מערכת הנשימה	
0.2	0.8	1.0	0.6	0.7	מחלות כבד	
2.7	2.1	1.8	2.3	2.2	מחלות כליה	
4.6	5.2	5.4	5.0	5.2	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	
17.5	15.0	10.8	15.0	15.9	כל המחלות האחרות*	
0.2	0.5	0.5	0.4	0.8	תאונות דרכים	
0.0	0.2	0.3	0.2	0.5	פגיעה עצמית מכוונת	
2.4	2.1	1.4	2.1	2.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות	

מקור: עיבוד מיוחד מבוסס על נתוני למ"ס משנתון סטטיסטי 2002

* כולל מומים מולדים וסיבות מסב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בנות +65

לוח 2.42: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +65 בין קופות החולים לפי גיל, שנים נבחרות (אחוזים)

בני 75+	בני 74-65	בני 65+	כלל האוכלוסייה	
נובמבר 1996				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
79.6	77.1	78.1	60.2	שירותי בריאות כללית
9.7	11.2	10.6	20.4	מכבי שירותי בריאות
6.5	7.4	7.0	9.6	קופת חולים לאומית
4.2	4.3	4.3	9.8	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 1997				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
78.9	75.8	77.1	58.6	שירותי בריאות כללית
10.2	11.9	11.2	21.1	מכבי שירותי בריאות
6.6	7.6	7.2	10.1	קופת חולים לאומית
4.3	4.7	4.5	10.3	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 1998				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
78.0	74.8	76.2	58.0	שירותי בריאות כללית
10.8	12.6	11.8	21.7	מכבי שירותי בריאות
6.7	7.7	7.3	9.9	קופת חולים לאומית
4.5	4.9	4.7	10.3	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 1999				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
77.2	73.5	75.1	57.2	שירותי בריאות כללית
11.4	13.6	12.6	22.4	מכבי שירותי בריאות
6.9	7.8	7.4	10.0	קופת חולים לאומית
4.6	5.2	4.9	10.5	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2000				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
76.4	72.0	73.9	56.3	שירותי בריאות כללית
11.9	14.6	13.4	23.1	מכבי שירותי בריאות
7.0	7.9	7.5	9.9	קופת חולים לאומית
4.8	5.5	5.2	10.7	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2001				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
75.5	70.8	72.9	55.6	שירותי בריאות כללית
12.5	15.5	14.1	23.5	מכבי שירותי בריאות
7.1	7.9	7.5	10.0	קופת חולים לאומית
4.9	5.8	5.4	10.9	קופת חולים מאוחדת

מקור: המוסד לביטוח לאומי, חברות בקופת חולים, שנים נבחרות

לוח 2.43: בני +65 מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות (אחוזים)

קופת חולים מאוחדת	קופת חולים לאומית	מכבי שירותי בריאות	שירותי בריאות כללית	סה"כ	
4.1	7.2	4.9	13.1	10.2	דצמבר 1994
4.4	7.4	5.1	12.9	10.1	דצמבר 1995
4.4	7.3	5.2	13.0	10.0	נובמבר 1996
4.4	7.2	5.4	13.2	10.1	נובמבר 1997
4.6	7.4	5.5	13.2	10.0	נובמבר 1998
5.6	4.7	7.4	13.1	10.0	נובמבר 1999
5.8	4.8	7.5	13.1	10.0	נובמבר 2000
6.0	5.0	7.5	13.1	10.0	נובמבר 2001

מקור: המוסד לביטוח לאומי, חברות בקופות חולים, שנים נבחרות

לוח 2.44: בעלי ביטוח בריאות משלים וביטוחי בריאות נוספים בקרב בני 65+
ובכלל האוכלוסייה, לפי שנה ומין (אחוזים)

כלל האוכלוסייה			בני 65+			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
ביטוח בריאות משלים*						
40.0	35.0	37.5	30.0	22.0	27.0	1997
52.0	50.0	51.0	31.5	37.0	34.0	1999
66.0	62.0	65.0	58.0	58.0	58.0	2001
ביטוח בריאות פרטי#						
22.0	29.0	26.0	5.0	21.0	12.0	2001
ביטוח סיעודי פרטי^						
27.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	2001

מקורות: גרוס, ר.; ברמלי-גרינברג, ש. 2000. לקט נתונים על ביטוחי בריאות משלימים ומסחריים 1995-1999, ג'וינט-מכון ברוקדייל; גרוס, ר.; ברמלי-גרינברג, ש. 2003. שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל, ג'וינט-מכון ברוקדייל

* תכניות לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) המשוקות למבוטחים של קופות החולים בידי הקופות, שהן מלכריים

ביטוחים המשוקים בידי חברות ביטוח, שהן למטרות רווח

^ הביטוח הסיעודי משוק כולו בידי חברות ביטוח