

פרק 2
מאפיינים בריאותיים של הקשישים
ודפוס שימוש בשירותי בריאות נבחרים



— לקט נתונים —

❖ תוחלת החיים, 2014

	גברים	נשים
בלידה	80.3	84.1
בגיל 65	19.0	21.2

❖ בני 65+ התופסים את מצב בריאותם כ"טוב" או "טוב מאד", 2014, אחוזים

	סה"כ	גברים	נשים
טוב	42.8	43.7	42.1
טוב מאוד	12.9	16.3	10.2

❖ אומדן בני 65+ שלהם קושי רב בביצוע פעולות שונות, 2014, אחוזים

	ללכת או לעלות במדרגות	לבצע להתלבש או פעולות להרחיף משק בית
	33.5	14.4
		30.1

❖ בני 65+ המדווחים על קבלת חיסון נגד שפעת, 2010, 57.0%

❖ ביקורים אצל רופא של בני 65+ במהלך שנה, 2009, ממוצע לנפש

	סה"כ	גברים	נשים
	11.2	10.8	11.6

❖ אשפוזים של בני 65+ במחלקות כלליות, 2014,

שיעורים ל-1,000 נפש

432

❖ סיבות פטירה עיקריות של בני 65+, 2013,

שאתות ממאירות

23.3%

מחלות לב

16.9%

מחלות של כלי דם במוח

6.3%

סוכרת

6.1%

2. מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של הקשישים בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאות הקשישים.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של הקשיש. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של הקשישים בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ◆ **תוחלת החיים בלידה** הגיעה בשנת 2014 ל-85 שנים לנשים ול-81 שנים לגברים. תוחלת החיים של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת 2014 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 4 שנים לגברים ו-3 שנים לנשים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** בשנים 2010-2014 היא 21 שנים לנשים ו-19 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 86 בממוצע, וגבר – עד גיל 84. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 13 שנים ולגברים 12 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.3 שנים ושל נשים בנות 75 ב-3.9 שנים. גברים ונשים שהגיעו לגיל 95 צפויים לחיות עוד 3.4 שנים בממוצע (לוח 2.3).
- ◆ ב-2013 עמד **שיעור הפטירה** המתוקן ל-1,000 בני +65 על 44 בקרב הגברים ועל 35 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקן ל-1,000 בני +65 בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים: 49 בקרב הגברים ו-45 בקרב הנשים (לוח 2.4).
- בשנת 2013 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני +65 ילידי ישראל היה 41, בקרב ילידי אסיה 38, בקרב ילידי אפריקה 35 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 48. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני +65 ילידי בריה"מ לשעבר הוא 42 (לוח 2.5).
- שישים ושישה אחוזים מבני +65 **נפטרו בבית חולים** בשנת 2014, לעומת 63% מבני 0-64. בקרב בני +65 69% מהגברים ו-64% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 60% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 70% מהנשים (לוח 2.6).
- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני +65 והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בקרב בני +65 סיבות עיקריות נוספות הן מחלת לב איסכמית, מחלות של כלי דם במוח, סוכרת ומחלות זיהומיות (לוח 2.7).

- ב-2013 נפטרו 33,230 אנשים בגיל +65, שהם 80% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. עם השנים חלקם של בני 65-74 בכלל הפטירות של בני +65 הולך ופוחת. בשנת 2003 היה חלקם של בני 65-74 מתוך הפטירות של בני +65 23% לעומת 19% ב-2013 (לוח 2.9 א ונתונים משנתונים קודמים).

- **סיבות הפטירה העיקריות** בקרב הקשישים הן שאתות ממאירות (23%) ומחלות לב שונות (17%). בקרב הגברים, אין כמעט הבדל בין בני +65 לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתוך סך הפטירות (כ-26%); ובקרב הנשים בנות +65 השיעור (22%) נמוך מאשר בקרב הנשים בכלל האוכלוסייה (26%); (לוחות 2.9 א, ב, ג).

- עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, מחלות אחרות של מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-20% בקרב בני 65-74 ל-31% בקרב בני +85. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-40% בקרב בני 65-74 ל-15% בקרב בני +85 (לוח 2.9 א).

♦ בשנת 2011 נרשמו 72 **התאבדויות** של גברים בני 65 ומעלה ו-15 התאבדויות של נשים בנות 65 ומעלה. אחוז ההתאבדויות של בני +65 מכלל ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ-31% ב-1981 ל-21% ב-2011 (לוח 2.10).

♦ על פי הסקר החברתי, בשנת 2014 56% מבני 65 ומעלה מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד**, לעומת 85% בקרב בני 20 ומעלה. בקרב בני +65, 60% מהגברים ו-52% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 14% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב, לעומת 4% בקרב בני 20 ומעלה (לוח 2.11).

♦ על פי הסקר החברתי, בשנת 2010 47% מבני +65 **עוסקים בפעילות גופנית**. 36% מבני +65 עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע, 40% מהגברים ו-32% מהנשים. 38% מבני 65-74 עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע ו-33% מבני +75. בקרב כלל האוכלוסייה, 31% עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע. מתוך בני +65

העוסקים בפעילות גופנית, 86% עוסקים בפעילות גופנית מתונה ו-12% עוסקים בפעילות גופנית מאומצת. 28% עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק השרירים. מבין בני +65 שאינם עוסקים בפעילות גופנית 60% ציינו שהסיבה היא בעיה בריאותית או גופנית ו-12% ציינו שהסיבה היא חוסר חשיבות לפעילות הגופנית. רק 3% ציינו שהסיבה היא העדר תנאים מתאימים (לוח 2.12).

♦ **מדד מסת הגוף (BMI) מחושב על-פי גובה ומשקל.** ערכים שמעל 30 נחשבים להשמנת יתר. על פי הסקר החברתי של 2010 ל-16% בקרב כלל האוכלוסייה יש BMI של 30 ויותר. לעומת זאת, ל-23% מבני 65 ומעלה יש BMI של 30 ויותר (25% מבני 65-74 ו-20% מבני 75 ומעלה). 26% מהנשים סובלות מהשמנת יתר, לעומת 19% מהגברים. בקרב הערבים 27% סובלים מהשמנת יתר לעומת 22% בקרב יהודים ואחרים. אחוז הנשים הערביות הסובלות מהשמנת יתר גבוה במיוחד, 37% (לוח 2.13).

♦ על פי הסקר החברתי של 2010 12% מהקשישים **מעשנים** כיום, פעם בשבוע לפחות, לעומת 25% בכלל האוכלוסייה. אחוז המעשנים בקרב הגברים בני +65, כפול מאחוז הנשים בנות +65 המעשנות (16% לעומת 8%). 34% מבני +65 עישנו בעבר והפסיקו. מבין המעשנים שהפסיקו, 25% עשו זאת בגיל 50-59 ו-26% בגיל 60 ומעלה (לוח 2.14).

♦ על פי הסקר החברתי, בשנת 2010 55% מבני 65 ומעלה מדווחים על **קושי כלשהו להירדם** או לישון במשך לילה שלם לעומת 39% בקרב כלל האוכלוסייה. 52% אחוזים מהגברים בני 65-74 מדווחים על קושי מסוג זה ו-60% מבני +75. מבין אלה שדיווחו על בעיות שינה (בקרב בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה) 84% דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום בגלל בעיות שינה (לוח 2.15).

♦ על פי סקר בריאות 2009, 54% מבני +65 דיווחו כי רופא אבחן אצלם יתר לחץ דם, 49% מהגברים ו-57% מהנשים. 11% בקרב כלל האוכלוסייה דיווחו על כך. 13% מבני +65 דיווחו שרופא אבחן אצלם התקף לב או אוטם שריר הלב, 18% בקרב הגברים ו-9% בקרב הנשים (2% בקרב כלל האוכלוסייה). 23% מבני +65 דיווחו כי רופא אבחן אצלם סוכרת (5% בקרב כלל האוכלוסייה). 12% דיווחו על בעיה כרונית במערכת העיכול, 9% בקרב

הגברים ו-14% בקרב הנשים (3% בקרב כלל האוכלוסייה). 8% מבני +65 דיווחו כי רופא אבחן אצלם דיכאון או חרדה, 5% בקרב הגברים ו-11% בקרב הנשים (3% בקרב כלל האוכלוסייה); (לוח 2.16).

- מקרב אלו שדיווחו כי רופא אבחן אצלם מחלות, רובם **נוטלים תרופות** על פי מרשם רופא בגלל מחלות אלו: יתר לחץ דם (96%), התקף לב, אוטם שריר הלב (88%), שבץ מוחי (75%), סוכרת (92%), אסתמה (85%), מחלת ריאות כרונית (71%), בעיה כרונית במערכת העיכול (82%), מחלה ממארת – סרטן (42%), דיכאון או חרדה (72%); (לוח 2.16).

♦ בשנת 2012 נרשמו 13,941 **מקרים חדשים של שאתות ממאירות** בקרב בני +65, אשר מהווים 1,775 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים בכלל האוכלוסייה הוא 285 לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. בשונה מכלל האוכלוסייה, שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים הקשישים גבוה יותר מאשר בקרב הנשים הקשישות (2,170 לעומת 1,471 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.17).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה מעט גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים. שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,505 לעומת 1,095 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.18). בשנת 2012 שיעור המקרים החדשים בקרב גברים יהודים ואחרים ילידי אירופה-אמריקה היה גבוה מאשר בקרב יהודים ואחרים ילידי אסיה, אפריקה או ישראל. בקרב נשים יהודיות ואחרות, שיעור המקרים החדשים בקרב ילידות ישראל וילידות אירופה-אמריקה (1,559 ו-1,577) גבוה מזה של ילידות אסיה וילידות אפריקה (1,255 ו-1,199 בהתאמה); (לוח 2.19).

♦ לפי נתוני הסקר החברתי¹, בשנת 2014 אומדן בני +65 הגרים בקהילה **ומוגבלים בביצוע** (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע) פעולות

1 הנתונים על מוגבלות שפורסמו בשנתון 2012 היו מבוססים על סקר בריאות לאומי (2009).

הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד על 265 אלף איש והם מהווים 30% מבני 65+ הגרים בקהילה. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 19% בקרב בני 65-74 לעומת 46% בקרב בני 75+. מספרם של בני 65+ המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב-294 אלף איש (34% מבני 65+ הגרים בקהילה). שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 65-74 עומד על 23% ובקרב בני 75+ על 46%. מספר בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב-126 אלף איש והם מהווים 14% מבני 65+ הגרים בקהילה (6% בקרב בני 65-74 ו-24% בקרב בני 75+). 106 אלף איש מוגבלים בראייה ו-97 אלף איש בשמיעה בקרב בני 65+ (12% ו-11% בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב הערבים לעומת היהודים ואחרים. למשל, 52% בקרב הערבים מוגבלים בביצוע פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 28% בקרב יהודים ואחרים (לוח 2.20).

♦ בשנת 2014 נפגעו **בתאונות דרכים** 1,987 בני 65+. מתוכם, 3% נהרגו (65 קשישים), 16% נפצעו קשה (310 קשישים) ו-81% נפצעו קל (1,612 קשישים). בהשוואה לנתוני 2013 ירד מספרם המוחלט של הקשישים שנפגעו. לעומת זאת עלה אחוז ההרוגים ואחוז הפצועים קשה ביחס לחלקם של הפצועים קל. 35% מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 40% נהגו ברכב ו-22% נסעו ברכב. 68% מהקשישים שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (לוח 2.21).

- שיעור בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2014 נמוך מזה שבקרב כלל האוכלוסייה (225 ו-267 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך **שיעור ההרוגים** בקרב בני 65+ כפול מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני 65+ (לוח 2.22). שיעור בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים היה בתהליך ירידה מאז שנות התשעים עד לשנת 2012. ב-2013 חלה עליה בשיעור הנפגעים וב-2014 ירד שוב שיעור הנפגעים (לוח 2.23).

- **שיעור הנהגים בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בשנת 2014 דומה לשיעור בכלל האוכלוסייה, 51 לעומת 55 ל-10,000 נהגים, בהתאמה. בסה"כ היו נהגים בני +65 מעורבים ב-1,986 תאונות מתוך 29 תאונות קטלניות (כ-1% מהתאונות); (לוח 2.24).

♦ שלושים ואחד אחוזים מהקשישים **ביקרו אצל רופא** משפחה (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) או התייעצו אתו בטלפון בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות 2009) לעומת 10% בקרב כלל האוכלוסייה. אצל רופא אורתופד ביקרו 3% מבני +65 בשבועיים האחרונים ואצל קרדיולוג ביקרו 2% מבני +65 בשבועיים האחרונים לפני הסקר. אחוז בני +65 אשר ביקרו אצל רופאים גבוה מאשר האחוז בקרב כלל האוכלוסייה, למעט אצל רופא נשים (לוח 2.25).

- בני +65 **מבקרים** בממוצע **אצל רופא** משפחה (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) כ-11 פעמים בשנה לעומת 3 פעמים בממוצע בשנה בקרב כלל האוכלוסייה. בממוצע, מבקרים בני +65 0.8 פעמים בשנה אצל רופא אורתופד, 0.6 פעמים בשנה אצל רופא עיניים ו-0.5 פעמים בשנה אצל רופא קרדיולוג (לוח 2.26).

- שלושים אחוזים מסך הביקורים (כולל ייעוץ טלפוני) אצל רופא משפחה (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) נעשים על ידי בני +65. 43% מהביקורים אצל רופא פנימי במרפאות חירום או בבתי חולים נעשים על ידי בני +65. 44% מהביקורים אצל רופא קרדיולוג, 42% מהביקורים אצל רופא אורולוג, 32% מהביקורים אצל רופא עיניים, 30% מהביקורים אצל רופא ריאות ו-29% מהביקורים אצל רופא נירולוג נעשים על ידי בני +65 (לוח 2.27).

♦ כמעט כל בני +65 עשו בדיקת דם בשנה האחרונה (96%) ובדיקת כולסטרול (95%). בקרב כלל האוכלוסייה (בני +20) 80% עשו בדיקת דם ו-83% בדקו כולסטרול, בשנה האחרונה לפני הסקר. 44% מבני +65 עשו בדיקת קולונוסקופייה אי פעם. בקרב כלל האוכלוסייה (בני +50) 37% עשו את הבדיקה (לוח 2.28).

- ◆ לפי הסקר החברתי, בשנת 2010, 57% מבני +65 קיבלו חיסון נגד שפעת, 60% מהגברים ו-55% מהנשים. עם העלייה בגיל עולה שיעור מקבלי החיסון: 53% בקרב בני 65-74 לעומת 62% בקרב בני +75. בקרב כלל האוכלוסייה (בני +20) 23% קיבלו חיסון נגד שפעת (לוח 2.29).
- ◆ לפי הסקר החברתי, 38% מבני +65 עברו בדיקה או טיפול שיניים בשנה האחרונה ו-29% עברו ניקוי שיניים. שיעור מקבלי טיפול השיניים יורד עם הגיל: 42% מבני 65-74 עברו בדיקה או טיפול לעומת 33% מבני +75. 50% מקרב כלל האוכלוסייה (+20) עברו בדיקה או טיפול שיניים בשנה האחרונה לפני הסקר (לוח 2.30).
- ◆ מתוך כלל הביקורים במחלקות לרפואה דחופה (חדרי מיון) בשנת 2014, 21% היו של בני +65. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 427 בקרב בני 65-74; 701 בקרב בני 75-84; 1,036 בקרב בני +85 לעומת 304 בקרב כלל האוכלוסייה. 23% מהביקורים של בני +65 היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) לעומת 18% ביקורים חוזרים בקרב כלל האוכלוסייה (לוח 2.31).
- ◆ תשעה עשר אחוזים מהקשישים דיווחו על אשפוז בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות 2009). שיעור האשפוזים עולה עם הגיל: 16% מבני 65-74 דיווחו על אשפוז; 22% מבני +75, לעומת 6% בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוזים בקרב הערבים גבוה יותר ועמד על 24% לעומת שיעור האשפוזים בקרב קבוצת היהודים ואחרים (19%); (לוח 2.32).
- **שיעורי האשפוז של בני +65 במחלקות האשפוז הכלליות גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה.** בשנת 2014 נרשמו 432 אשפוזים ל-1,000 בני +65 במחלקות האשפוז הכלליות, לעומת 136 ל-1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-314 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-725 בגיל +85). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי האשפוז בקרב הזקנים הצעירים (בני 65-74) במגמת ירידה (לוח 2.33).

- בבחינת שיעור אשפוז בני +65 מכלל האשפוזים נמצא, כי בשנת 2014, כשליש (34%) מהאשפוזים היו של בני +65 (המהווים כ-10% מכלל האוכלוסייה), ו-21% מהאשפוזים היו של בני +75 (המהווים כ-5% מכלל האוכלוסייה); (לוח 2.34). חלקם של בני +65 מתוך כלל האשפוזים במחלקות פנימית, טיפול נמרץ נשימתי, ועיניים גבוה במיוחד (ללא גריאטרייה); (לוח 2.35).
- התפלגות האשפוזים של בני +65 במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה כמחצית האשפוזים (לוח 2.36).
- השהייה הממוצעת של בני +65 בכלל המחלקות הכלליות בשנת 2014 הייתה 5.4 ימים לעומת 4.1 ימים בקרב כלל האוכלוסייה. המחלקות שבהן משך השהייה של בני +65 הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם, גריאטרייה חריפה, עור ומין, ואונקולוגיה (לוח 2.37).
- ♦ בשנת 2014 קיבלו 6,379 בני +65 (פחות מ-1% מקרב בני +65) טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי. בני +65 מהווים 11% מכלל המטופלים ב-2014 (לוח 2.38).
- ♦ ב-2014 היו 24 בני +65 באשפוז יום פסיכיאטרי, והם היוו 6% מסך השוהים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 83% מכלל בני +65 השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.39).
- ♦ בסוף 2014 היו 350 בני +65 מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 0.4 מאושפזים ל-1,000 נפש (שיעור דומה לשיעור המאושפזים בקרב כלל האוכלוסייה). עשרה אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני +65 (לוח 2.40). משנת 1990 ועד שנת 2014 חלה ירידה בשיעור בני +65 המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.4 ל-1,000 נפש); (לוח 2.41).
- במהלך 2014 היו 1,899 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, ואלה היוו 8% מסך הקבלות לאשפוז. 56% מהקבלות של בני +65 היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (65% מכלל האשפוזים של בני +65);

(לוח 2.42). שתי האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (71% מהקבלות) היו: סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות, והפרעות אפקטיביות (לוח 2.43).

- 11% מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא בשנת 2014 היו של בני 65+ (לוח 2.44).

♦ בנובמבר שנת 2014 היו 62% מבני 65+ מבוטחים בשירותי בריאות כללית (לעומת 52% מכלל האוכלוסייה), 22% במכבי שירותי בריאות (לעומת 25% מכלל האוכלוסייה), 7% בקופת חולים לאומית ו-9% בקופת חולים מאוחדת (לעומת 9% ו-14% מכלל האוכלוסייה בהתאמה). יש ירידה לאורך השנים באחוז בני 65+ המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 71% בקרב בני 85 ומעלה (לוח 2.45). 13% מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני 65+, 10% במכבי שירותי בריאות, 9% בקופת חולים לאומית ו-7% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.46).

הגדרות והסברים

כלל האוכלוסייה: המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות

של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אומדני המוגבלות בקרב הקשישים הגרים בקהילה, מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנים 2012-2014 בסקר החברתי שנערך על ידי הלמ"ס. לצורך אמידת מספר הקשישים הגרים בקהילה נעשה שימוש בנתונים על אוכלוסיית המוסדות על פי מפקד דיירי המוסדות 2014 של הלמ"ס.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת **סך-כל המחלקות הכלליות** אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

אשפוז פסיכיאטרי: אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

אשפוז מלא: מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

אשפוז יום: מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

קבלות: קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

קבלות ראשונות: קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

נתונים מסקר בריאות

אשפוז: אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוז יום בבתי חולים.

רופא משפחה: רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים במרפאות בקהילה.

רופא שיניים: רופא שיניים ומרפא שיניים, אורתודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

ביקור אצל רופא: ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים או רופא עצמאי בהסדר קופה, במרפאת בית חולים, במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית, במרפאה צבאית וביקור בבית החולה. נכללו התייעצויות בטלפון אך לא נכללו ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

מבקר: אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
 .. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-40%
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומאירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.2	75.1	80.3	76.6	80.0	76.3	1996
76.8	74.3	80.6	76.4	80.1	76.0	1997
76.8	74.4	80.7	76.4	80.3	76.1	1998
78.1	74.9	80.7	77.0	80.4	76.6	1999
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
77.8	74.5	81.6	77.7	81.2	77.3	2001
77.9	74.7	81.9	77.9	81.5	77.5	2002
78.2	74.9	82.2	78.1	81.8	77.6	2003
79.6	75.4	82.7	78.5	82.4	78.0	2004
78.6	74.9	82.6	78.7	82.2	78.2	2005
78.5	75.1	83.0	79.2	82.5	78.7	2006
78.8	75.2	82.8	79.2	82.4	78.7	2007
79.6	75.7	83.3	79.5	83.0	79.0	2008
80.8	76.4	83.7	80.1	83.3	79.6	2009
81.3	76.6	83.9	80.3	83.6	79.7	2010
81.0	76.4	83.8	80.5	83.5	79.9	2011
80.7	76.9	84.0	80.4	83.6	79.9	2011
80.9	78.0	84.3	80.7	83.9	80.3	2013
81.2	76.9	84.5	80.9	84.1	80.3	2014

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי * כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

ערבים*		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
17.2	16.6	18.6	16.4	18.5	16.4	1999-1995
17.2	16.0	19.8	17.7	19.7	17.5	2004-2000
17.8	16.1	20.7	18.6	20.5	18.4	2009-2005
19.1	17.0	21.4	19.3	21.2	19.0	2014-2010

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי
* עד 1995, בני דתות אחרות

לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

בגיל 95		בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
		4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
		5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
		5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
		5.8	5.6	8.1	7.5	11.1	10.1	1999-1995
		6.5	6.5	9.0	8.5	12.1	11.0	2004-2000
		6.8	6.6	9.4	8.7	12.6	11.5	2009-2005
3.4	3.3	6.9	6.4	9.6	8.8	13.1	11.8	2014-2010

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: פטירות של בני +65, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2013

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

ערבים		יהודים ואחרים ⁽¹⁾				סה"כ			
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	סה"כ	
37	39	38	37	41	39	37	41	39	בני +65
13	21	17	7	13	10	8	14	11	בני 65-69
23	30	26	14	22	17	15	23	18	בני 70-74
71	70	71	66	74	69	66	73	69	בני +75
41	46	43	25	36	30	27	37	31	בני 75-79
77	66	72	53	68	59	54	68	60	בני 80-84
135	139	137	131	142	135	131	142	135	בני +85
116	112	114	99	115	105	100	115	106	בני 85-89
165	181	171	172	188	178	172	187	177	בני 90-95
172	180	176	248	202	231	244	199	226	בני +95
45	49	47	34	44	39	35	44	40	שיעורים מתוקננים בני +65 ⁽²⁾

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. אוכלוסיית התקן היא ממוצע (גברים ונשים) של כלל האוכלוסייה בשנת 2013 לפי קבוצת גיל

לוח 2.5: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2013

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

	בני +75			בני 65-74			65+	
	80+	79-75	סה"כ	74-70	69-65	סה"כ		
	102	34	74	20	12	15	43	סה"כ
	109	40	79	25	16	19	45	גברים
	98	29	70	16	9	12	41	נשים
	134	45	81	27	17	21	41	סה"כ ילידי ישראל ⁽²⁾
	145	50	86	31	21	24	44	גברים
	126	40	77	24	13	17	38	נשים
	93	32	66	18	10	13	38	סה"כ ילידי אסיה
	98	36	70	23	12	17	40	גברים
	89	29	64	13	7	10	36	נשים
	93	34	65	19	10	14	35	סה"כ ילידי אפריקה
	94	40	68	23	14	17	38	גברים
	92	29	62	15	7	10	33	נשים
	101	30	76	19	11	14	48	סה"כ ילידי אירופה-אמריקה
	109	38	82	24	14	18	51	גברים
	97	25	73	14	8	10	45	נשים
	97	31	67	19	12	15	42	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
	103	40	73	27	16	21	46	גברים
	93	25	64	14	8	11	39	נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.6: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
2010			
66.9	69.7	68.2	בני 65+
72.2	70.8	71.5	בני 74-65
66.0	69.4	67.5	בני 75+
70.4	58.0	62.7	בני 64-0
67.5	66.7	67.1	כלל האוכלוסייה
2011			
66.5	69.3	67.8	בני 65+
72.0	69.3	70.5	בני 74-65
65.6	69.4	67.2	בני 75+
73.8	60.6	65.6	בני 64-0
67.7	67.1	67.4	כלל האוכלוסייה
2012			
66.8	69.9	68.2	בני 65+
72.5	71.3	71.8	בני 74-65
65.8	69.5	67.4	בני 75+
71.3	61.1	65.0	בני 64-0
67.5	67.7	67.6	כלל האוכלוסייה

←

לוח 2.6: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות (המשך)

אחוזים

	נשים	גברים	סה"כ	
2013				
	65.5	68.6	67.0	בני 65+
	70.3	69.3	69.7	בני 74-65
	64.7	68.4	66.3	בני 75+
	71.3	60.1	64.4	בני 64-0
	66.4	66.5	66.4	כלל האוכלוסייה
2014				
	64.3	68.8	66.4	בני 65+
	67.8	70.1	69.1	בני 74-65
	63.7	68.5	65.8	בני 75+
	69.9	59.5	63.4	בני 64-0
	65.1	66.5	65.8	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות
* כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

לוח 2.7: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2013

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני +65			סה"כ*
גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	
516	513	517	3,746	4,125	3,913	
28	26	27	217	226	221	מחלות זיהומיות
132	133	133	817	1,037	913	שאתות ממאירות
31	27	29	240	240	240	סוכרת
12	8	10	99	69	86	יתר לחץ-דם
14	17	16	116	141	127	אוטם חריף של שריר הלב
30	38	34	245	352	292	מחלת לב איסכמית אחרת
33	24	29	266	211	242	מחלות לב אחרות
31	27	29	248	249	248	מחלות של כלי דם במוח
5	7	6	43	58	50	מחלות אחרות של מחזור הדם
11	12	11	89	109	98	דלקת ריאות
15	16	15	113	146	127	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
13	13	13	100	118	108	יתר מחלות מערכת הנשימה
4	6	5	25	36	30	מחלות כבד
18	20	19	144	195	166	מחלות כליה
3	4	4	1	1	1	מומים מולדים
27	34	31	186	213	198	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
93	71	82	717	617	673	כל המחלות האחרות
2	7	4	5	14	9	תאונות דרכים
2	7	5	4	14	8	פגיעה עצמית מכוונת
11	15	13	69	78	73	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.8 : סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2013

שיעורים ל-100,000 נפש

נשים			גברים			סה"כ*
85+	84-75	74-65	85+	84-75	74-65	
13,035	3,816	1,060	14,118	4,908	1,720	
796	240	39	877	282	66	מחלות זיהומיות
1,787	960	449	2,210	1,315	651	שאתות ממאירות
738	288	68	729	313	104	סוכרת
430	85	13	306	76	19	יתר לחץ-דם
488	94	24	504	158	60	אוטם חריף של שריר הלב
1,090	195	37	1,426	415	105	מחלת לב איסכמית אחרת
1,050	251	53	915	234	59	מחלות לב אחרות
913	258	53	939	282	94	מחלות של כלי דם במוח
161	39	13	196	70	25	מחלות אחרות של מחזור הדם
380	83	11	454	135	27	דלקת ריאות
						מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
383	123	29	483	180	60	
390	95	21	499	137	32	יתר מחלות מערכת הנשימה
49	34	13	62	42	27	מחלות כבד
533	145	32	808	234	53	מחלות כליה
0	0	3	0	4	0	מומים מולדים
						סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
677	180	50	674	228	114	
2,883	677	128	2,628	688	180	כל המחלות האחרות
10	6	3	29	18	9	תאונות דרכים
0	6	3	36	16	9	פגיעה עצמית מכוונת
271	59	18	342	80	25	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור : עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9א: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2013

	קבוצת גיל			האוכלוסייה 65+	כלל האוכלוסייה	
	85+	84-75	74-65			
	15,036	11,933	6,261	33,230	41,477	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
	6.1	6.0	3.8	5.6	5.2	מחלות זיהומיות
	14.5	25.9	39.7	23.3	25.8	שאתות ממאירות
	5.5	7.0	6.2	6.1	5.6	סוכרת
	2.9	1.9	1.1	2.2	1.9	יתר לחץ-דם
	3.7	2.8	3.0	3.2	3.0	אוטם חריף של שריר הלב
	9.0	6.7	5.0	7.5	6.5	מחלת לב איסכמית אחרת
	7.4	5.7	4.1	6.2	5.6	מחלות לב אחרות
	6.9	6.3	5.3	6.3	5.6	מחלות של כלי דם במוח
	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	מחלות אחרות של מחזור הדם
	3.0	2.5	1.3	2.5	2.2	דלקת ריאות
	3.1	3.4	3.2	3.2	2.9	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
	3.2	2.6	1.9	2.8	2.5	יתר מחלות מערכת הנשימה
	0.4	0.9	1.4	0.8	0.9	מחלות כבד
	4.7	4.3	3.1	4.3	3.7	מחלות כליה
	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	מומים מולדים
	5.0	4.7	5.8	5.1	5.9	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
	20.7	15.9	11.1	17.2	16.0	כל המחלות האחרות
	0.1	0.3	0.4	0.2	0.9	תאונות דרכים
	0.1	0.2	0.4	0.2	0.9	פגיעה עצמית מכוונת
	2.2	1.6	1.5	1.9	2.5	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2013

	קבוצת גיל				כלל הגברים	
	85+	84-75	74-65	65+		
	5,909	5,802	3,651	15,362	20,477	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
	6.2	5.7	3.8	5.5	5.0	מחלות זיהומיות
	15.7	26.8	37.8	25.1	26.0	שאתות ממאירות
	5.2	6.4	6.0	5.8	5.2	סוכרת
	2.2	1.6	1.1	1.7	1.5	יתר לחץ-דם
	3.6	3.2	3.5	3.4	3.3	אוטם חריף של שריר הלב
	10.1	8.5	6.1	8.5	7.3	מחלת לב איסכמית אחרת
	6.5	4.8	3.4	5.1	4.7	מחלות לב אחרות
	6.7	5.7	5.5	6.0	5.2	מחלות של כלי דם במוח
	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	מחלות אחרות של מחזור הדם
	3.2	2.8	1.6	2.6	2.2	דלקת ריאות
	3.4	3.7	3.5	3.5	3.0	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
	3.5	2.8	1.9	2.9	2.5	יתר מחלות מערכת הנשימה
	0.4	0.9	1.6	0.9	1.2	מחלות כבד
	5.7	4.8	3.1	4.7	4.0	מחלות כליה
	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7	מומים מולדים
	4.8	4.7	6.6	5.2	6.7	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
	18.6	14.0	10.5	14.9	13.9	כל המחלות האחרות
	0.2	0.4	0.5	0.3	1.3	תאונות דרכים
	0.3	0.3	0.5	0.3	1.4	פגיעה עצמית מכוונת
	2.4	1.6	1.5	1.9	2.9	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9ג: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +65 ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2013

	קבוצת גיל				כלל	
	85+	84-75	74-65	65+	הנשים	
	9,127	6,131	2,610	17,868	21,000	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
	6.1	6.3	3.6	5.8	5.4	מחלות זיהומיות
	13.7	25.2	42.3	21.8	25.6	שאתות ממאירות
	5.7	7.5	6.4	6.4	5.9	סוכרת
	3.3	2.2	1.2	2.6	2.4	יתר לחץ-דם
	3.7	2.5	2.3	3.1	2.8	אוטם חריף של שריר הלב
	8.4	5.1	3.5	6.5	5.8	מחלת לב איסכמית אחרת
	8.1	6.6	5.0	7.1	6.5	מחלות לב אחרות
	7.0	6.8	5.0	6.6	6.0	מחלות של כלי דם במוח
	1.2	1.0	1.2	1.2	1.0	מחלות אחרות של מחזור הדם
	2.9	2.2	1.0	2.4	2.1	דלקת ריאות
	2.9	3.2	2.7	3.0	2.8	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
	3.0	2.5	2.0	2.7	2.4	יתר מחלות מערכת הנשימה
	0.4	0.9	1.2	0.7	0.7	מחלות כבד
	4.1	3.8	3.0	3.8	3.5	מחלות כליה
	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	מומים מולדים
	5.2	4.7	4.8	5.0	5.2	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
	22.1	17.7	12.0	19.1	18.0	כל המחלות האחרות
	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	תאונות דרכים
	0.0	0.1	0.3	0.1	0.4	פגיעה עצמית מכוונת
	2.1	1.5	1.7	1.8	2.0	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.10: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

	כלל האוכלוסייה		75+		74-65		65+		
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	
									מספרים מוחלטים
	79	132	9	10	22	24	31	34	1981
	84	220	12	29	14	30	26	59	1990
	87	307	13	39	15	19	28	58	2000
	121	304	23	35	10	20	33	55	2005
	88	279	13	22	5	24	18	46	2006
	63	263	7	29	8	19	15	48	2007
	60	294	11	43	9	19	20	62	2008
	94	310	8	23	6	21	14	44	2009
	86	394	9	40	14	33	23	73	2010
	87	322	7	44	8	28	15	72	2011

אחוזים מכלל ההתאבדויות					
65+	סה"כ	75+	74-65	64-0	
30.8	100.0	9.0	21.8	69.2	1981
28.0	100.0	13.5	14.5	72.0	1990
21.8	100.0	13.2	8.6	78.2	2000
20.7	100.0	13.6	7.1	79.3	2005
17.4	100.0	9.5	7.9	82.6	2006
19.3	100.0	11.0	8.3	80.7	2007
23.2	100.0	15.3	7.9	76.8	2008
14.4	100.0	7.7	6.7	85.6	2009
20.0	100.0	10.2	9.8	80.0	2010
21.3	100.0	12.5	8.8	78.7	2011

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.11: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, 2014

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	סה"כ בני 65+
10.2	16.3	12.9	טוב מאוד
42.1	43.7	42.8	טוב
32.9	28.0	30.8	לא כל כך טוב
14.8	11.9	13.6	בכלל לא טוב
100.0	100.0	100.0	כלל האוכלוסייה*
47.1	52.5	49.7	טוב מאוד
35.4	34.0	34.7	טוב
12.9	9.9	11.4	לא כל כך טוב
4.6	3.6	4.1	בכלל לא טוב
			דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל
52.3	60.0	55.7	סה"כ בני 65+
			גיל
67.8	71.9	69.7	74-65
34.2	47.7	39.9	75+
82.5	86.5	84.5	כלל האוכלוסייה*

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.12: בני 65+ וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג פעילות, גיל ומין, 2010

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
עוסקים בפעילות גופנית⁽¹⁾			
43.3	51.3	46.8	סה"כ בני 65+
45.8	54.2	49.5	74-65
40.2	47.5	43.4	75+
46.7	55.3	50.9	כלל האוכלוסייה ⁽³⁾
עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע⁽¹⁾			
31.9	40.4	35.6	סה"כ בני 65+
34.4	42.2	37.9	74-65
28.7	38.1	32.8	75+
28.1	34.3	31.1	כלל האוכלוסייה ⁽³⁾
עוסקים בפעילות גופנית מאומצת (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)⁽²⁾			
8.7	15.3	11.9	סה"כ בני 65+
12.6	20.4	16.4	74-65
..	(7.8)	(5.4)	75+
40.0	56.6	48.7	כלל האוכלוסייה ⁽³⁾
עוסקים בפעילות גופנית מתונה (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)⁽²⁾			
82.7	88.9	85.7	סה"כ בני 65+
85.7	87.2	86.4	74-65
78.4	91.4	84.6	75+
75.8	69.0	72.2	כלל האוכלוסייה ⁽³⁾

←

לוח 2.12: בני 65+ וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג פעילות, גיל ומין, 2010 (המשך)

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
			עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק שרירים (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)
32.5	23.0	27.9	סה"כ בני 65+
32.6	22.9	27.9	74-65
32.3	23.1	27.9	75+
33.0	34.0	33.5	כלל האוכלוסייה ⁽³⁾
			סיבה עיקרית לאי-עיסוק בפעילות גופנית (מתוך שאינם עוסקים בפעילות גופנית)
100.0	100.0	100.0	סה"כ בני 65+
64.3	54.0	60.2	בעיה בריאותית או גופנית
9.5	14.8	11.6	לא נראה חשוב
7.6	7.3	7.5	עייפות
6.7	7.3	6.9	חוסר בזמן
5.6	8.3	6.7	סיבה אחרת
(3.5)	(4.0)	3.7	שעמום
(2.8)	(4.3)	3.4	אין תנאים מתאימים בקרבת הבית או העבודה

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בשלושה החודשים שקדמו לראיון
2. שנמשכה לפחות 10 דקות ברצף
3. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.13: בני 65+ וכלל האוכלוסייה לפי מדד BMI⁽¹⁾, גיל ומין, 2010

אחוזים

כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	בני 65+			סה"כ
	נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
2.9	1.5	1.4	1.5	תת משקל (עד 18.4)
46.6	32.0	32.1	32.1	משקל תקין (18.5 עד 24.9)
34.5	40.2	47.9	43.7	משקל עודף (25 עד 29.9)
12.1	18.9	14.1	16.7	השמנה (30 עד 34.9)
3.9	7.4	4.4	6.0	השמנת יתר (35 ומעלה)
				סובלים מהשמנה (BMI 30 ומעלה)
	26.3	18.5	22.7	סה"כ בני 65+
				גיל
	29.2	19.2	24.6	74-65
	22.4	17.7	20.2	75+
				קבוצת אוכלוסייה
	25.6	18.5	22.4	יהודים ואחרים
	36.6	(18.4)	27.0	ערבים
	16.8	15.3	16.0	כלל האוכלוסייה ⁽²⁾

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. מדד BMI לבדיקת יחס גובה ומשקל, נקבע באמצעות חלוקת המשקל בק"ג בריבוע הגובה במטרים

2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.14: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המעשנים, לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
8.1	16.1	11.6	מעשנים כיום, לפחות פעם בשבוע
95.8	95.2	95.4	מעשנים סיגריות כיום (מתוך המעשנים לפחות פעם בשבוע)
100.0	100.0	100.0	מעשנים לפי מספר הסיגריות ביום
			סה"כ ⁽¹⁾
(14.7)	(15.4)	15.2	5-1
38.4	20.6	27.5	10-6
32.4	48.7	42.4	20-11
..	(9.7)	(9.6)	40-21
17.3	56.6	33.7	עישנו בעבר, לפחות פעם בשבוע, והפסיקו
			גיל הפסקת עישון (מתוך אלו שעישנו בעבר והפסיקו)
100.0	100.0	100.0	סה"כ
0.9	3.1	2.5	עד 19
8.3	11.2	10.3	20-29
14.1	14.4	14.3	30-39
16.0	23.7	21.4	40-49
27.0	24.5	25.2	50-59
33.8	23.1	26.3	60 ומעלה
15.7	36.5	24.6	כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ המעשנים כיום לפחות פעם בשבוע

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. הסה"כ כולל גם מעשנים פחות מסיגריות ליום או מעשנים יותר מ-40 סיגריות ביום
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.15: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	בני 65+		סה"כ	
	נשים	גברים		
100.0	100.0	100.0	100.0	דיווחו על קושי להירדם או לישון במשך לילה שלם
14.4	33.0	26.7	30.3	סה"כ
11.3	15.6	10.9	13.5	בכל לילה או כמעט בכל לילה פעמיים - שלוש בשבוע
13.3	13.0	9.8	11.6	פעם בשבוע או פחות
61.0	38.4	52.6	44.6	לא היה קושי
39.0	61.6	47.4	55.4	דיווחו על קושי כלשהו להירדם או לישון במשך לילה שלם
	57.8	43.9	51.7	סה"כ
	66.4	51.8	60.0	74-65
				75+
100.0	100.0	100.0	100.0	דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום, בגלל בעיות שינה⁽³⁾
15.6	25.6	16.1	22.0	סה"כ
30.2	36.1	29.5	33.6	עייפות רבה מאד
38.6	23.7	36.1	28.4	עייפות רבה
15.6	14.6	18.3	16.0	עייפות קלה
				אין עייפות כלל
84.4	85.4	81.7	84.0	דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום כלשהם במשך היום, בגלל בעיות שינה⁽³⁾
	82.1	79.7	81.2	סה"כ
	89.0	83.8	87.0	74-65
				75+

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בחודש האחרון

2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה

3. מתוך אלו שיש להם קשיים להירדם או לישון

לוח 2.16: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלה מהמחלות הבאות ואלו שנטלו תרופה למחלה זו, לפי מין, 2009

אחוזים

כלל האוכלוסייה	בני 65+		סה"כ	
	נשים	גברים		
11.1	57.3	48.7	53.5	יתר לחץ דם
2.2	8.8	18.3	13.0	התקף לב, אוטם שריר הלב
2.7	15.0	13.4	14.3	מחלת לב אחרת ⁽¹⁾
0.9	5.4	5.8	5.6	שבץ מוחי
4.9	23.8	21.7	22.9	סוכרת
3.7	7.3	5.7	6.6	אסתמה
1.7	7.3	5.5	6.5	מחלת ריאות כרונית
2.7	13.9	8.8	11.6	בעיה כרונית במערכת העיכול
1.6	8.4	8.1	8.3	מחלה ממארת - סרטן
2.5	10.7	5.4	8.4	דיכאון או חרדה
נטלו תרופות לפי מרשם רופא בגלל מחלה זו⁽²⁾				
87.6	95.8	95.1	95.5	יתר לחץ דם
87.8	83.8	89.7	87.5	התקף לב, אוטם שריר הלב
72.9	78.8	86.7	82.1	מחלת לב אחרת ⁽¹⁾
78.6	79.4	70.4	75.2	שבץ מוחי
88.8	93.8	89.4	92.0	סוכרת
76.3	83.7	87.4	85.1	אסתמה
63.9	72.0	68.9	70.9	מחלת ריאות כרונית
79.1	83.9	79.1	82.3	בעיה כרונית במערכת העיכול
42.8	41.1	43.2	42.0	מחלה ממארת - סרטן
73.4	68.0	82.3	72.0	דיכאון או חרדה

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל הפרעות בקצב הלב
2. מתוך אלו שדיווחו על המחלה

לוח 2.17: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2012

סוף שנה

כלל האוכלוסייה	85+	84-80	79-75	74-70	69-65	65+	
מספרים מוחלטים							
27,308	1,710	2,232	3,055	3,339	3,605	13,941	סה"כ
12,298	825	1,141	1,674	1,846	1,931	7,417	גברים
15,010	885	1,091	1,381	1,493	1,674	6,524	נשים
שיעורים ל-100,000 נפש							
285	2,579	1,822	1,915	1,634	1,680	1,775	סה"כ
277	3,123	2,408	2,499	2,040	1,951	2,170	גברים סה"כ
9	182	125	90	77	63	83	מזה: קיבה
33	560	401	405	277	228	303	מעג גס וחלחולת
29	220	268	321	248	210	241	ריאה
52	443	357	487	539	526	506	ערמונית
26	458	334	285	203	196	239	שלפוחית השתן
18	182	118	109	95	86	101	לימפומה ממארת
9	114	65	66	55	38	54	ליקמיה
299	2,218	1,452	1,493	1,312	1,448	1,471	נשים סה"כ
4	95	57	36	36	22	36	מזה: קיבה
25	386	223	224	168	132	180	מעג גס וחלחולת
13	110	116	115	94	104	104	ריאה
90	444	293	325	356	448	393	שד
8	28	24	27	31	46	36	שחלה
4	93	53	42	29	25	35	שלפוחית השתן
15	98	93	82	60	70	72	לימפומה ממארת
5	120	40	34	26	27	35	ליקמיה

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

לוח 2.18: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

2012	2011	2010	2009	2008	2006	
גברים						
2,195	2,215	2,287	2,265	2,281	2,309	סה"כ יהודים ואחרים*
84	86	91	84	89	91	מזה: קיבה
305	314	307	333	378	379	מעג גס וחלחולת
227	243	252	235	229	231	ריאה
523	526	559	546	611	556	ערמונית
243	208	239	238	238	236	שלפוחית השתן
104	103	97	97	95	111	לימפומה ממארת
53	51	62	61	37	58	ליקמיה
1,961	2,158	2,286	2,179	2,005	2,062	סה"כ ערבים
70	77	57	83	52	101	מזה: קיבה
266	222	305	285	284	229	מעג גס וחלחולת
388	386	449	462	372	392	ריאה
389	391	354	303	365	353	ערמונית
195	193	255	241	184	309	שלפוחית השתן
67	100	82	101	73	95	לימפומה ממארת
71	90	73	63	52	66	ליקמיה
נשים						
1,505	1,565	1,578	1,574	1,564	1,468	סה"כ יהודיות ואחרות*
33	40	47	46	48	47	מזה: קיבה
184	221	222	225	259	243	מעג גס וחלחולת
110	114	111	109	98	85	ריאה
408	388	394	392	396	343	שד
36	34	36	34	39	40	שחלה
37	36	38	49	43	37	שלפוחית השתן
71	74	67	80	72	76	לימפומה ממארת
34	31	31	41	28	31	ליקמיה
1,095	1,160	1,181	1,231	1,182	995	סה"כ ערביות
66	24	34	49	33	52	מזה: קיבה
173	177	202	224	215	151	מעג גס וחלחולת
40	59	58	80	58	48	ריאה
242	262	205	232	286	219	שד
11	18	27	12	36	18	שלפוחית השתן

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

**לוח 2.19: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים*
בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2012**

סוף שנה

	75+	74-70	69-65	65+	
מספרים מוחלטים					
	6,452	2,929	3,151	12,532	סה"כ יהודים ואחרים בני 65+
	3,342	1,605	1,665	6,612	גברים
	3,110	1,324	1,486	5,920	נשים
שיעורים ל-100,000 נפש					
גברים					
	2,569	1,578	2,091	2,081	ילידי ישראל
	2,473	2,209	2,126	2,249	ילידי אירופה-אמריקה
	2,059	1,858	1,443	1,738	ילידי אסיה
	2,073	1,547	1,780	1,797	ילידי אפריקה
נשים					
	1,663	1,122	1,783	1,559	ילידות ישראל
	1,605	1,607	1,539	1,577	ילידות אירופה-אמריקה
	1,321	1,139	1,289	1,255	ילידות אסיה
	1,285	1,133	1,186	1,199	ילידות אפריקה

מקור: רישום הסרטון הלאומי, משרד הבריאות
* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.20: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2014

אחוזים, סוף שנה

להתלבש או להתרחץ			ללכת או לעלות במדרגות			סה"כ	סה"כ באלפים	
יש קושי רב ⁽¹⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽¹⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
14.4	14.3	71.3	33.5	18.9	47.6	100.0	878.3	סה"כ בני 65+
גיל								
6.4	11.1	82.4	23.3	18.6	58.2	100.0	490.8	בני 74-65
24.4	18.4	57.2	46.4	19.4	34.2	100.0	387.5	בני 75+
מין								
10.2	11.9	78.0	26.3	18.9	54.8	100.0	390.3	גברים
17.7	16.3	66.0	39.2	18.9	41.9	100.0	488.0	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
13.0	13.2	73.8	31.8	19.0	49.2	100.0	805.4	יהודים ואחרים מזה: עולי
18.1	19.3	62.6	41.9	24.5	33.6	100.0	164.7	בריה"מ לשעבר
29.2	27.1	43.7	51.8	18.3	29.9	100.0	72.9	ערבים
לזכור או להתרכז			פעולות הקשורות למשק הבית ⁽²⁾			סה"כ	סה"כ באלפים	
יש קושי רב ⁽¹⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽¹⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
11.7	36.6	51.7	30.1	17.2	52.7	100.0	878.3	סה"כ בני 65+
גיל								
7.7	31.3	61.0	18.8	16.8	64.4	100.0	490.8	בני 74-65
16.8	43.3	40.0	44.5	17.7	37.8	100.0	387.5	בני 75+
מין								
10.4	34.3	55.3	21.7	14.5	63.8	100.0	390.3	גברים
12.8	38.4	48.9	36.9	19.3	43.8	100.0	488.0	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
10.6	36.1	53.3	28.2	17.1	54.7	100.0	805.4	יהודים ואחרים מזה: עולי
15.0	37.3	47.7	34.2	23.6	42.2	100.0	164.7	בריה"מ לשעבר
24.3	41.8	33.9	51.6	17.9	30.4	100.0	72.9	ערבים

←

לוח 2.20: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2014 (המשך)

אחוזים, סוף שנה

	לשמוע ⁽⁴⁾			לראות ⁽³⁾			סה"כ	סה"כ באלפים	
	יש קושי רב ⁽¹⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽¹⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
	11.1	31.7	57.2	12.0	26.3	61.7	100.0	878.3	סה"כ בני 65+
	גיל								
	6.2	27.1	66.7	7.3	21.3	71.4	100.0	490.8	בני 65-74
	17.3	37.6	45.1	18.1	32.5	49.4	100.0	387.5	בני 75+
	מין								
	11.9	34.4	53.7	10.2	22.1	67.7	100.0	390.3	גברים
	10.4	29.6	60.0	13.5	29.6	56.9	100.0	488.0	נשים
	קבוצת אוכלוסייה								
	10.9	31.4	57.7	11.1	25.1	63.8	100.0	805.4	יהודים ואחרים
	12.7	30.2	57.2	16.7	29.7	53.6	100.0	164.7	מזה: עולי בריה"מ לשעבר
	13.7	35.3	50.9	22.2	39.4	38.4	100.0	72.9	ערבים

מקור: למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנים 2012-2014; למ"ס, עיבוד מיוחד על האוכלוסייה המבוגרת במוסדות לטיפול ממושך מתוך מפקד המוסדות 2014

1. כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד
2. כגון: נקיון, קניות וסידורים מחוץ לבית
3. גם כאשר מרכיב/ה משקפיים
4. גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה

לוח 2.21: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2014

מספרים מוחלטים

סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל	
1,987	65	310	1,612	בני +65
1,073	47	154	872	סה"כ
914	18	156	740	גברים
				נשים
1,171	28	136	1,007	בני 65-74
632	19	71	542	סה"כ
539	9	65	465	גברים
				נשים
816	37	174	605	בני +75
441	28	83	330	סה"כ
375	9	91	275	גברים
				נשים
692	44	172	476	בני +65 לפי מעמד הנפגע
790	10	63	717	הולך רגל
435	8	54	373	נהג רכב
70	3	21	46	נוסע ברכב
				אחר
1,804	56	286	1,462	בני +65 לפי קבוצת אוכלוסייה*
142	8	17	117	יהודים
				ערבים
21,910	279	1,562	20,069	כלל האוכלוסייה
12,714	210	1,063	11,441	סה"כ
9,196	69	499	8,628	גברים
				נשים

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.22: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2014

שיעורים ל-100,000 נפש

	פצועים קשה	פצועים קל	סה"כ	הרוגים
בני 65+				
סה"כ	35	183	225	7
גברים	40	224	276	12
נשים	32	150	185	4
בני 65-74				
סה"כ	28	209	243	6
גברים	32	243	283	9
נשים	25	180	209	3
בני 75+				
סה"כ	43	151	203	9
גברים	50	200	267	17
נשים	39	116	159	4
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	37	188	232	7
ערבים	22	152	184	10
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	19	244	267	3
גברים	26	281	312	5
נשים	12	208	222	2

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים
 * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.23: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות
שיעורים ל-100,000 נפש

מזה: הרוגים		סה"כ נפגעים		
כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	
9	24	442	378	1985
9	23	594	459	1990
9	23	818	408	1996
9	21	814	385	1997
9	21	826	379	1998
8	18	743	363	1999
8	12	584	219	2001
8	16	581	290	2002
7	12	554	273	2003
7	13	542	283	2004
6	12	512	277	2005
6	12	509	295	2006
6	11	457	278	2007
6	11	435	275	2008
4	8	425	249	2009
5	10	368	250	2010
4	8	349	253	2011
3	7	302	226	2012
3	6	301	249	2103
3	7	267	225	2014

מקורות: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.24: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2014

חומרת התאונות				
קלות	קשות	קטלניות	סה"כ	
				מספרים מוחלטים
1,722	235	29	1,986	נהגים מעורבים בני 65+
				גיל
1,148	156	18	1,322	בני 65-74
574	79	11	664	בני 75+
				מין
1,348	192	26	1,566	גברים
374	43	3	420	נשים
				כלל הנהגים המעורבים
18,528	2,095	432	21,055	סה"כ ⁽¹⁾
12,648	1,625	359	14,632	גברים
4,915	358	47	5,320	נשים
				שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾
				נהגים מעורבים בני 65+
45	6	1	51	סה"כ
54	8	1	62	גברים
28	3	0	31	נשים
				כלל הנהגים המעורבים
48	5	1	55	סה"כ
57	7	2	67	גברים
30	2	0	32	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2013 ובסוף 2014

לוח 2.25: בני 65+ וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא או התייעצו איתו בטלפון בשבועיים האחרונים, לפי מין והתמחות הרופא, 2009

אחוזים

כלל האוכלוסייה	בני 65+			סה"כ
	נשים	גברים	סה"כ	
רופא משפחה או רופא כללי ⁽¹⁾	32.0	29.1	30.7	9.5
רופא פנימי ⁽²⁾	0.7	0.6	0.7	0.2
רופא עור ומין	0.7	0.8	0.7	0.6
רופא אורתופד	3.3	1.9	2.7	1.3
רופא קרדיולוג	1.6	2.2	1.8	0.4
רופא נשים	0.8		0.8	1.9
רופא אורולוג	0.6	1.9	1.2	0.3
רופא אף אוזן גרון	1.0	0.9	0.9	0.5
רופא נוירולוג	0.8	1.2	1.0	0.3
רופא כירורג	0.7	1.4	1.0	0.4
רופא עיניים	2.3	2.3	2.3	0.6
רופא ריאות	0.4	0.2	0.3	0.1
רופא פסיכיאטר	0.2	0.2	0.2	0.2

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
2. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

לוח 2.26: ביקורים של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהלך שנה, לפי מין והתמחות הרופא, 2009

ממוצע לנפש

כלל האוכלוסייה	בני 65+		סה"כ	
	נשים	גברים		
3.2	11.6	10.8	11.2	רופא משפחה או רופא כללי ⁽¹⁾
0.1	0.3	0.2	0.2	רופא פנימי ⁽²⁾
0.2	0.2	0.2	0.2	רופא עור ומין
0.4	1.0	0.5	0.8	רופא אורתופד
0.1	0.4	0.5	0.5	רופא קרדיולוג
0.6	0.2		0.2	רופא נשים
0.1	0.2	0.5	0.3	רופא אורולוג
0.1	0.3	0.2	0.3	רופא אף אוזן גרון
0.1	0.2	0.3	0.2	רופא נוירולוג
0.1	0.1	0.4	0.3	רופא כירורג
0.2	0.7	0.6	0.6	רופא עיניים
0.0	0.2	0.0	0.1	רופא ריאות
0.0	0.1	0.1	0.1	רופא פסיכיאטר

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
2. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

לוח 2.27: ביקורים⁽¹⁾ של בני +65 אצל רופא מתוך סך הביקורים של כלל האוכלוסייה במהלך שנה, לפי התמחות הרופא, 2009

אחוזים

סה"כ	
30.6	רופא משפחה או רופא כללי ⁽²⁾
42.8	רופא פנימי ⁽³⁾
11.7	רופא עור ומין
19.3	רופא אורתופד
43.7	רופא קרדיולוג
2.9	רופא נשים
41.7	רופא אורולוג
16.6	רופא אף אוזן גרון
28.7	רופא נוירולוג
21.3	רופא כירורג
32.2	רופא עיניים
29.7	רופא ריאות
13.8	רופא פסיכיאטר

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל ייעוץ טלפוני
2. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
3. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

לוח 2.28: בני 65+ וכלל האוכלוסייה⁽¹⁾ המדווחים על ביצוע בדיקות רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 2010

אחוזים

מועד ביצוע הבדיקה האחרונה ⁽²⁾				
עשו בדיקה	בשנה אחרונה	מעל שנה ועד שנתיים	מעל שנתיים	סה"כ
בדיקת דם				
98.9	96.2	2.9	(0.9)	100.0
98.4	95.9	3.2	..	100.0
99.3	96.3	2.6	1.0	100.0
89.6	79.8	11.4	8.2	100.0
בדיקת כולסטרול				
95.7	94.8	4.1	1.1	100.0
95.1	94.5	4.2	1.3	100.0
96.1	95.1	4.0	0.9	100.0
71.3	82.5	11.4	6.1	100.0
בדיקת שומות ונקודות חן				
21.6	60.2	21.0	18.0	100.0
23.7	62.4	21.6	16.1	100.0
20.0	58.1	20.5	21.4	100.0
20.8	48.7	20.4	30.9	100.0
בדיקת ממוגרפיה				
82.7	46.2	26.7	27.2	100.0
70.3	53.0	28.0	19.0	100.0
בדיקת פרוסטטה				
53.4	61.4	18.3	20.3	100.0
38.8	63.0	18.5	18.5	100.0

←

לוח 2.28: בני 65+ וכלל האוכלוסייה⁽¹⁾ המדווחים על ביצוע בדיקות רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 2010 (המשך)

אחוזים

מועד ביצוע הבדיקה האחרונה ⁽²⁾				עשו בדיקה	
סה"כ	מעל שנתיים	מעל שנה ועד שנתיים	בשנה אחרונה		
בדיקת דם סמוי					
100.0	20.1	20.8	59.1	57.1	סה"כ בני 65+
100.0	18.0	21.1	60.9	60.2	גברים
100.0	22.0	20.6	57.4	54.7	נשים
100.0	15.8	20.4	63.8	51.7	כלל האוכלוסייה ⁽¹⁾
בדיקת קולונוסקופייה					
100.0	27.8	33.8	30.6	43.6	סה"כ בני 65+
100.0	22.5	22.5	22.5	46.6	גברים
100.0	49.7	43.8	46.9	41.2	נשים
100.0	44.1	23.4	32.5	36.5	כלל האוכלוסייה ⁽⁵⁾

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה
2. מתוך אלה שעשו את הבדיקה
3. לנשים בנות 40 ומעלה
4. לגברים בני 50 ומעלה
5. לבני 50 ומעלה

לוח 2.29: בני +65 וכלל האוכלוסייה* אשר קיבלו חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
54.6	60.0	57.0	סה"כ בני +65
			גיל
49.7	57.1	52.9	בני 65-74
60.7	63.8	62.1	בני +75
22.3	23.5	22.9	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, הסקר החברתי * בני 20 ומעלה

לוח 2.30: בני +65 וכלל האוכלוסייה* אשר עברו בדיקה, טיפול או ניקוי שיניים בשנה האחרונה, לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
38.8	37.7	38.3	עברו בדיקה או טיפול שיניים
			סה"כ בני +65
			גיל
42.6	41.9	42.3	בני 65-74
34.0	32.2	33.3	בני +75
51.7	47.9	49.8	כלל האוכלוסייה
28.7	29.6	29.1	עברו ניקוי שיניים
			סה"כ בני +65
			גיל
34.7	32.4	33.7	בני 65-74
21.2	25.9	23.3	בני +75
44.3	40.3	42.4	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, הסקר החברתי * בני 20 ומעלה

לוח 2.31: ביקורים וביקורים חוזרים של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2014

נשים	גברים	סה"כ	
			מספר ביקורים⁽²⁾ (באלפים)
283.6	242.1	525.7	סה"כ בני +65
			גיל
102.9	102.9	205.7	בני 65-74
110.2	90.1	200.3	בני 75-84
70.6	49.1	119.7	בני +85
1,199.6	1,299.5	2,499.1	כלל האוכלוסייה
23.6	18.6	21.0	אחוז הביקורים של בני +65 מתוך כלל הביקורים
			שיעורים לאלף נפש
563.4	610.2	584.0	סה"כ בני +65
			גיל
395.4	464.3	427.0	בני 65-74
673.7	737.1	700.5	בני 75-84
980.1	1,130.0	1,036.2	בני +85
291.8	316.7	304.2	כלל האוכלוסייה
			ביקורים חוזרים⁽³⁾ בתוך 30 ימים (אחוזים)
21.6	24.7	23.0	סה"כ בני +65
			גיל
20.2	23.3	21.7	בני 65-74
22.1	25.4	23.6	בני 75-84
22.9	26.5	24.3	בני +85
18.0	17.4	17.7	כלל האוכלוסייה

מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - מאפייני הפעילות 2014" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 28 בתי חולים לאשפוז כללי ללא בתי החולים במזרח ירושלים. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

לוח 2.32: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על אשפוז בבית חולים⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2009

אחוזים				
כלל האוכלוסייה	75+	74-65	65+	
5.9	22.3	16.2	19.0	סה"כ
5.9	21.8	17.3	19.3	מין
5.9	22.6	15.4	18.7	גברים
				נשים
				קבוצת אוכלוסייה
5.8	22.0	15.4	18.5	יהודים ואחרים ⁽²⁾
6.4	26.5	23.4	24.3	ערבים

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. אשפוז בשנים עשר החודשים הקודמים לריאיון, לא כולל אשפוז יום, אשפוז ללידה, אשפוז בבית חולים כרוני וניתוחים קוסמטיים
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.33: אשפוזים* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

2014	2013	2012	2011	2010	2005	2000	
							בני 65+
432	442	461	462	493	491	488	סה"כ
488	499	520	520	555	559	563	גברים
389	397	414	418	445	441	432	נשים
							בני 65-74
314	323	338	343	366	373	390	סה"כ
371	381	399	401	431	438	460	גברים
265	273	285	293	312	319	336	נשים
							בני 75+
575	581	602	595	632	631	612	סה"כ
647	656	677	669	710	719	703	גברים
524	530	549	543	579	572	549	נשים
							בני 75-84
514	526	544	541	577	575	562	סה"כ
587	602	623	618	654	665	653	גברים
460	471	487	485	522	514	498	נשים
							בני 85+
725	719	745	731	774	831	769	סה"כ
813	807	831	813	870	920	875	גברים
671	666	693	680	716	775	702	נשים
							כלל האוכלוסייה
136	138	140	141	146	144	140	סה"כ
132	134	136	136	142	141	140	גברים
140	142	145	145	151	147	141	נשים

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות
 * שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.34: אשפוזים* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

אחוזים						
2014	2013	2012	2011	2010	2005	2000
בני 65+						
34.2	33.8	33.8	33.2	33.3	34.1	34.1
סה"כ						
35.3	34.7	34.7	33.8	33.8	34.2	34.0
גברים						
33.2	32.9	32.9	32.6	32.8	34.0	34.1
נשים						
בני 75+						
20.6	20.4	20.5	20.2	20.4	20.1	18.8
סה"כ						
19.8	19.6	19.7	19.3	19.3	19.0	18.0
גברים						
21.4	21.2	21.4	21.1	21.3	21.2	19.6
נשים						
בני 85+						
7.5	7.2	7.3	7.1	7.0	5.8	5.7
סה"כ						
6.5	6.3	6.3	6.2	6.2	5.1	5.1
גברים						
8.4	8.1	8.1	7.9	7.7	6.4	6.3
נשים						

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.35: בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות*, שנים נבחרות

אחוזים

2014	2013	2012	2011	2010	2005	2000	
34.2	33.8	33.8	33.2	33.3	34.1	34.1	כלל המחלקות הכלליות
60.8	60.1	60.3	59.2	59.0	58.9	58.0	פנימית
53.0	50.7	49.5	47.4	47.5	47.6	46.1	ריאות
98.9	98.8	96.5	96.3	95.8	97.9	96.1	גריאטרייה חריפה
35.4	34.8	33.9	33.1	32.1	33.7	33.9	נירולוגיה
41.5	40.5	40.6	39.3	38.2	42.1	37.9	אונקולוגיה
36.2	35.4	34.6	35.6	35.0	32.6	32.1	עור ומין
15.7	16.0	15.0	11.4	8.5	9.2	3.6	השתלת מוח עצם
48.1	48.2	49.0	48.2	48.9	49.9	47.6	טיפול נמרץ כללי
51.2	50.9	50.8	49.8	49.4	50.4	50.4	טיפול נמרץ לב
60.5	64.5	68.7	68.3	71.2	72.7	73.9	טיפול נמרץ נשימתי
28.1	27.7	27.3	27.3	27.2	27.8	27.2	כירורגייה כללית
36.4	36.1	36.3	35.4	35.2	34.5	32.4	אורתופדיה
40.5	40.5	39.9	38.3	37.9	40.9	40.3	אורולוגיה
36.4	34.6	35.0	33.6	33.7	30.3	28.8	נירוכירורגייה
47.7	48.3	48.5	46.7	47.6	47.4	47.4	כירורגייה חזה ולב
54.3	54.8	55.5	54.7	53.7	57.6	55.8	כירורגייה כלי דם
25.2	25.1	25.3	27.8	27.3	28.4	28.1	כירורגייה פלסטית
58.2	59.5	59.6	60.1	61.0	59.3	58.4	עיניים
14.1	14.5	13.3	13.8	13.0	12.3	11.9	אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר
13.0	13.3	11.7	11.4	10.5	11.5	11.6	פה ולסת
3.4	3.5	3.3	3.1	3.1	3.7	3.9	נשים
25.9	25.7	30.9	31.2	31.9	28.9	36.2	השהיה

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.36: התפלגות האשפוזים בקרב בני +65 במחלקות כלליות, לפי מין, 2014

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	כלל המחלקות הכלליות*
49.6	46.8	48.2	פנימית
0.3	0.4	0.3	ריאות
4.6	3.0	3.8	גריאטרייה חריפה
1.7	1.9	1.8	נירולוגיה
1.1	1.5	1.3	אונקולוגיה
0.4	0.4	0.4	עור ומין
0.1	0.1	0.1	השתלת מוח עצם
2.0	2.4	2.2	טיפול נמרץ כללי
2.8	4.7	3.7	טיפול נמרץ לב
0.2	0.3	0.2	טיפול נמרץ נשימתי
14.7	16.4	15.6	כירורגייה כללית
7.2	3.9	5.5	אורתופדיה
1.3	5.7	3.5	אורולוגיה
0.9	1.1	1.0	נירוכירורגייה
1.2	1.9	1.5	כירורגייה חזה ולב
0.7	1.7	1.2	כירורגייה כלי דם
0.6	0.6	0.6	כירורגייה פלסטית
4.0	3.4	3.7	עיניים
0.9	1.1	1.0	אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר
0.1	0.1	0.1	פה ולסת
1.9	0.0	0.9	נשים
3.7	2.9	3.3	השהיה

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.37: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2014

ימים

כלל האוכלוסייה			בני +65			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
3.9	4.2	4.1	5.5	5.3	5.4	כלל המחלקות הכלליות*
4.7	4.4	4.6	5.2	5.0	5.1	פנימית
5.9	6.0	6.0	6.3	6.2	6.3	ריאות
12.0	12.4	12.2	12.0	11.6	11.8	גריאטרייה חריפה
5.3	5.4	5.4	6.7	6.5	6.6	נירולוגיה
7.3	6.7	7.0	8.3	7.1	7.6	אונקולוגיה
8.5	8.7	8.6	9.5	9.5	9.5	עור ומין
15.0	16.4	15.8	13.3	12.4	12.8	השתלת מוח עצם
5.6	5.9	5.8	6.6	6.7	6.6	טיפול נמרץ כללי
2.8	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	טיפול נמרץ לב
4.6	3.9	4.2	5.8	4.7	5.2	טיפול נמרץ נשימתי
2.6	2.6	2.6	3.7	3.5	3.6	כירורגייה כללית
5.5	4.9	5.2	6.7	7.0	6.8	אורתופדיה
3.5	3.5	3.5	4.0	4.2	4.2	אורולוגיה
6.3	6.5	6.4	6.9	7.0	6.9	נירוכירורגייה
6.8	6.5	6.6	7.3	7.1	7.2	כירורגייה חזה ולב
4.3	4.9	4.7	4.9	5.1	5.1	כירורגייה כלי דם
4.6	5.7	5.1	5.6	4.8	5.2	כירורגייה פלסטית
2.0	2.2	2.1	1.8	1.9	1.8	עיניים
2.9	2.9	2.9	4.1	4.2	4.2	אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר
3.8	3.8	3.8	5.4	4.3	4.9	פה ולסת
2.2	1.4	2.2	3.4	1.4	3.4	נשים
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	השהיה

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.38: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המטופלים* בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי, 2014

סוף שנה

סה"כ	
מספרים מוחלטים	
מטופלים בני 65+	6,379
מטופלים בכלל האוכלוסייה	57,498
אחוזים	
בני 65+ מכלל המטופלים	11.1
מטופלים בני 65+ מכלל בני 65+	0.7
כלל המטופלים מתוך האוכלוסייה	0.7

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה * אנשים שהיה להם לפחות מגע אחד בתקופה הנתונה

לוח 2.39: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2014

מספרים מוחלטים, סוף שנה

סה"כ	גברים	נשים	
24	9	15	בני 65+
20	7	13	בני 65-74
4	2	2	בני 75-84
0	0	0	בני 85+
397	230	167	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.40: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2014

סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
			מספרים מוחלטים
182	168	350	כלל בני 65+
133	131	264	בני 65-74
42	32	74	בני 75-84
7	5	12	בני 85+
1,232	2,295	3,527	כלל האוכלוסייה
			שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה
0.4	0.4	0.4	כלל בני 65+
0.5	0.6	0.5	בני 65-74
0.3	0.3	0.3	בני 75-84
0.1	0.1	0.1	בני 85+
0.3	0.6	0.4	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.41: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש, סוף שנה

	2014	2013	2009	2005	2000	1990
כלל בני 65+						
סה"כ	0.4	0.4	0.4	0.7	1.5	3.5
גברים	0.4	0.5	0.4	0.7	1.4	3.1
נשים	0.4	0.3	0.3	0.8	1.5	3.9
בני 65-74						
סה"כ	0.5	0.6	0.5	0.9	1.7	3.6
גברים	0.6	0.7	0.5	0.9	1.7	3.7
נשים	0.5	0.5	0.5	0.9	1.6	3.5
בני 75-84						
סה"כ	0.3	0.3	0.3	0.6	1.3	3.6
גברים	0.3	0.2	0.3	0.5	1.0	2.3
נשים	0.3	0.3	0.3	0.7	1.5	4.5
בני 85+						
סה"כ	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	3.1
גברים	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	1.8
נשים	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2	4.0
כלל האוכלוסייה						
סה"כ	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.8
גברים	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	2.1
נשים	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	1.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.42: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

	2014	2013	2010	2005	2000	1990	
כלל בני 65+							
סה"כ	1,899	1,850	1,645	1,746	1,867	1,412	
גברים	834	818	758	628	641	526	
נשים	1,065	1,032	887	1,118	1,226	886	
בני 65-74							
סה"כ	1,237	1,215	1,005	1,072	1,117	892	
גברים	573	578	497	387	408	321	
נשים	664	637	508	685	709	571	
בני 75-84							
סה"כ	527	521	540	567	621	467	
גברים	201	195	214	203	186	181	
נשים	326	326	326	364	435	286	
בני 85+							
סה"כ	135	114	100	107	129	53	
גברים	60	45	47	38	47	24	
נשים	75	69	53	69	82	29	
כלל האוכלוסייה							
סה"כ	22,527	22,015	20,918	20,892	18,172	12,262	
גברים	14,125	13,667	13,095	12,605	10,632	6,788	
נשים	8,402	8,348	7,823	8,287	7,540	5,474	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.43: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2014

כלל האוכלוסייה	בני 85+	בני 74-84	בני 65-74	בני 65+	
מספרים מוחלטים					
סה"כ קבלות					
22,527	135	527	1,237	1,899	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
10,765	20	126	527	673	הפרעות פסיכוטיות חריפות
1,667	15	36	50	101	הפרעות אפקטיביות
3,272	40	209	420	669	הפרעות אורגניות
732	47	112	76	235	הפרעות נירוטיות
1,303	8	15	85	108	הפרעות אישיות
893		4	11	15	סמים ואלכוהול
1,364		2	13	15	פיגור שכלי
161			2	2	הפרעות בגיל הילדות
403					גורמי פניה אחרים
1,967	5	23	53	81	
אחוזים					
סה"כ קבלות					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
47.8	14.8	23.9	42.6	35.4	הפרעות פסיכוטיות חריפות
7.4	11.1	6.8	4.0	5.3	הפרעות אפקטיביות
14.5	29.6	39.7	34.0	35.2	הפרעות אורגניות
3.2	34.8	21.3	6.1	12.4	הפרעות נירוטיות
5.8	5.9	2.8	6.9	5.7	הפרעות אישיות
4.0	0.0	0.8	0.9	0.8	סמים ואלכוהול
6.1	0.0	0.4	1.1	0.8	פיגור שכלי
0.7	0.0	0.0	0.2	0.1	הפרעות בגיל הילדות
1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	גורמי פניה אחרים
8.7	3.7	4.4	4.3	4.3	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.44: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2014

נשים	גברים	סה"כ	
			מספרים מוחלטים
290	267	557	כלל בני 65+
135	139	274	בני 74-65
117	89	206	בני 84-75
38	39	77	בני 85+
1,918	2,992	4,910	כלל האוכלוסייה
			שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה
0.6	0.7	0.6	כלל בני 65+
0.5	0.6	0.6	בני 74-65
0.7	0.7	0.7	בני 84-75
0.5	0.9	0.7	בני 85+
0.5	0.7	0.6	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.45: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +65 בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

	בני +65	בני 74-65	בני 84-75	בני +85 כלל האוכלוסייה	
נובמבר 2005					
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	69.3	65.9	72.4	53.9	53.9
מכבי שירותי בריאות	16.6	18.8	14.4	24.1	24.1
קופת חולים לאומית	7.7	8.0	7.4	9.9	9.9
קופת חולים מאוחדת	6.5	7.3	5.7	12.1	12.1
נובמבר 2010					
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	66.0	62.1	69.3	52.5	52.5
מכבי שירותי בריאות	18.8	21.4	16.7	24.7	24.7
קופת חולים לאומית	7.4	7.6	7.3	9.2	9.2
קופת חולים מאוחדת	7.8	8.9	6.7	13.6	13.6
נובמבר 2013					
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	62.8	59.1	65.7	52.4	52.4
מכבי שירותי בריאות	21.0	23.4	19.3	25.0	25.0
קופת חולים לאומית	7.4	7.5	7.4	8.9	8.9
קופת חולים מאוחדת	8.8	10.0	7.7	13.7	13.7
נובמבר 2014					
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	61.9	58.3	64.4	52.4	52.4
מכבי שירותי בריאות	21.7	24.0	20.2	25.0	25.0
קופת חולים לאומית	7.4	7.5	7.4	8.9	8.9
קופת חולים מאוחדת	9.0	10.2	8.0	13.7	13.7

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.46: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, 1994-2014

אחוזים

קופת חולים מאוחדת	קופת חולים לאומית	מכבי שירותי בריאות	שירותי בריאות כללית	סה"כ	
4.1	7.2	4.9	13.1	10.2	דצמבר 1994
4.4	7.4	5.1	12.9	10.1	דצמבר 1995
4.4	7.3	5.2	13.0	10.0	נובמבר 1996
4.4	7.2	5.4	13.2	10.1	נובמבר 1997
4.6	7.4	5.5	13.2	10.0	נובמבר 1998
4.7	7.4	5.6	13.1	10.0	נובמבר 1999
4.8	7.5	5.8	13.1	10.0	נובמבר 2000
5.0	7.5	6.0	13.1	10.0	נובמבר 2001
5.2	7.7	6.3	13.1	10.1	נובמבר 2002
5.3	7.9	6.6	13.2	10.2	נובמבר 2003
5.4	8.0	6.8	13.2	10.2	נובמבר 2004
5.5	7.9	7.0	13.1	10.2	נובמבר 2005
5.8	8.0	7.3	13.2	10.4	נובמבר 2006
5.5	8.1	7.3	12.9	10.1	נובמבר 2007
5.5	8.1	7.3	12.8	10.1	נובמבר 2008
5.6	8.1	7.5	12.8	10.1	נובמבר 2009
5.8	8.2	7.7	12.8	10.2	נובמבר 2010
5.8	8.2	7.6	12.6	10.0	נובמבר 2011
6.7	8.7	8.7	13.0	10.7	נובמבר 2012
7.0	9.1	9.2	13.1	10.9	נובמבר 2013
7.3	9.2	9.7	13.1	11.1	נובמבר 2014

מקור: המוסד לביטוח לאומי