

פרק 2

מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוס שימוש בשירותי בריאות נבחרים



— לקט נתונים —

❖ תוחלת החיים, 2011

| גברים | נשים | |
|-------|------|---------|
| 80.0 | 83.6 | בלידה |
| 18.7 | 20.8 | בגיל 65 |

❖ בני 65+ התופסים את מצב בריאותם כ"טוב" או "טוב מאד", 2011, אחוזים

| סה"כ | גברים | נשים | |
|------|-------|------|----------|
| 32.4 | 36.9 | 29.0 | טוב |
| 10.7 | 13.2 | 8.7 | טוב מאוד |

❖ אומדן בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות היום-יום, 2010, אחוזים

| סה"כ | גברים | נשים |
|------|-------|------|
| 23.6 | 17.2 | 28.6 |

❖ בני 65+ המדווחים על קבלת חיסון נגד שפעת, 2010, 57.0%

❖ ביקורים אצל רופא של בני 65+ במהלך שנה, 2009, ממוצע לנפש

| סה"כ | גברים | נשים |
|------|-------|------|
| 11.2 | 10.8 | 11.6 |

❖ אשפוזים של בני 65+ במחלקות כלליות, 2010,

שיעורים ל-1,000 נפש 501

❖ סיבות פטירה עיקריות של בני 65+, 2010

| | |
|-------|----------------------|
| 23.7% | שאתות ממאירות |
| 18.5% | מחלות לב |
| 6.7% | מחלות של כלי דם במוח |
| 6.4% | סוכרת |

2. מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של הקשישים בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאות הקשישים.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של הקשיש. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של הקשישים בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ♦ **תוחלת החיים בלידה** ממשיכה לעלות בהדרגה והגיעה בשנת 2011 ל-83.6 שנים לנשים ול-80 שנים לגברים. תוחלת החיים של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת 2011 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 4 שנים לגברים ו-3 שנים לנשים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** בשנים 2007-2011 היא 20.8 שנים לנשים ו-18.7 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 86 בממוצע, וגבר – עד גיל 84. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 12.8 שנים ולגברים 11.6 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.1 שנים ושל נשים בנות 75 ב-3.6 שנים (לוח 2.3).
- ♦ ב-2010 עמד **שיעור הפטירה** המתוקנן ל-1,000 בני +65 על 48 בקרב הגברים ועל 37 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקנן ל-1,000 בני +65 בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים (58 לעומת 48 בקרב הגברים, בהתאמה); (לוח 2.4).
- בשנת 2010 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני +65 ילידי ישראל היה 44, בקרב ילידי אסיה 37, בקרב ילידי אפריקה 36 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 51. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני +65 ילידי בריה"מ לשעבר הוא 48 (לוח 2.5).
- שישים ושמונה אחוזים מהקשישים **נפטרו בבית חולים** בשנת 2011, לעומת 66% מבני 0-64. בקרב הקשישים 69% מהגברים ו-67% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 61% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 74% מהנשים (לוח 2.6).
- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני +65 והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בקרב בני +65 סיבות עיקריות נוספות הן מחלת לב איסכמית, מחלות של כלי דם במוח וסוכרת (לוח 2.7).
- ב-2010 נפטרו 31,148 אנשים בגיל +65, שהם 79% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. עם השנים חלקם של בני 65-74 בכלל הפטירות של בני +65 הולך ופוחת. בשנת 2003 היה חלקם של בני 65-74 מתוך

- הפטירות של בני 65+ 23% לעומת 19% ב-2009 (לוח 2.9א ונתונים משנתונים קודמים).
- **סיבות הפטירה העיקריות** בקרב הקשישים הן שאתות ממאירות (24%) ומחלות לב שונות (19%). בקרב הגברים, אין הבדל בין בני 65+ לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתוך סך הפטירות (26%); ובקרב הנשים בנות 65+ השיעור (22%) נמוך מאשר בקרב הנשים בכלל האוכלוסייה (26%); (לוחות 2.9 א, ב, ג).
 - עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, מחלות אחרות של מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-21% בקרב בני 65-74 ל-33% בקרב בני 85+. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-39% בקרב בני 65-74 ל-15% בקרב בני 85+ (לוח 2.9א).
 - ♦ בשנת 2009 נרשמו 44 **התאבדויות** של גברים בני 65 ומעלה ו-14 התאבדויות של נשים בנות 65 ומעלה. אחוז ההתאבדויות של בני 65+ מכלל ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ-31% ב-1981 ל-14% ב-2009 (לוח 2.10).
 - ♦ על פי הסקר החברתי, בשנת 2011 43% מבני 65 ומעלה מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד**, לעומת 81% בקרב בני 20 ומעלה. בקרב בני 65+, 50% מהגברים ו-38% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 21% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב, לעומת 6% בקרב בני 20 ומעלה (לוח 2.11).
 - ♦ על פי הסקר החברתי, בשנת 2010 47% מבני 65+ **עוסקים בפעילות גופנית**. 36% מבני 65+ עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע, 40% מהגברים ו-32% מהנשים. 38% מבני 65-74 עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע ו-33% מבני 75+. בקרב כלל האוכלוסייה, 31% עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע. מתוך בני 65+ העוסקים בפעילות גופנית, 86% עוסקים בפעילות גופנית מתונה ו-12% עוסקים בפעילות גופנית מאומצת. 28% עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק השרירים. מבין בני 65+ שאינם עוסקים בפעילות גופנית 60% ציינו שהסיבה היא בעיה בריאותית או גופנית ו-12% ציינו שהסיבה היא חוסר חשיבות

לפעילות הגופנית. רק 3% ציינו שהסיבה היא העדר תנאים מתאימים (לוח 2.12).

♦ **מדד מסת הגוף (BMI)** מחושב על-פי גובה ומשקל. ערכים שמעל 30 נחשבים להשמנת יתר. על פי הסקר החברתי של 2010 ל-16% בקרב כלל האוכלוסייה יש BMI של 30 ויותר. לעומת זאת, ל-23% מבני 65 ומעלה יש BMI של 30 ויותר (25% מבני 65-74 ו-20% מבני 75 ומעלה). 26% מהנשים סובלות מהשמנת יתר, לעומת 19% מהגברים. בקרב הערבים 27% סובלים מהשמנת יתר לעומת 22% בקרב יהודים ואחרים. אחוז הנשים הערביות הסובלות מהשמנת יתר גבוה במיוחד, 37% (לוח 2.13).

♦ על פי הסקר החברתי של 2010 12% מהקשישים **מעשנים** כיום, פעם בשבוע לפחות, לעומת 25% בכלל האוכלוסייה. אחוז המעשנים בקרב הגברים בני 65+, כפול מאחוז הנשים בנות 65+ המעשנות (16% לעומת 8%). 34% מבני 65+ עישנו בעבר והפסיקו. מבין המעשנים שהפסיקו, 25% עשו זאת בגיל 50-59 ו-26% בגיל 60 ומעלה (לוח 2.14).

♦ על פי הסקר החברתי, בשנת 2010 55% מבני 65 ומעלה מדווחים על **קושי כלשהו להירדם** או לישון במשך לילה שלם לעומת 39% בקרב כלל האוכלוסייה. 52% אחוזים מהגברים בני 65-74 מדווחים על קושי מסוג זה ו-60% מבני 75+. מבין אלה שדיווחו על בעיות שינה (בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה) 84% דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום בגלל בעיות שינה (לוח 2.15).

♦ על פי סקר בריאות 2009, 54% מבני 65+ דיווחו כי רופא אבחן אצלם יתר לחץ דם, 49% מהגברים ו-57% מהנשים. 11% בקרב כלל האוכלוסייה דיווחו על כך. 13% מבני 65+ דיווחו שרופא אבחן אצלם התקף לב או אוטם שריר הלב, 18% בקרב הגברים ו-9% בקרב הנשים (2% בקרב כלל האוכלוסייה). 23% מבני 65+ דיווחו כי רופא אבחן אצלם סוכרת (5% בקרב כלל האוכלוסייה). 12% דיווחו על בעיה כרונית במערכת העיכול, 9% בקרב הגברים ו-14% בקרב הנשים (3% בקרב כלל האוכלוסייה). 8% מבני 65+ דיווחו כי רופא אבחן אצלם דיכאון או חרדה, 5% בקרב הגברים ו-11% בקרב הנשים (3% בקרב כלל האוכלוסייה); (לוח 2.16).

- מקרב אלו שדיווחו כי רופא אבחן אצלם מחלות, רובם **נוטלים תרופות** על פי מרשם רופא בגלל מחלות אלו: יתר לחץ דם (96%), התקף לב, אוטם שריר הלב (88%), שבץ מוחי (75%), סוכרת (92%), אסתמה (85%), מחלת ריאות כרונית (71%), בעיה כרונית במערכת העיכול (82%), מחלה ממארת – סרטן (42%), דיכאון או חרדה (72%); (לוח 2.16).

♦ בשנת 2010 נרשמו 14,406 **מקרים חדשים של שאתות ממאירות** בקרב בני 65+, אשר מהווים 1,868 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים בכלל האוכלוסייה הוא 312 לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. בשונה מכלל האוכלוסייה, שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים הקשישים גבוה יותר מאשר בקרב הנשים הקשישות (2,283 לעומת 1,550 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.17).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה מעט גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים, אולם השיעור בקרב גברים ערבים עלה בהתמדה וב-2010 אין הבדל בין הקבוצות בשיעור המקרים החדשים (2,287 לכל 100,000 נפש בהתאמה). שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,578 לעומת 1,181 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.18). בשנת 2010 שיעור המקרים החדשים בקרב גברים יהודים ואחרים ילידי אירופה-אמריקה היה גבוה מאשר בקרב יהודים ואחרים ילידי אסיה, אפריקה או ישראל. בקרב נשים יהודיות ואחרות, שיעור המקרים החדשים בקרב ילידות אירופה-אמריקה גבוה במעט מזה של ילידות ישראל (1,665 לעומת 1,604) וגבוה מזה של ילידות אסיה וילידות אפריקה (1,356 ו-1,306 בהתאמה); (לוח 2.19).

♦ על פי מחקר שנערך על ידי מאירס-גיוינט-מכון ברוקדייל בקרב האוכלוסייה היהודית נמצא כי אומדן שכיחות **מחלת הדמנטיה** ב-2010 הוא 20% בקרב בני 65+ (כ-139 אלף איש). 88% מהם מתגוררים בקהילה והיתר במוסדות (לוח 2.20).

- מקרב החולים בני +65 המתגוררים בקהילה, 46% לוקים במחלה בדרגת חומרה קלה, 24% לוקים ברמת חומרה בינונית ואילו 30% לוקים בה ברמת חומרה גבוהה. בהשוואה לפי מין נמצא כי 21% מהנשים לוקות במחלה לעומת 15% מהגברים. שכיחות המחלה בקרב בני +65 עולה עם הגיל ומגיעה לשיא בקבוצת בני +85: 47% מבני קבוצת גיל זו לוקים במחלה (לוח 2.21).

◆ לפי נתוני סקר בריאות 2009 אומדן בני +65 המוגבלים בביצוע הפעולות היום-יומיות עומד על 24% (מתקשים או שאינם יכולים לבצע בעצמם לפחות אחת מהפעולות הבאות: להתלבש, לרחוץ פנים וידיים, להתיישב ולקום, להיכנס ולצאת מהמיטה, לאכול). רובם של בני +65 המוגבלים בביצוע פעולות יום-יומיות גרים בקהילה (88%). שיעור המוגבלים עולה עם הגיל. 12% מקרב בני 65-74 מוגבלים לעומת 37% מקרב בני +75. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות יום-יומיות גבוה בקרב הערבים (45%) לעומת היהודים ואחרים (22%); (לוח 2.22).

- מקרב בני +65 הגרים בקהילה, 22% מוגבלים בניידות מחוץ לבית (12% בקרב בני 65-74 ו-34% בקרב בני +75); (לוח 2.23). יש לציין שמקור הנתונים וההגדרות למוגבלות (בלוחות 2.22 ו-2.23) שונים מאלו שהיו בשנתונים קודמים.

◆ בשנת 2011 נפגעו בתאונות דרכים 1,982 בני +65. מתוכם, 3% נהרגו (66 קשישים), 10% נפצעו קשה (199 קשישים) ו-87% נפצעו קל (1,717 קשישים). בהשוואה לנתוני 2010 רואים שמספרם המוחלט של הקשישים שנפגעו עלה, אך ירד אחוז ההרוגים ועלה חלקם של הפצועים קל. 33% מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 40% נהגו ברכב ו-24% נסעו ברכב. מחצית מהקשישים שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (לוח 2.24).

- שיעור בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2011 נמוך מזה שבקרב כלל האוכלוסייה (253 ו-349 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך שיעור ההרוגים בקרב בני +65 כפול מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני +65 (לוח 2.25). שיעור בני +65 שנפגעו

בתאונות דרכים נמצא בירידה מאז שנות התשעים אך עלה בשנתיים האחרונות (לוח 2.26).

- **שיעור הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בקרב כלל האוכלוסייה בשנת 2011 גבוה ב-15% משיעור הנהגים בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים (לוח 2.27).

◆ **שלושים ואחד אחוזים מהקשישים ביקרו אצל רופא משפחה** (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) או התייעצו אתו בטלפון בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות 2009) לעומת 10% בקרב כלל האוכלוסייה. אצל רופא אורתופד ביקרו 3% מבני +65 בשבועיים האחרונים ואצל קרדיולוג ביקרו 2% מבני +65 בשבועיים האחרונים לפני הסקר. אחוז בני +65 אשר ביקרו אצל רופאים גבוה מאשר האחוז בקרב כלל האוכלוסייה, למעט אצל רופא נשים (לוח 2.28).

- בני +65 **מבקרים** בממוצע **אצל רופא משפחה** (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) כ-11 פעמים בשנה לעומת 3 פעמים בממוצע בשנה בקרב כלל האוכלוסייה. בממוצע, מבקרים בני +65 0.8 פעמים בשנה אצל רופא אורתופד, 0.6 פעמים בשנה אצל רופא עיניים ו-0.5 פעמים בשנה אצל רופא קרדיולוג (לוח 2.29).

- שלושים אחוזים מסך הביקורים (כולל ייעוץ טלפוני) אצל רופא משפחה (כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי – בקהילה) נעשים על ידי בני +65. 43% מהביקורים אצל רופא פנימי במרפאות חירום או בבתי חולים נעשים על ידי בני +65. 44% מהביקורים אצל רופא קרדיולוג, 42% מהביקורים אצל רופא אורולוג, 32% מהביקורים אצל רופא עיניים, 30% מהביקורים אצל רופא ריאות ו-29% מהביקורים אצל רופא נירולוג נעשים על ידי בני +65 (לוח 2.30).

◆ כמעט כל בני +65 עשו בדיקת דם בשנה האחרונה (96%) ובדיקת כולסטרול (95%). בקרב כלל האוכלוסייה (בני +20) 80% עשו בדיקת דם ו-83% בדקו כולסטרול, בשנה האחרונה לפני הסקר. 44% מבני +65 עשו בדיקת קולונוסקופייה אי פעם. בקרב כלל האוכלוסייה (בני +50) 37% עשו את הבדיקה (לוח 2.31).

- ◆ לפי הסקר החברתי, בשנת 2010, 57% מבני +65 קיבלו חיסון נגד שפעת, 60% מהגברים ו-55% מהנשים. עם העלייה בגיל עולה שיעור מקבלי החיסון: 53% בקרב בני 65-74 לעומת 62% בקרב בני +75. בקרב כלל האוכלוסייה (בני +20) 23% קיבלו חיסון נגד שפעת (לוח 2.32).
- ◆ לפי הסקר החברתי, 38% מבני +65 עברו בדיקה או טיפול שיניים בשנה האחרונה ו-29% עברו ניקוי שיניים. שיעור מקבלי טיפול השיניים יורד עם הגיל: 42% מבני 65-74 עברו בדיקה או טיפול לעומת 33% מבני +75. 50% מקרב כלל האוכלוסייה (+20) עברו בדיקה או טיפול שיניים בשנה האחרונה לפני הסקר (לוח 2.33).
- ◆ מתוך כלל הביקורים במחלקות לרפואה דחופה (חדרי מיון) בשנת 2009, 19% היו של בני +65. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 459 בקרב בני 65-74; 727 בקרב בני 75-84; 1,015 בקרב בני +85 לעומת 315 בקרב כלל האוכלוסייה. 23% מהביקורים של בני +65 היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) לעומת 18% ביקורים חוזרים בקרב כלל האוכלוסייה (לוח 2.34).
- ◆ תשעה עשר אחוזים מהקשישים דיווחו על אשפוז בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות 2009). שיעור האשפוזים עולה עם הגיל: 16% מבני 65-74 דיווחו על אשפוז; 22% מבני +75, לעומת 6% בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוזים בקרב הערבים גבוה יותר ועמד על 24% לעומת שיעור האשפוזים בקרב קבוצת היהודים ואחרים (19%); (לוח 2.35).
- **שיעורי האשפוז של הקשישים במחלקות האשפוז הכלליות גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה.** בשנת 2010 נרשמו 501 אשפוזים ל-1,000 קשישים במחלקות האשפוז הכלליות, לעומת 146 ל-1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-373 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-784 בגיל +85). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי האשפוז בקרב הזקנים הצעירים (בני 65-74) במגמת ירידה (לוח 2.36).
- **בבחינת שיעור אשפוז הקשישים מכלל האשפוזים נמצא, כי בשנת 2010, כשליש (34%) מהאשפוזים היו של בני +65 (המהווים כ-10% מכלל**

- האוכלוסייה), ו-21% מהאשפוזים היו של בני +75 (המהווים כ-5% מכלל האוכלוסייה); (לוח 2.37). חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים במחלקות טיפול נמרץ נשימתי, עיניים ופנימית גבוה במיוחד (לוח 2.38).
- התפלגות האשפוזים של הקשישים במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה כמחצית האשפוזים (לוח 2.39).
 - השהייה הממוצעת של בני +65 בכלל המחלקות הכלליות בשנת 2010 הייתה 5.4 ימים לעומת 4.1 ימים בקרב כלל האוכלוסייה. המחלקות שבהן משך השהייה של בני +65 הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם, גריאטרייה חריפה, טיפול נמרץ נשימתי ואונקולוגיה (לוח 2.40).
 - ♦ בשנת 2011 קיבלו 5,866 בני +65 (פחות מ-1% מקרב בני +65) טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי. בני +65 מהווים 11% מכלל המטופלים ב-2011 (לוח 2.41).
 - ♦ ב-2011 היו 22 בני +65 באשפוז יום פסיכיאטרי, והם היוו 6% מסך השוהים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 91% מכלל הקשישים השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.42).
 - ♦ בסוף 2011 היו 290 בני +65 מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 0.4 מאושפזים ל-1,000 נפש (שיעור דומה לשיעור המאושפזים בקרב כלל האוכלוסייה). שמונה אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני +65 (לוח 2.43). משנת 1990 ועד שנת 2011 חלה ירידה בשיעור הקשישים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.4 ל-1,000 נפש); (לוח 2.44).
 - במהלך 2011 היו 1,613 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, ואלה היוו 8% מסך הקבלות לאשפוז. 57% מהקבלות של בני +65 היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (60% מכלל האשפוזים של בני +65); (לוח 2.45). שתי האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (70% מהקבלות) היו: הפרעות דלזיונליות והפרעות אפקטיביות וסכיזופרניה (לוח 2.46).
 - אחד עשר אחוזים מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא בשנת 2011 היו של בני +65 (לוח 2.47).

- ♦ בנובמבר שנת 2011 היו 66% מבני +65 **מבוטחים** בשירותי בריאות כללית (לעומת 52% מכלל האוכלוסייה), 19% במכבי שירותי בריאות (לעומת 25% מכלל האוכלוסייה), 7% בקופת חולים לאומית ו-8% בקופת חולים מאוחדת (לעומת 9% ו-14% מכלל האוכלוסייה בהתאמה). יש ירידה לאורך השנים באחוז הקשישים המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 73% בקרב בני 85 ומעלה (לוח 2.48). שלושה עשר אחוזים מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני +65, לעומת 8% במכבי שירותי בריאות, 8% בקופת חולים לאומית ולעומת 6% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.49).

הגדרות והסברים

כלל האוכלוסייה: המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אומדני המוגבלות בקרב הקשישים הגרים בקהילה, מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בסקר שימוש בשירותי בריאות שנערך על ידי הלמ"ס בשנת 2009. אומדני המוגבלות בקרב הקשישים הגרים במוסדות התקבלו מהנתונים המנהליים השוטפים של משרד הבריאות ושל משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשילוב עם נתונים שנאספו ב"משאב" במסגרת מפקד ארצי של דיירי המוסדות שנערך בשנת 2000.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת **סך-כל המחלקות הכלליות** אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

אשפוז פסיכיאטרי: אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

אשפוז מלא: מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

אשפוז יום: מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

קבלות: קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

קבלות ראשונות: קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

נתונים מסקר בריאות

אשפוז: אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוז יום בבתי חולים.

רופא משפחה: רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים במרפאות בקהילה.

רופא שיניים: רופא שיניים ומרפא שיניים, אורתודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

ביקור אצל רופא: ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים או רופא עצמאי בהסדר קופה, במרפאת בית חולים, במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית, במרפאה צבאית וביקור בבית החולה. נכללו התייעצויות בטלפון אך לא נכללו ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

מבקר: אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
 .. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-40%
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומאירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

| בני דתות אחרות | | יהודים | | כלל האוכלוסייה | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | |
| | | 73.2 | 70.5 | | | 1965 |
| | | 73.3 | 69.8 | | | 1970 |
| 71.5 | 68.2 | 74.5 | 70.9 | 73.9 | 70.3 | 1975 |
| 73.4 | 70.0 | 76.2 | 72.5 | 75.7 | 72.1 | 1980 |
| 75.8 | 72.0 | 77.3 | 73.9 | 77.0 | 73.5 | 1985 |
| 75.9 | 73.3 | 78.9 | 75.3 | 78.4 | 74.9 | 1990 |
| 77.3 | 73.8 | 79.8 | 75.9 | 79.5 | 75.5 | 1995 |
| אוכלוסייה ערבית | | יהודים ואחרים* | | כלל האוכלוסייה | | |
| נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | |
| 77.2 | 75.1 | 80.3 | 76.6 | 80.0 | 76.3 | 1996 |
| 76.8 | 74.3 | 80.6 | 76.4 | 80.1 | 76.0 | 1997 |
| 76.8 | 74.4 | 80.7 | 76.4 | 80.3 | 76.1 | 1998 |
| 78.1 | 74.9 | 80.7 | 77.0 | 80.4 | 76.6 | 1999 |
| 77.9 | 74.6 | 81.2 | 77.1 | 80.9 | 76.7 | 2000 |
| 77.8 | 74.5 | 81.6 | 77.7 | 81.2 | 77.3 | 2001 |
| 77.9 | 74.7 | 81.9 | 77.9 | 81.5 | 77.5 | 2002 |
| 78.2 | 74.9 | 82.2 | 78.1 | 81.8 | 77.6 | 2003 |
| 79.6 | 75.4 | 82.7 | 78.5 | 82.4 | 78.0 | 2004 |
| 78.6 | 74.9 | 82.6 | 78.7 | 82.2 | 78.2 | 2005 |
| 78.5 | 75.1 | 83.0 | 79.2 | 82.5 | 78.7 | 2006 |
| 78.8 | 75.2 | 82.8 | 79.2 | 82.4 | 78.7 | 2007 |
| 79.6 | 75.7 | 83.3 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 2008 |
| 80.8 | 76.4 | 83.7 | 80.1 | 83.3 | 79.6 | 2009 |
| 81.3 | 76.6 | 83.9 | 80.3 | 83.6 | 79.7 | 2010 |
| 80.9 | 76.5 | 83.9 | 80.5 | 83.6 | 80.0 | 2011 |

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

| ערבים* | | יהודים | | כלל האוכלוסייה | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | |
| 15.1 | 14.4 | 15.6 | 14.1 | 15.6 | 14.1 | 1979-1975 |
| 15.4 | 14.7 | 16.0 | 14.6 | 16.0 | 14.6 | 1984-1980 |
| 16.1 | 15.8 | 16.8 | 15.1 | 16.8 | 15.2 | 1989-1985 |
| 16.4 | 16.0 | 17.9 | 15.8 | 17.8 | 15.8 | 1994-1990 |
| 17.2 | 16.6 | 18.6 | 16.4 | 18.5 | 16.4 | 1999-1995 |
| 17.2 | 16.0 | 19.8 | 17.7 | 19.7 | 17.5 | 2004-2000 |
| 17.8 | 16.1 | 20.7 | 18.6 | 20.5 | 18.4 | 2009-2005 |
| 18.4 | 16.5 | 21.0 | 18.9 | 20.8 | 18.7 | 2011-2007 |

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי
* עד 1995, בני דתות אחרות

לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

| | בגיל 85 | | בגיל 80 | | בגיל 75 | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| | נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | |
| 1979-1975 | 5.1 | 4.9 | 6.9 | 6.5 | 9.2 | 8.5 | |
| 1984-1980 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 6.6 | 9.3 | 8.7 | |
| 1989-1985 | 5.4 | 5.0 | 7.4 | 6.7 | 10.0 | 9.2 | |
| 1994-1990 | 5.8 | 5.4 | 8.0 | 7.3 | 10.7 | 9.6 | |
| 1999-1995 | 5.8 | 5.6 | 8.1 | 7.5 | 11.1 | 10.1 | |
| 2004-2000 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | 12.1 | 11.0 | |
| 2009-2005 | 6.8 | 6.6 | 9.4 | 8.7 | 12.6 | 11.5 | |
| 2011-2007 | 6.8 | 6.6 | 9.5 | 8.8 | 12.8 | 11.6 | |

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: פטירות של בני +65, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2010

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

| | ערבים | | ⁽¹⁾ יהודים ואחרים | | | סה"כ | | | |
|--|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | נשים | גברים | סה"כ | נשים | גברים | נשים | גברים | סה"כ | |
| בני +65 | 36 | 46 | 40 | 40 | 45 | 42 | 39 | 45 | 42 |
| בני 65-69 | 14 | 23 | 18 | 8 | 14 | 11 | 9 | 15 | 12 |
| בני 70-74 | 21 | 36 | 28 | 15 | 23 | 18 | 15 | 24 | 19 |
| בני +75 | 69 | 84 | 76 | 67 | 76 | 70 | 67 | 76 | 71 |
| בני 75-79 | 40 | 61 | 49 | 27 | 40 | 33 | 28 | 41 | 34 |
| בני 80-84 | 72 | 78 | 74 | 55 | 70 | 61 | 56 | 71 | 62 |
| בני +85 | 133 | 146 | 139 | 129 | 141 | 133 | 129 | 141 | 134 |
| בני 85-89 | 114 | 125 | 118 | 97 | 115 | 104 | 98 | 116 | 105 |
| בני 90-95 | 152 | 159 | 155 | 168 | 179 | 172 | 168 | 177 | 172 |
| בני +95 | 201 | 189 | 194 | 262 | 239 | 254 | 259 | 234 | 250 |
| שיעורים מתוקננים בני +65 ⁽²⁾ | 45 | 58 | 52 | 37 | 47 | 42 | 37 | 48 | 42 |

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. אוכלוסיית התקן היא ממוצע (גברים ונשים) של כלל האוכלוסייה בשנת 2010 לפי קבוצת גיל

לוח 2.5: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2010

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

| בני 75+ | | | בני 65-74 | | | 65+ | |
|---------|-------|------|-----------|-------|------|-------------------|---------------------------------|
| 80+ | 79-75 | סה"כ | 74-70 | 69-65 | סה"כ | | |
| 100 | 36 | 74 | 21 | 13 | 17 | 45 | סה"כ |
| 108 | 44 | 81 | 26 | 17 | 22 | 49 | גברים |
| 95 | 30 | 70 | 17 | 10 | 13 | 42 | נשים |
| 145 | 54 | 94 | 28 | 19 | 23 | 44 ⁽²⁾ | סה"כ ילידי ישראל ⁽²⁾ |
| 161 | 67 | 106 | 35 | 23 | 28 | 50 | גברים |
| 133 | 42 | 85 | 22 | 15 | 18 | 39 | נשים |
| 91 | 33 | 63 | 18 | 11 | 14 | 37 | סה"כ ילידי אסיה |
| 99 | 40 | 71 | 22 | 14 | 18 | 41 | גברים |
| 85 | 26 | 58 | 15 | 8 | 11 | 34 | נשים |
| 94 | 36 | 65 | 20 | 12 | 16 | 36 | סה"כ ילידי אפריקה |
| 101 | 42 | 71 | 27 | 15 | 20 | 41 | גברים |
| 88 | 31 | 60 | 15 | 9 | 12 | 32 | נשים |
| | | | | | | | סה"כ ילידי אירופה- |
| 98 | 33 | 76 | 19 | 12 | 16 | 51 | אמריקה |
| 105 | 39 | 81 | 24 | 16 | 20 | 54 | גברים |
| 94 | 28 | 73 | 15 | 8 | 12 | 49 | נשים |
| | | | | | | | מזה: עולי בריה"מ |
| 122 | 37 | 84 | 23 | 11 | 18 | 48 | לשעבר ⁽³⁾ |
| 133 | 47 | 93 | 30 | 16 | 24 | 52 | גברים |
| 117 | 31 | 79 | 18 | 7 | 13 | 45 | נשים |

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.6: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, 2007-2011

אחוזים

| נשים | גברים | סה"כ | |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 2007 | | | |
| 65.7 | 68.4 | 66.9 | בני +65 |
| 69.9 | 69.4 | 69.6 | בני 65-74 |
| 64.9 | 68.0 | 66.2 | בני +75 |
| 70.1 | 56.4 | 61.6 | בני 0-64 |
| 66.4 | 65.2 | 65.8 | כלל האוכלוסייה |
| 2008 | | | |
| 66.5 | 68.6 | 67.5 | בני +65 |
| 70.8 | 68.4 | 69.4 | בני 65-74 |
| 65.7 | 68.7 | 67.0 | בני +75 |
| 70.1 | 57.1 | 61.9 | בני 0-64 |
| 67.0 | 65.5 | 66.3 | כלל האוכלוסייה |
| 2009 | | | |
| 66.6 | 69.2 | 67.8 | בני +65 |
| 72.1 | 70.0 | 70.9 | בני 65-74 |
| 65.6 | 68.9 | 67.0 | בני +75 |
| 70.7 | 57.6 | 62.7 | בני 0-64 |
| 67.3 | 66.1 | 66.7 | כלל האוכלוסייה |

←

לוח 2.6: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, 2011-2007 (המשך)

אחוזים

| | נשים | גברים | סה"כ | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 2010 | | | | |
| | 66.9 | 69.7 | 68.2 | בני +65 |
| | 72.2 | 70.8 | 71.4 | בני 74-65 |
| | 66.0 | 69.4 | 67.5 | בני +75 |
| | 70.4 | 58.1 | 62.7 | בני 0-64 |
| | 67.5 | 66.6 | 67.1 | כלל האוכלוסייה |
| 2011 | | | | |
| | 66.6 | 69.4 | 67.9 | בני +65 |
| | 71.7 | 68.3 | 69.7 | בני 74-65 |
| | 66.3 | 69.5 | 67.7 | בני +75 |
| | 73.9 | 60.8 | 65.8 | בני 0-64 |
| | 67.7 | 67.2 | 67.4 | כלל האוכלוסייה |

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות
* כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

לוח 2.7: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2010

שיעורים ל-100,000 נפש

| כלל האוכלוסייה | | | בני +65 | | | סה"כ |
|----------------|-------|------|---------|-------|-------|---------------------------------------|
| נשים | גברים | סה"כ | נשים | גברים | סה"כ | |
| 513 | 521 | 515 | 3,905 | 4,448 | 4,140 | סה"כ* |
| 23 | 20 | 21 | 184 | 189 | 186 | מחלות זיהומיות |
| 134 | 138 | 136 | 860 | 1,137 | 980 | שאתות ממאירות |
| 31 | 28 | 30 | 264 | 267 | 265 | סוכרת |
| 13 | 8 | 10 | 109 | 76 | 95 | יתר לחץ-דם |
| 16 | 20 | 18 | 142 | 185 | 161 | אוטם חריף של שריר הלב |
| 33 | 43 | 38 | 288 | 437 | 352 | מחלת לב איסכמית אחרת |
| 31 | 25 | 28 | 265 | 239 | 254 | מחלות לב אחרות |
| 33 | 27 | 30 | 283 | 268 | 276 | מחלות של כלי דם במוח |
| 5 | 7 | 6 | 43 | 65 | 53 | מחלות אחרות של מחזור הדם |
| 12 | 10 | 11 | 105 | 98 | 102 | דלקת ריאות |
| 13 | 17 | 15 | 106 | 172 | 135 | מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה |
| 13 | 11 | 12 | 107 | 112 | 110 | יתר מחלות מערכת הנשימה |
| 4 | 5 | 5 | 29 | 37 | 32 | מחלות כבד |
| 18 | 22 | 20 | 154 | 231 | 187 | מחלות כליה |
| 3 | 3 | 3 | | | | מומים מולדים |
| 21 | 30 | 25 | 150 | 176 | 162 | סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות |
| 88 | 66 | 77 | 721 | 623 | 679 | כל המחלות האחרות |
| 3 | 8 | 5 | 7 | 20 | 12 | תאונות דרכים |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 22 | 12 | פגיעה עצמית מכוונת |
| 12 | 17 | 14 | 81 | 92 | 86 | כל הסיבות החיצוניות האחרות |

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.8: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2010

שיעורים ל-100,000 נפש

| | נשים | | | גברים | | | סה"כ* |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| | 85+ | 84-75 | 74-65 | 85+ | 84-75 | 74-65 | |
| | 12,865 | 4,031 | 1,195 | 14,034 | 5,308 | 1,923 | |
| מחלות זיהומיות | 663 | 197 | 35 | 730 | 215 | 60 | |
| שאתות ממאירות | 1,676 | 1,013 | 512 | 2,396 | 1,422 | 703 | |
| סוכרת | 772 | 294 | 94 | 759 | 335 | 124 | |
| יתר לחץ-דם | 458 | 90 | 20 | 328 | 81 | 21 | |
| אוטם חריף של שריר הלב | 560 | 130 | 28 | 632 | 211 | 77 | |
| מחלת לב איסכמית אחרת | 1,166 | 259 | 52 | 1,589 | 512 | 150 | |
| מחלות לב אחרות | 995 | 272 | 47 | 934 | 271 | 74 | |
| מחלות של כלי דם במוח | 1,000 | 293 | 65 | 836 | 354 | 99 | |
| מחלות אחרות של מחזור הדם | 151 | 44 | 11 | 238 | 61 | 31 | |
| דלקת ריאות | 422 | 93 | 20 | 418 | 105 | 27 | |
| מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה | 344 | 111 | 33 | 487 | 221 | 77 | |
| יתר מחלות מערכת הנשימה | 427 | 97 | 21 | 428 | 140 | 29 | |
| מחלות כבד | 48 | 38 | 17 | 74 | 44 | 25 | |
| מחלות כליה | 552 | 160 | 32 | 854 | 280 | 70 | |
| מומים מולדים | | | | | | | |
| סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות | 520 | 152 | 41 | 505 | 193 | 98 | |
| כל המחלות האחרות | 2,798 | 688 | 138 | 2,478 | 689 | 195 | |
| תאונות דרכים | 8 | 12 | 3 | 19 | 28 | 15 | |
| פגיעה עצמית מכוונת | 8 | 0 | 7 | 40 | 22 | 18 | |
| כל הסיבות החיצוניות האחרות | 295 | 81 | 18 | 291 | 123 | 32 | |

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9א: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2010

| קבוצת גיל | | | | כלל | סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים* |
|-----------|--------|-------|----------------|------------|---------------------------------------|
| 85+ | 84-75 | 74-65 | 65+ האוכלוסייה | האוכלוסייה | |
| 13,320 | 11,812 | 6,016 | 31,148 | 39,415 | אחוזים |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 5.2 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.2 | מחלות זיהומיות |
| 14.6 | 25.9 | 39.2 | 23.7 | 26.3 | שאתות ממאירות |
| 5.8 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | סוכרת |
| 3.1 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | יתר לחץ-דם |
| 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | אוטם חריף של שריר הלב |
| 10.0 | 8.0 | 6.3 | 8.5 | 7.4 | מחלת לב איסכמית אחרת |
| 7.3 | 6.0 | 3.9 | 6.1 | 5.4 | מחלות לב אחרות |
| 7.0 | 7.0 | 5.3 | 6.7 | 5.8 | מחלות של כלי דם במוח |
| 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | מחלות אחרות של מחזור הדם |
| 3.2 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | דלקת ריאות |
| 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה |
| 3.2 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | יתר מחלות מערכת הנשימה |
| 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | מחלות כבד |
| 5.0 | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 3.9 | מחלות כליה |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | מומים מולדים |
| 3.9 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4.9 | סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות |
| 20.1 | 15.1 | 10.7 | 16.4 | 15.0 | כל המחלות האחרות |
| 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | תאונות דרכים |
| 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | פגיעה עצמית מכוונת |
| 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | כל הסיבות החיצוניות האחרות |

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני +65 ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2010

| קבוצת גיל | | | | כלל הגברים | סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים* |
|-----------|-------|-------|--------|---------------|--|
| 85+ | 84-75 | 74-65 | 65+ | | |
| 5,307 | 5,719 | 3,470 | 14,496 | 19,636 | אחוזים |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 5.2 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 3.9 | מחלות זיהומיות |
| 17.1 | 26.8 | 36.6 | 25.6 | 26.5 | שאתות ממאירות |
| 5.4 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | סוכרת |
| 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | יתר לחץ-דם |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | אוטם חריף של שריר הלב |
| 11.3 | 9.7 | 7.8 | 9.8 | 8.3 | מחלת לב איסכמית אחרת |
| 6.7 | 5.1 | 3.8 | 5.4 | 4.8 | מחלות לב אחרות |
| 6.0 | 6.7 | 5.1 | 6.0 | 5.1 | מחלות של כלי דם במוח |
| 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | מחלות אחרות של מחזור הדם |
| 3.0 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | דלקת ריאות |
| 3.5 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה |
| 3.1 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | יתר מחלות מערכת הנשימה |
| 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | מחלות כבד |
| 6.1 | 5.3 | 3.7 | 5.2 | 4.3 | מחלות כליה |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | מומים מולדים |
| 3.6 | 3.6 | 5.1 | 4.0 | 5.7 | סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות |
| 17.7 | 13.0 | 10.1 | 14.0 | 12.7 | כל המחלות האחרות |
| 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | תאונות דרכים |
| 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | פגיעה עצמית מכוונת |
| 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | כל הסיבות החיצוניות האחרות |

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.9: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +65 ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2010

| | קבוצת גיל | | | כלל הנשים | סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים* |
|--|-----------|-------|-------|-----------|-------------------------------|
| | 85+ | 84-75 | 74-65 | | |
| | 8,013 | 6,093 | 2,546 | 16,652 | 19,779 |
| | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 5.2 | 4.9 | 2.9 | 4.7 | 4.4 |
| | 13.0 | 25.1 | 42.8 | 22.0 | 26.2 |
| | 6.0 | 7.3 | 7.9 | 6.8 | 6.1 |
| | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 2.5 |
| | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 3.2 |
| | 9.1 | 6.4 | 4.3 | 7.4 | 6.5 |
| | 7.7 | 6.7 | 3.9 | 6.8 | 6.1 |
| | 7.8 | 7.3 | 5.5 | 7.2 | 6.4 |
| | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 2.4 |
| | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
| | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.5 |
| | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
| | 4.3 | 4.0 | 2.7 | 3.9 | 3.5 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
| | 21.8 | 17.1 | 11.5 | 18.5 | 17.2 |
| | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 2.3 |

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.10: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

| | כלל האוכלוסייה | | 75+ | | 74-65 | | 65+ | | מספרים מוחלטים |
|------|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|
| | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | גברים | נשים | |
| 1981 | 79 | 132 | 9 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | |
| 1990 | 84 | 220 | 12 | 29 | 14 | 30 | 26 | 59 | |
| 2000 | 87 | 307 | 13 | 39 | 15 | 19 | 28 | 58 | |
| 2005 | 115 | 297 | 19 | 32 | 10 | 17 | 29 | 49 | |
| 2006 | 85 | 280 | 13 | 22 | 5 | 24 | 18 | 46 | |
| 2007 | 63 | 263 | 7 | 29 | 8 | 19 | 15 | 48 | |
| 2008 | 60 | 294 | 11 | 43 | 9 | 19 | 20 | 62 | |
| 2009 | 94 | 310 | 8 | 23 | 6 | 21 | 14 | 44 | |

| אחוזים מכלל ההתאבדויות | | | | | |
|------------------------|-------|------|-------|------|------|
| 65+ | סה"כ | 75+ | 74-65 | 64-0 | |
| 30.8 | 100.0 | 9.0 | 21.8 | 69.2 | 1981 |
| 28.0 | 100.0 | 13.5 | 14.5 | 72.0 | 1990 |
| 21.8 | 100.0 | 13.2 | 8.6 | 78.2 | 2000 |
| 18.9 | 100.0 | 12.4 | 6.6 | 81.1 | 2005 |
| 17.5 | 100.0 | 9.6 | 7.9 | 82.7 | 2006 |
| 19.3 | 100.0 | 11.0 | 8.3 | 80.4 | 2007 |
| 23.2 | 100.0 | 15.3 | 7.9 | 76.8 | 2008 |
| 14.4 | 100.0 | 7.7 | 6.7 | 85.6 | 2009 |

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.11: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, 2011

אחוזים

| נשים | גברים | סה"כ | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | סה"כ בני 65+ |
| 8.7 | 13.2 | 10.7 | טוב מאוד |
| 29.0 | 36.9 | 32.4 | טוב |
| 37.8 | 33.3 | 35.9 | לא כל כך טוב |
| 24.5 | 16.5 | 21.0 | בכלל לא טוב |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | כלל האוכלוסייה* |
| 50.1 | 53.5 | 51.7 | טוב מאוד |
| 29.4 | 30.0 | 29.7 | טוב |
| 14.3 | 11.4 | 12.9 | לא כל כך טוב |
| 6.2 | 5.1 | 5.6 | בכלל לא טוב |
| | | | דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל |
| 37.7 | 50.1 | 43.1 | סה"כ בני 65+ |
| | | | גיל |
| 49.3 | 60.8 | 54.3 | 74-65 |
| 22.9 | 36.1 | 28.5 | 75+ |
| 79.5 | 83.5 | 81.4 | כלל האוכלוסייה* |

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.12: בני +65 וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג פעילות, גיל ומין, 2010

אחוזים

| נשים | גברים | סה"כ | |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| עוסקים בפעילות גופנית⁽¹⁾ | | | |
| 43.3 | 51.3 | 46.8 | סה"כ בני +65 |
| 45.8 | 54.2 | 49.5 | 74-65 |
| 40.2 | 47.5 | 43.4 | 75+ |
| 46.7 | 55.3 | 50.9 | כלל האוכלוסייה ⁽³⁾ |
| עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע⁽¹⁾ | | | |
| 31.9 | 40.4 | 35.6 | סה"כ בני +65 |
| 34.4 | 42.2 | 37.9 | 74-65 |
| 28.7 | 38.1 | 32.8 | 75+ |
| 28.1 | 34.3 | 31.1 | כלל האוכלוסייה ⁽³⁾ |
| עוסקים בפעילות גופנית מאומצת (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)⁽²⁾ | | | |
| 8.7 | 15.3 | 11.9 | סה"כ בני +65 |
| 12.6 | 20.4 | 16.4 | 74-65 |
| .. | (7.8) | (5.4) | 75+ |
| 40.0 | 56.6 | 48.7 | כלל האוכלוסייה ⁽³⁾ |
| עוסקים בפעילות גופנית מתונה (מתוך העוסקים בפעילות גופנית)⁽²⁾ | | | |
| 82.7 | 88.9 | 85.7 | סה"כ בני +65 |
| 85.7 | 87.2 | 86.4 | 74-65 |
| 78.4 | 91.4 | 84.6 | 75+ |
| 75.8 | 69.0 | 72.2 | כלל האוכלוסייה ⁽³⁾ |

לוח 2.12: בני +65 וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג פעילות, גיל ומין, 2010 (המשך)

אחוזים

| נשים | גברים | סה"כ | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק שרירים (מתוך העוסקים בפעילות גופנית) |
| 32.5 | 23.0 | 27.9 | סה"כ בני +65 |
| 32.6 | 22.9 | 27.9 | 74-65 |
| 32.3 | 23.1 | 27.9 | 75+ |
| 33.0 | 34.0 | 33.5 | כלל האוכלוסייה ⁽³⁾ |
| | | | סיבה עיקרית לאי-עיסוק בפעילות גופנית (מתוך שאינם עוסקים בפעילות גופנית) |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | סה"כ בני +65 |
| 64.3 | 54.0 | 60.2 | בעיה בריאותית או גופנית |
| 9.5 | 14.8 | 11.6 | לא נראה חשוב |
| 7.6 | 7.3 | 7.5 | עייפות |
| 6.7 | 7.3 | 6.9 | חוסר בזמן |
| 5.6 | 8.3 | 6.7 | סיבה אחרת |
| (3.5) | (4.0) | 3.7 | שעמום |
| (2.8) | (4.3) | 3.4 | אין תנאים מתאימים בקרבת הבית או העבודה |

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בשלושה החודשים שקדמו לראיון
2. שנמשכה לפחות 10 דקות ברצף
3. אוכלוסיית הסקר היא בני +20

לוח 2.13: בני +65 וכלל האוכלוסייה לפי מדד BMI⁽¹⁾, גיל ומין, 2010

אחוזים

| כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ | בני +65 | | | סה"כ |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | נשים | גברים | סה"כ | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | סה"כ |
| 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | תת משקל (עד 18.4) |
| 46.6 | 32.0 | 32.1 | 32.1 | משקל תקין (18.5 עד 24.9) |
| 34.5 | 40.2 | 47.9 | 43.7 | משקל עודף (25 עד 29.9) |
| 12.1 | 18.9 | 14.1 | 16.7 | השמנה (30 עד 34.9) |
| 3.9 | 7.4 | 4.4 | 6.0 | השמנת יתר (35 ומעלה) |
| | | | | סובלים מהשמנה (BMI 30 ומעלה) |
| | 26.3 | 18.5 | 22.7 | סה"כ בני +65 |
| | | | | גיל |
| | 29.2 | 19.2 | 24.6 | 74-65 |
| | 22.4 | 17.7 | 20.2 | 75+ |
| | | | | קבוצת אוכלוסייה |
| | 25.6 | 18.5 | 22.4 | יהודים ואחרים |
| | 36.6 | (18.4) | 27.0 | ערבים |
| | 16.8 | 15.3 | 16.0 | כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ |

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. מדד BMI לבדיקת יחס גובה ומשקל, נקבע באמצעות חלוקת המשקל בק"ג בריבוע הגובה במטרים
2. אוכלוסיית הסקר היא בני +20

לוח 2.14: בני +65 וכלל האוכלוסייה המעשנים, לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

| נשים | גברים | סה"כ | |
|--------|--------|-------|--|
| 8.1 | 16.1 | 11.6 | מעשנים כיום, לפחות פעם בשבוע |
| 95.8 | 95.2 | 95.4 | מעשנים סיגריות כיום (מתוך המעשנים לפחות פעם בשבוע) |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | מעשנים לפי מספר הסיגריות ביום |
| | | | סה"כ ⁽¹⁾ |
| (14.7) | (15.4) | 15.2 | 5-1 |
| 38.4 | 20.6 | 27.5 | 10-6 |
| 32.4 | 48.7 | 42.4 | 20-11 |
| .. | (9.7) | (9.6) | 40-21 |
| 17.3 | 56.6 | 33.7 | עישנו בעבר, לפחות פעם בשבוע, והפסיקו |
| | | | גיל הפסקת עישון (מתוך אלו שעישנו בעבר והפסיקו) |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | סה"כ |
| 0.9 | 3.1 | 2.5 | עד 19 |
| 8.3 | 11.2 | 10.3 | 29-20 |
| 14.1 | 14.4 | 14.3 | 39-30 |
| 16.0 | 23.7 | 21.4 | 49-40 |
| 27.0 | 24.5 | 25.2 | 59-50 |
| 33.8 | 23.1 | 26.3 | 60 ומעלה |
| 15.7 | 36.5 | 24.6 | כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ המעשנים כיום לפחות פעם בשבוע |

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. הסה"כ כולל גם מעשנים פחות מסיגריות ליום או מעשנים יותר מ-40 סיגריות ביום
2. אוכלוסיית הסקר היא בני +20

לוח 2.15: בני +65 וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

| כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ | בני +65 | | סה"כ | |
|-------------------------------|---------|-------|-------|---|
| | נשים | גברים | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | דיווחו על קושי להירדם או לישון במשך לילה שלם |
| 14.4 | 33.0 | 26.7 | 30.3 | סה"כ |
| 11.3 | 15.6 | 10.9 | 13.5 | בכל לילה או כמעט בכל לילה פעמיים - שלוש בשבוע |
| 13.3 | 13.0 | 9.8 | 11.6 | פעם בשבוע או פחות |
| 61.0 | 38.4 | 52.6 | 44.6 | לא היה קושי |
| 39.0 | 61.6 | 47.4 | 55.4 | דיווחו על קושי כלשהו להירדם או לישון במשך לילה שלם |
| | 57.8 | 43.9 | 51.7 | סה"כ |
| | 66.4 | 51.8 | 60.0 | 74-65 |
| | | | | 75+ |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום, בגלל בעיות שינה⁽³⁾ |
| 15.6 | 25.6 | 16.1 | 22.0 | סה"כ |
| 30.2 | 36.1 | 29.5 | 33.6 | עייפות רבה מאד |
| 38.6 | 23.7 | 36.1 | 28.4 | עייפות רבה |
| 15.6 | 14.6 | 18.3 | 16.0 | עייפות קלה |
| | | | | אין עייפות כלל |
| 84.4 | 85.4 | 81.7 | 84.0 | דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום כלשהם במשך היום, בגלל בעיות שינה⁽³⁾ |
| | 82.1 | 79.7 | 81.2 | סה"כ |
| | 89.0 | 83.8 | 87.0 | 74-65 |
| | | | | 75+ |

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. בחודש האחרון
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה
3. מתוך אלו שיש להם קשיים להירדם או לישון

לוח 2.16: בני +65 וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלה מהמחלות הבאות ואלו שנטלו תרופה למחלה זו, לפי מין, 2009

אחוזים

| כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ | בני +65 | | סה"כ | |
|---|---------|-------|------|-----------------------------|
| | נשים | גברים | | |
| 11.1 | 57.3 | 48.7 | 53.5 | יתר לחץ דם |
| 2.2 | 8.8 | 18.3 | 13.0 | התקף לב, אוטם שריר הלב |
| 2.7 | 15.0 | 13.4 | 14.3 | מחלת לב אחרת ⁽¹⁾ |
| 0.9 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | שבץ מוחי |
| 4.9 | 23.8 | 21.7 | 22.9 | סוכרת |
| 3.7 | 7.3 | 5.7 | 6.6 | אסתמה |
| 1.7 | 7.3 | 5.5 | 6.5 | מחלת ריאות כרונית |
| 2.7 | 13.9 | 8.8 | 11.6 | בעיה כרונית במערכת העיכול |
| 1.6 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | מחלה ממארת - סרטן |
| 2.5 | 10.7 | 5.4 | 8.4 | דיכאון או חרדה |
| נטלו תרופות לפי מרשם רופא בגלל מחלה זו⁽²⁾ | | | | |
| 87.6 | 95.8 | 95.1 | 95.5 | יתר לחץ דם |
| 87.8 | 83.8 | 89.7 | 87.5 | התקף לב, אוטם שריר הלב |
| 72.9 | 78.8 | 86.7 | 82.1 | מחלת לב אחרת ⁽¹⁾ |
| 78.6 | 79.4 | 70.4 | 75.2 | שבץ מוחי |
| 88.8 | 93.8 | 89.4 | 92.0 | סוכרת |
| 76.3 | 83.7 | 87.4 | 85.1 | אסתמה |
| 63.9 | 72.0 | 68.9 | 70.9 | מחלת ריאות כרונית |
| 79.1 | 83.9 | 79.1 | 82.3 | בעיה כרונית במערכת העיכול |
| 42.8 | 41.1 | 43.2 | 42.0 | מחלה ממארת - סרטן |
| 73.4 | 68.0 | 82.3 | 72.0 | דיכאון או חרדה |

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל הפרעות בקצב הלב
2. מתוך אלו שדיווחו על המחלה

לוח 2.17: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2010

סוף שנה

| כלל | האוכלוסייה | 85+ | 84-80 | 79-75 | 74-70 | 69-65 | 65+ | |
|--------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|------------------------------|
| | | | | | | | | מספרים מוחלטים |
| 28,297 | 2,302 | 2,467 | 3,053 | 3,646 | 2,938 | 14,406 | סה"כ | |
| 13,143 | 1,110 | 1,193 | 1,640 | 1,964 | 1,624 | 7,531 | גברים | |
| 15,154 | 1,192 | 1,274 | 1,413 | 1,682 | 1,314 | 6,875 | נשים | |
| | | | | | | | | שיעורים ל-100,000 נפש |
| 312 | 3,683 | 2,137 | 2,031 | 1,893 | 1,453 | 1,868 | סה"כ | |
| 305 | 4,458 | 2,672 | 2,597 | 2,302 | 1,740 | 2,283 | גברים סה"כ | |
| 10 | 257 | 112 | 109 | 62 | 67 | 88 | מזה: קיבה | |
| 37 | 715 | 434 | 356 | 325 | 189 | 307 | מעיי גס וחלחולת | |
| 33 | 357 | 287 | 332 | 267 | 233 | 269 | ריאה | |
| 60 | 598 | 412 | 568 | 620 | 487 | 539 | ערמונית | |
| 27 | 466 | 313 | 278 | 240 | 177 | 239 | שלפוחית השתן | |
| 19 | 165 | 139 | 104 | 105 | 66 | 95 | לימפומה ממארת | |
| 11 | 161 | 123 | 68 | 82 | 28 | 65 | ליקמיה | |
| 324 | 3,169 | 1,799 | 1,620 | 1,568 | 1,206 | 1,550 | נשים סה"כ | |
| 6 | 112 | 52 | 56 | 51 | 27 | 46 | מזה: קיבה | |
| 30 | 593 | 299 | 250 | 199 | 149 | 220 | מעיי גס וחלחולת | |
| 15 | 210 | 135 | 132 | 101 | 83 | 108 | ריאה | |
| 91 | 534 | 345 | 319 | 418 | 354 | 379 | שד | |
| 7 | 61 | 34 | 38 | 31 | 32 | 35 | שחלה | |
| 5 | 122 | 72 | 40 | 36 | 19 | 38 | שלפוחית השתן | |
| 16 | 119 | 88 | 87 | 76 | 44 | 68 | לימפומה ממארת | |
| 7 | 109 | 51 | 41 | 27 | 17 | 32 | ליקמיה | |

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

לוח 2.18: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני +65, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, 2010-2005

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| גברים | | | | | | |
| 2,287 | 2,265 | 2,281 | 2,478 | 2,309 | 2,221 | סה"כ יהודים ואחרים* |
| 91 | 84 | 89 | 92 | 91 | 92 | מזה: קיבה |
| 307 | 333 | 378 | 402 | 379 | 361 | מעני גס וחלחולת |
| 252 | 235 | 229 | 249 | 231 | 223 | ריאה |
| 559 | 546 | 611 | 691 | 556 | 549 | ערמונית |
| 239 | 238 | 238 | 234 | 236 | 210 | שלפוחית השתן |
| 97 | 97 | 95 | 105 | 111 | 103 | לימפומה ממארת |
| 62 | 61 | 37 | 46 | 58 | 58 | ליקמיה |
| 2,286 | 2,179 | 2,005 | 2,130 | 2,062 | 2,151 | סה"כ ערבים |
| 57 | 83 | 52 | 84 | 101 | 80 | מזה: קיבה |
| 305 | 285 | 284 | 251 | 229 | 304 | מעני גס וחלחולת |
| 449 | 462 | 372 | 471 | 392 | 429 | ריאה |
| 354 | 303 | 365 | 442 | 353 | 408 | ערמונית |
| 255 | 241 | 184 | 257 | 309 | 257 | שלפוחית השתן |
| 82 | 101 | 73 | 86 | 95 | 99 | לימפומה ממארת |
| 73 | 63 | 52 | 56 | 66 | 77 | ליקמיה |
| נשים | | | | | | |
| 1,578 | 1,574 | 1,564 | 1,555 | 1,468 | 1,490 | סה"כ יהודיות ואחרות* |
| 47 | 46 | 48 | 45 | 47 | 43 | מזה: קיבה |
| 222 | 225 | 259 | 258 | 243 | 259 | מעני גס וחלחולת |
| 111 | 109 | 98 | 108 | 85 | 85 | ריאה |
| 394 | 392 | 396 | 358 | 343 | 366 | שד |
| 36 | 34 | 39 | 39 | 40 | 39 | שחלה |
| 38 | 49 | 43 | 45 | 37 | 35 | שלפוחית השתן |
| 67 | 80 | 72 | 80 | 76 | 78 | לימפומה ממארת |
| 31 | 41 | 28 | 34 | 31 | 35 | ליקמיה |
| 1,181 | 1,231 | 1,182 | 1,232 | 995 | 1,136 | סה"כ ערביות |
| 34 | 49 | 33 | 34 | 52 | 62 | מזה: קיבה |
| 202 | 224 | 215 | 216 | 151 | 158 | מעני גס וחלחולת |
| 58 | 80 | 58 | 56 | 48 | 85 | ריאה |
| 205 | 232 | 286 | 303 | 219 | 201 | שד |
| 27 | 12 | 36 | 33 | 18 | 26 | שלפוחית השתן |

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.19: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים* בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2010

סוף שנה

| 75+ | 74-70 | 69-65 | 65+ | |
|------------------------------|-------|-------|---------------|----------------------------|
| מספרים מוחלטים | | | | |
| 7,461 | 3,392 | 2,662 | 13,515 | סה"כ יהודים ואחרים בני +65 |
| 3,719 | 1,804 | 1,454 | 6,977 | גברים |
| 3,742 | 1,588 | 1,208 | 6,538 | נשים |
| שיעורים ל-100,000 נפש | | | | |
| גברים | | | | |
| 2,527 | 1,760 | 1,979 | 2,073 | ילידי ישראל |
| 2,897 | 2,982 | 1,721 | 2,418 | ילידי אירופה-אמריקה |
| 2,360 | 1,907 | 1,483 | 1,855 | ילידי אסיה |
| 2,517 | 1,767 | 1,844 | 2,015 | ילידי אפריקה |
| נשים | | | | |
| 1,897 | 1,665 | 1,369 | 1,604 | ילידות ישראל |
| 1,995 | 2,094 | 1,157 | 1,665 | ילידות אירופה-אמריקה |
| 1,561 | 1,287 | 1,265 | 1,356 | ילידות אסיה |
| 1,496 | 1,253 | 1,215 | 1,306 | ילידות אפריקה |

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות
* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.20: אומדן בני +65 יהודים ואחרים⁽¹⁾ הסובלים מדמנטיה, 2010

סוף שנה

| במוסדות ⁽²⁾ | בקהילה | סה"כ | |
|------------------------|--------|--------------|------------------------------|
| 16.3 | 122.4 | 138.7 | אלפים |
| 11.8 | 88.2 | 100.0 | אחוזים |
| 69.9 | 18.1 | 19.8 | אחוז מתוך האוכלוסייה המתאימה |

מקור: ורטמן, א'; ברודסקי, ג'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2005, קשישים הלוקים בדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, מאיירס-גוינט-מכון ברוקדייל - עיבוד מיוחד

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת (ראו מבוא)
2. כולל: בתי אבות, בתי חולים לחולים כרוניים ומחלקות סיעודיות

לוח 2.21: אומדן בני 65+ יהודים ואחרים⁽¹⁾ הגרים בקהילה וסובלים מדמנטיה, לפי חומרת המחלה, גיל ומין, 2010

אחוזים, סוף שנה

| רמת החומרה של המחלה | | | | אומדן הסובלים מדמנטיה | גיל |
|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| גבוהה | בינונית | קלה | סה"כ ⁽²⁾ | | |
| 30.1 | 24.0 | 45.9 | 100.0 | 18.1 | בני 65+ |
| 33.8 | 27.6 | 38.6 | 100.0 | 25.8 | בני 75+ |
| 27.3 | 8.9 | 63.9 | 100.0 | 9.6 | 69-65 |
| 18.3 | 22.5 | 59.2 | 100.0 | 12.6 | 74-70 |
| 40.5 | 23.2 | 36.2 | 100.0 | 19.1 | 79-75 |
| 11.7 | 41.8 | 46.5 | 100.0 | 17.2 | 84-80 |
| 39.1 | 24.1 | 36.7 | 100.0 | 46.7 | בני 85+ |
| מין | | | | | |
| 27.6 | 28.0 | 44.4 | 100.0 | 14.9 | גברים |
| 30.7 | 21.6 | 47.7 | 100.0 | 20.5 | נשים |

מקור: ורטמן, א'; ברודסקי, ג'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2005, קשישים הלוקים בדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל - עיבוד מיוחד

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת
2. הנתונים לגבי חומרת המחלה מתייחסים ל-95% מבני 65+ הגרים בקהילה ושעבורם התקבל דיווח בנוגע לכך

לוח 2.22: אומדן בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היום-יומיות (ADL), 2010

סוף שנה

| אלפים | אחוזים | אחוז המוגבלים מתוך בני 65+ ⁽¹⁾ |
|-------------------------------------|--------------|---|
| 180.4 | 100.0 | 23.6 |
| סה"כ מוגבלים | | |
| מקום מגורים | | |
| 157.8 | 87.5 | 21.3 |
| בקהילה ⁽²⁾ | | |
| 22.6 | 12.5 | 95.4 |
| במוסדות לטיפול ממושך ⁽³⁾ | | |
| גיל | | |
| 46.4 | 25.7 | 11.6 |
| בני 65-74 | | |
| 134.1 | 74.3 | 36.8 |
| בני 75+ | | |
| מין | | |
| 57.0 | 31.6 | 17.2 |
| גברים | | |
| 123.4 | 68.4 | 28.6 |
| נשים | | |
| קבוצת אוכלוסייה | | |
| 151.8 | 84.2 | 21.7 |
| יהודים ואחרים | | |
| 28.6 | 15.8 | 45.4 |
| ערבים | | |

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד על סקר בריאות 2009; משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה

1. מתוך האוכלוסייה המתאימה
2. מתקשים או שאינם יכולים לבצע בעצמם לפחות אחת מהפעולות הבאות: להתלבש, לרחוץ פנים וידיים, להתיישב ולקום, להיכנס ולצאת מהמיטה, לאכול (כולל חיתוך האוכל). יש לציין שהחל מהשנתון של שנת 2010, מקור הנתונים והגדרת המוגבלות שונים ממה שפורסם בשנתונים קודמים
3. דיירים תשושים, סיעודיים ותשושי נפש

לוח 2.23: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה המוגבלים בניידות מחוץ לבית*, 2010

סוף שנה

| אחוז המוגבלים מתוך בני 65+ הגרים בקהילה | אחוזים | אלפים | |
|---|--------------|--------------|------------------------|
| 22.1 | 100.0 | 163.2 | סה"כ מוגבלים |
| | | | גיל |
| 11.5 | 27.8 | 45.4 | בני 65-74 |
| 34.3 | 72.2 | 117.8 | בני 75+ |
| | | | מין |
| 16.4 | 32.7 | 53.3 | גברים |
| 26.5 | 67.3 | 109.9 | נשים |
| | | | קבוצת אוכלוסייה |
| 19.8 | 82.1 | 134.0 | יהודים ואחרים |
| 46.7 | 17.9 | 29.2 | ערבים |

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד על סקר בריאות 2009

* לא מסוגלים או זקוקים לעזרת אדם/מכשיר/מעקה כדי ללכת מחוץ לבית או לעלות ולרדת קומה אחת. יש לציין שהחל מהשנתון של 2010, מקור הנתונים והגדרת המוגבלות שונים ממה שהתפרסם בשנתונים קודמים

לוח 2.24: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2011

מספרים מוחלטים

| סה"כ | הרוגים | פצועים קשה | פצועים קל | |
|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| בני +65 | | | | |
| סה"כ | 66 | 199 | 1,717 | |
| גברים | 41 | 106 | 981 | |
| נשים | 25 | 93 | 736 | |
| בני 65-74 | | | | |
| סה"כ | 23 | 89 | 1,090 | |
| גברים | 17 | 48 | 631 | |
| נשים | 6 | 41 | 459 | |
| בני +75 | | | | |
| סה"כ | 43 | 110 | 627 | |
| גברים | 24 | 58 | 350 | |
| נשים | 19 | 52 | 277 | |
| בני +65 לפי מעמד הנפגע | | | | |
| הולך רגל | 34 | 122 | 497 | |
| נהג רכב | 16 | 36 | 731 | |
| נוסע ברכב | 8 | 28 | 435 | |
| אחר | 8 | 13 | 54 | |
| בני +65 לפי קבוצת אוכלוסייה* | | | | |
| יהודים | 54 | 165 | 1,522 | |
| ערבים | 11 | 31 | 139 | |
| כלל האוכלוסייה | | | | |
| סה"כ | 341 | 1,340 | 25,460 | |
| גברים | 255 | 924 | 14,973 | |
| נשים | 86 | 416 | 10,487 | |

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.25: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2011

שיעורים ל-100,000 נפש

| פצועים קשה | פצועים קל | הרוגים | סה"כ | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| בני 65+ | | | | |
| 219 | 25 | 8 | 253 | סה"כ |
| 288 | 31 | 12 | 331 | גברים |
| 166 | 21 | 6 | 193 | נשים |
| בני 65-74 | | | | |
| 264 | 22 | 6 | 292 | סה"כ |
| 333 | 25 | 9 | 367 | גברים |
| 206 | 18 | 3 | 227 | נשים |
| בני 75+ | | | | |
| 169 | 30 | 12 | 210 | סה"כ |
| 232 | 38 | 16 | 286 | גברים |
| 125 | 24 | 9 | 158 | נשים |
| קבוצת אוכלוסייה* | | | | |
| 219 | 24 | 8 | 251 | יהודים |
| 218 | 49 | 17 | 330 | ערבים |
| כלל האוכלוסייה | | | | |
| 328 | 17 | 4 | 349 | סה"כ |
| 390 | 24 | 7 | 421 | גברים |
| 267 | 11 | 2 | 280 | נשים |

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; שנתון סטטיסטי * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.26: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש

| מזה: הרוגים | | סה"כ נפגעים | | |
|----------------|----------|----------------|------------|-------------|
| כלל האוכלוסייה | בני 65+ | כלל האוכלוסייה | בני 65+ | |
| 9 | 24 | 442 | 378 | 1985 |
| 9 | 23 | 594 | 459 | 1990 |
| 9 | 23 | 818 | 408 | 1996 |
| 9 | 21 | 814 | 385 | 1997 |
| 9 | 21 | 826 | 379 | 1998 |
| 8 | 18 | 743 | 363 | 1999 |
| 8 | 12 | 584 | 219 | 2001 |
| 8 | 16 | 581 | 290 | 2002 |
| 7 | 12 | 554 | 273 | 2003 |
| 7 | 13 | 542 | 283 | 2004 |
| 6 | 12 | 512 | 277 | 2005 |
| 6 | 12 | 509 | 295 | 2006 |
| 6 | 11 | 457 | 278 | 2007 |
| 6 | 11 | 435 | 275 | 2008 |
| 4 | 8 | 425 | 249 | 2009 |
| 5 | 10 | 368 | 250 | 2010 |
| 4 | 8 | 349 | 253 | 2011 |

מקור: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.27: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2011

| חומרת התאונות | | | | |
|---------------|------------|-----------|--------------|---|
| קלות | קשות | קטלניות | סה"כ | |
| | | | | מספרים מוחלטים |
| 1,675 | 117 | 47 | 1,839 | נהגים מעורבים בני 65+ |
| | | | | גיל |
| 1,165 | 78 | 29 | 1,272 | בני 65-74 |
| 510 | 39 | 18 | 567 | בני 75+ |
| | | | | מין |
| 1,372 | 98 | 43 | 1,513 | גברים |
| 303 | 19 | 4 | 326 | נשים |
| | | | | כלל הנהגים המעורבים |
| 23,452 | 1,679 | 498 | 25,629 | סה"כ ⁽¹⁾ |
| 16,382 | 1,333 | 431 | 18,146 | גברים |
| 5,994 | 269 | 52 | 6,315 | נשים |
| | | | | שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾ |
| | | | | נהגים מעורבים בני 65+ |
| 57 | 4 | 2 | 62 | סה"כ |
| 68 | 5 | 2 | 75 | גברים |
| 32 | 2 | 0 | 35 | נשים |
| | | | | כלל הנהגים המעורבים |
| 65 | 5 | 1 | 71 | סה"כ |
| 79 | 6 | 2 | 87 | גברים |
| 40 | 2 | 0 | 42 | נשים |

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2010 ובסוף 2011

לוח 2.28: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא או התייעצו איתו בטלפון בשבועיים האחרונים, לפי מין והתמחות הרופא, 2009

אחוזים

| כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ | בני +65 | | | סה"כ | |
|-------------------------------|---------|-------|------|------|--|
| | נשים | גברים | סה"כ | | |
| 9.5 | 32.0 | 29.1 | 30.7 | 30.7 | רופא משפחה או רופא כללי ⁽¹⁾ |
| 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | רופא פנימי ⁽²⁾ |
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | רופא עור ומין |
| 1.3 | 3.3 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | רופא אורתופד |
| 0.4 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | רופא קרדיולוג |
| 1.9 | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | רופא נשים |
| 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | רופא אורולוג |
| 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | רופא אף אוזן גרון |
| 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | רופא נירולוג |
| 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | רופא כירורג |
| 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | רופא עיניים |
| 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | רופא ריאות |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | רופא פסיכיאטר |

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
2. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

לוח 2.29: ביקורים של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהלך שנה, לפי מין והתמחות הרופא, 2009

ממוצע לנפש

| כלל האוכלוסייה ⁽²⁾ | בני +65 | | סה"כ |
|--|---------|-------|------|
| | נשים | גברים | |
| | | | 11.2 |
| רופא משפחה או רופא כללי ⁽¹⁾ | 11.6 | 10.8 | 11.2 |
| רופא פנימי ⁽²⁾ | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| רופא עור ומין | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| רופא אורתופד | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| רופא קרדיולוג | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| רופא נשים | 0.2 | | 0.2 |
| רופא אורולוג | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| רופא אף אוזן גרון | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| רופא נוירולוג | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| רופא כירורג | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| רופא עיניים | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| רופא ריאות | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| רופא פסיכיאטר | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
2. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

לוח 2.30: ביקורים⁽¹⁾ של בני +65 אצל רופא מתוך סך הביקורים של כלל האוכלוסייה במהלך שנה, לפי התמחות הרופא, 2009

אחוזים

| סה"כ | |
|------|--|
| 30.6 | רופא משפחה או רופא כללי ⁽²⁾ |
| 42.8 | רופא פנימי ⁽³⁾ |
| 11.7 | רופא עור ומין |
| 19.3 | רופא אורתופד |
| 43.7 | רופא קרדיולוג |
| 2.9 | רופא נשים |
| 41.7 | רופא אורולוג |
| 16.6 | רופא אף אוזן גרון |
| 28.7 | רופא נירולוג |
| 21.3 | רופא כירורג |
| 32.2 | רופא עיניים |
| 29.7 | רופא ריאות |
| 13.8 | רופא פסיכיאטר |

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. כולל ייעוץ טלפוני
2. כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים, מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
3. רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או במרפאת בית חולים

לוח 2.31: בני +65 וכלל האוכלוסייה⁽¹⁾ המדווחים על ביצוע בדיקות רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 2010

אחוזים

| מועד ביצוע הבדיקה האחרונה ⁽²⁾ | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| סה"כ | מעל שנתיים | מעל שנה ועד שנתיים | בשנה אחרונה | עשו בדיקה | |
| בדיקת דם | | | | | |
| 100.0 | (0.9) | 2.9 | 96.2 | 98.9 | סה"כ בני +65 |
| 100.0 | .. | 3.2 | 95.9 | 98.4 | גברים |
| 100.0 | 1.0 | 2.6 | 96.3 | 99.3 | נשים |
| 100.0 | 8.2 | 11.4 | 79.8 | 89.6 | כלל האוכלוסייה ⁽¹⁾ |
| בדיקת כולסטרול | | | | | |
| 100.0 | 1.1 | 4.1 | 94.8 | 95.7 | סה"כ בני +65 |
| 100.0 | 1.3 | 4.2 | 94.5 | 95.1 | גברים |
| 100.0 | 0.9 | 4.0 | 95.1 | 96.1 | נשים |
| 100.0 | 6.1 | 11.4 | 82.5 | 71.3 | כלל האוכלוסייה ⁽¹⁾ |
| בדיקת שומות ונקודות חן | | | | | |
| 100.0 | 18.0 | 21.0 | 60.2 | 21.6 | סה"כ בני +65 |
| 100.0 | 16.1 | 21.6 | 62.4 | 23.7 | גברים |
| 100.0 | 21.4 | 20.5 | 58.1 | 20.0 | נשים |
| 100.0 | 30.9 | 20.4 | 48.7 | 20.8 | כלל האוכלוסייה ⁽¹⁾ |
| בדיקת ממוגרפיה | | | | | |
| 100.0 | 27.2 | 26.7 | 46.2 | 82.7 | נשים בנות +65 |
| 100.0 | 19.0 | 28.0 | 53.0 | 70.3 | כלל האוכלוסייה ⁽³⁾ |
| בדיקת פרוסטטה | | | | | |
| 100.0 | 20.3 | 18.3 | 61.4 | 53.4 | גברים בני +65 |
| 100.0 | 18.5 | 18.5 | 63.0 | 38.8 | כלל האוכלוסייה ⁽⁴⁾ |

←

לוח 2.31: בני +65 וכלל האוכלוסייה⁽¹⁾ המדווחים על ביצוע בדיקות רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 2010 (המשך)

אחוזים

| מועד ביצוע הבדיקה האחרונה ⁽²⁾ | | | | | עשו בדיקה | סה"כ |
|--|-----------------------|---------------|-------|------|-------------------------------|------|
| בשנה אחרונה | מעל שנה ועד שנתיים | מעל שנתיים | סה"כ | סה"כ | | |
| בדיקת דם סמוי | | | | | | |
| 59.1 | 20.8 | 20.1 | 100.0 | 57.1 | סה"כ בני +65 | |
| 60.9 | 21.1 | 18.0 | 100.0 | 60.2 | גברים | |
| 57.4 | 20.6 | 22.0 | 100.0 | 54.7 | נשים | |
| 63.8 | 20.4 | 15.8 | 100.0 | 51.7 | כלל האוכלוסייה ⁽¹⁾ | |
| בדיקת קולנוסקופייה | | | | | | |
| 30.6 | 33.8 | 27.8 | 100.0 | 43.6 | סה"כ בני +65 | |
| 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100.0 | 46.6 | גברים | |
| 46.9 | 43.8 | 49.7 | 100.0 | 41.2 | נשים | |
| 32.5 | 23.4 | 44.1 | 100.0 | 36.5 | כלל האוכלוסייה ⁽⁵⁾ | |

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה
2. מתוך אלה שעשו את הבדיקה
3. לנשים בנות 40 ומעלה
4. לגברים בני 50 ומעלה
5. לבני 50 ומעלה

לוח 2.32: בני +65 וכלל האוכלוסייה* אשר קיבלו חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

| נשים | גברים | סה"כ | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 54.6 | 60.0 | 57.0 | סה"כ בני +65 |
| | | | גיל |
| 49.7 | 57.1 | 52.9 | בני 65-74 |
| 60.7 | 63.8 | 62.1 | בני +75 |
| 22.3 | 23.5 | 22.9 | כלל האוכלוסייה |

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* בני 20 ומעלה

לוח 2.33: בני +65 וכלל האוכלוסייה* אשר עברו בדיקה, טיפול או ניקוי שיניים בשנה האחרונה, לפי גיל ומין, 2010

אחוזים

| נשים | גברים | סה"כ | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 38.8 | 37.7 | 38.3 | עברו בדיקה או טיפול שיניים |
| | | | סה"כ בני +65 |
| | | | גיל |
| 42.6 | 41.9 | 42.3 | בני 65-74 |
| 34.0 | 32.2 | 33.3 | בני +75 |
| 51.7 | 47.9 | 49.8 | כלל האוכלוסייה |
| | | | עברו ניקוי שיניים |
| 28.7 | 29.6 | 29.1 | סה"כ בני +65 |
| | | | גיל |
| 34.7 | 32.4 | 33.7 | בני 65-74 |
| 21.2 | 25.9 | 23.3 | בני +75 |
| 44.3 | 40.3 | 42.4 | כלל האוכלוסייה |

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* בני 20 ומעלה

לוח 2.34: ביקורים וביקורים חוזרים של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2009

| נשים | גברים | סה"כ | |
|--|-------------|-------------|---|
| מספר ביקורים⁽²⁾ (באלפים) | | | |
| 247.5 | 209.9 | 457.4 | סה"כ בני +65 |
| גיל | | | |
| 88.2 | 88.2 | 176.3 | בני 65-74 |
| 104.0 | 81.7 | 185.7 | בני 75-84 |
| 55.3 | 40.1 | 95.4 | בני +85 |
| 1,134.2 | 1,228.7 | 2,362.9 | כלל האוכלוסייה |
| 21.8 | 17.1 | 19.4 | אחוז הביקורים של בני +65 מתוך כלל הביקורים |
| שיעורים לאלף נפש | | | |
| 588.0 | 654.8 | 616.9 | סה"כ בני +65 |
| גיל | | | |
| 425.0 | 499.2 | 459.2 | בני 65-74 |
| 686.8 | 780.8 | 726.5 | בני 75-84 |
| 951.7 | 1,120.1 | 1,014.9 | בני +85 |
| 297.5 | 334.3 | 314.8 | כלל האוכלוסייה |
| ביקורים חוזרים⁽³⁾ בתוך חודש (אחוזים) | | | |
| 21.5 | 25.0 | 22.8 | סה"כ בני +65 |
| גיל | | | |
| 20.0 | 24.0 | 22.0 | בני 65-74 |
| 22.0 | 25.0 | 23.0 | בני 75-84 |
| 23.0 | 27.0 | 24.0 | בני +85 |
| 18.0 | 17.0 | 18.0 | כלל האוכלוסייה |

מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - אבחנות 2009" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 28 בתי חולים לאשפוז כללי ללא בתי החולים במזרח ירושלים. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

לוח 2.35: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על אשפוז בבית חולים⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2009

| | | | | אחוזים |
|-------------------------------|------|-------|------|------------------------------|
| ⁽²⁾ כלל האוכלוסייה | 75+ | 74-65 | 65+ | |
| 5.9 | 22.3 | 16.2 | 19.0 | סה"כ |
| | | | | מין |
| 5.9 | 21.8 | 17.3 | 19.3 | גברים |
| 5.9 | 22.6 | 15.4 | 18.7 | נשים |
| | | | | קבוצת אוכלוסייה |
| 5.8 | 22.0 | 15.4 | 18.5 | יהודים ואחרים ⁽²⁾ |
| 6.4 | 26.5 | 23.4 | 24.3 | ערבים |

מקור: עיבוד מתוך למ"ס, סקר בריאות 2009

1. אשפוז בשנים עשר החודשים הקודמים לריאיון, לא כולל אשפוז יום, אשפוז ללידה, אשפוז בבית חולים כרוני וניתוחים קוסמטיים
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.36: אשפוזים* של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות כלליות, לפי מין וגיל, 2001-2010

שיעורים ל-1,000 נפש

| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | בני +65 |
| 501 | 499 | 515 | 515 | 528 | 518 | 517 | 518 | 530 | 536 | סה"כ |
| 564 | 569 | 586 | 588 | 599 | 591 | 592 | 596 | 611 | 615 | גברים |
| 452 | 446 | 461 | 460 | 474 | 465 | 462 | 460 | 470 | 478 | נשים |
| | | | | | | | | | | בני 65-74 |
| 373 | 373 | 387 | 388 | 404 | 399 | 400 | 402 | 422 | 433 | סה"כ |
| 438 | 440 | 459 | 460 | 475 | 469 | 471 | 475 | 499 | 505 | גברים |
| 318 | 317 | 327 | 328 | 346 | 343 | 342 | 344 | 361 | 375 | נשים |
| | | | | | | | | | | בני +75 |
| 641 | 637 | 658 | 660 | 671 | 658 | 659 | 659 | 663 | 665 | סה"כ |
| 720 | 728 | 747 | 750 | 760 | 751 | 754 | 760 | 761 | 763 | גברים |
| 586 | 575 | 598 | 599 | 610 | 596 | 595 | 591 | 596 | 597 | נשים |
| | | | | | | | | | | בני 75-84 |
| 585 | 586 | 597 | 601 | 613 | 601 | 601 | 602 | 607 | 614 | סה"כ |
| 663 | 676 | 688 | 692 | 702 | 696 | 696 | 701 | 701 | 706 | גברים |
| 529 | 523 | 535 | 539 | 551 | 536 | 536 | 533 | 542 | 550 | נשים |
| | | | | | | | | | | בני +85 |
| 784 | 775 | 843 | 850 | 868 | 861 | 869 | 868 | 855 | 828 | סה"כ |
| 882 | 879 | 934 | 943 | 962 | 953 | 977 | 990 | 989 | 965 | גברים |
| 727 | 711 | 787 | 790 | 807 | 803 | 803 | 792 | 774 | 744 | נשים |
| | | | | | | | | | | כלל האוכלוסייה |
| 146 | 145 | 149 | 150 | 155 | 153 | 151 | 151 | 157 | 161 | סה"כ |
| 145 | 145 | 148 | 149 | 154 | 152 | 150 | 151 | 156 | 159 | גברים |
| 146 | 145 | 150 | 151 | 157 | 154 | 152 | 152 | 158 | 163 | נשים |

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - קובץ אשפוזים * שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד ולא כולל ילדות במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות) בכל בתי החולים

לוח 2.37: אשפוזים* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2001-2010

אחוזים

| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| | | | | | | | | | | בני 65+ |
| 33.5 | 33.3 | 33.5 | 33.7 | 34.1 | 34.0 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.0 | סה"כ |
| 34.0 | 33.9 | 34.0 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 34.3 | 34.0 | גברים |
| 33.0 | 32.8 | 33.0 | 33.2 | 34.0 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.0 | נשים |
| | | | | | | | | | | בני 75+ |
| 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 19.0 | סה"כ |
| 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | גברים |
| 21.5 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.4 | 21.0 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 19.9 | נשים |
| | | | | | | | | | | בני 85+ |
| 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | סה"כ |
| 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | גברים |
| 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | נשים |

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - קובץ אשפוזים
 * שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות) בכל בתי החולים

לוח 2.38: בני +65 מכלל המאושפזים, לפי מחלקות*, 2001-2010

אחוזים

| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
| 33.5 | 33.3 | 33.5 | 33.7 | 34.1 | 34.0 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.0 | כלל המחלקות הכלליות |
| 59.0 | 58.2 | 58.9 | 59.2 | 59.2 | 59.0 | 59.1 | 59.1 | 58.9 | 58.2 | פנימית |
| 46.1 | 43.1 | 45.4 | 45.7 | 45.8 | 46.7 | 46.9 | 45.6 | 46.0 | 44.8 | ריאות |
| 95.4 | 95.4 | 96.8 | 98.1 | 97.4 | 97.6 | 96.3 | 95.7 | 96.6 | 96.4 | גריאטרייה חריפה |
| 32.2 | 32.2 | 32.2 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 32.9 | 34.3 | 33.4 | 32.7 | נירולוגיה |
| 38.3 | 39.3 | 39.4 | 39.7 | 41.4 | 42.1 | 39.9 | 40.5 | 38.4 | 37.1 | אונקולוגיה |
| 35.0 | 34.3 | 34.5 | 34.1 | 33.9 | 32.7 | 32.3 | 31.4 | 29.9 | 32.3 | עור ומין |
| 8.0 | 10.9 | 10.1 | 12.9 | 8.8 | 9.2 | 7.8 | 7.5 | 5.5 | 3.9 | השתלת מוח עצם |
| 49.3 | 50.3 | 50.7 | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 50.3 | 49.8 | 50.1 | 49.0 | טיפול נמרץ כללי |
| 49.6 | 48.8 | 48.8 | 50.1 | 50.6 | 50.4 | 51.2 | 50.0 | 49.7 | 50.5 | טיפול נמרץ לב |
| 71.3 | 71.8 | 73.0 | 72.0 | 73.7 | 72.7 | 72.0 | 75.4 | 73.8 | 72.5 | טיפול נמרץ נשימתי |
| 27.3 | 26.9 | 26.4 | 26.5 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 26.9 | 26.7 | 26.6 | כירורגייה כללית |
| 35.2 | 34.5 | 34.2 | 35.1 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 33.9 | 32.8 | 33.0 | אורתופדיה |
| 37.9 | 39.5 | 39.3 | 40.4 | 40.4 | 40.9 | 42.0 | 41.9 | 41.7 | 40.7 | אורולוגיה |
| 33.7 | 32.5 | 31.5 | 31.1 | 28.9 | 30.3 | 29.6 | 29.5 | 29.8 | 27.7 | נירוכירורגייה |
| 45.7 | 47.5 | 47.6 | 47.4 | 48.3 | 47.4 | 47.7 | 47.5 | 49.3 | 47.7 | כירורגייה חזה ולב |
| 53.9 | 54.4 | 55.0 | 55.8 | 57.0 | 57.7 | 55.6 | 54.9 | 56.3 | 56.8 | כירורגייה כלי דם |
| 27.4 | 27.2 | 26.2 | 26.7 | 27.6 | 28.4 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 28.9 | כירורגייה פלסטית |
| 61.0 | 60.7 | 60.4 | 59.7 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 60.7 | 60.3 | 60.0 | עיניים |
| 13.2 | 12.8 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 11.5 | אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר |
| 10.5 | 9.5 | 11.4 | 11.0 | 11.7 | 11.5 | 13.7 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | פה ולסת |
| 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | נשים |
| 33.8 | 31.3 | 31.4 | 30.1 | 30.6 | 30.2 | 31.3 | 33.3 | 31.7 | 33.7 | השהיה |

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - קובץ אשפוזים
 * לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות) בכל בתי החולים

לוח 2.39: התפלגות האשפוזים בקרב בני +65 במחלקות כלליות, לפי מין, 2010

אחוזים

| נשים | גברים | סה"כ | |
|-------|-------|-------|------------------------------------|
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | כלל המחלקות הכלליות* |
| 49.7 | 47.4 | 48.6 | פנימית |
| 0.3 | 0.4 | 0.3 | ריאות |
| 4.6 | 3.1 | 3.9 | גריאטרייה חריפה |
| 1.4 | 1.5 | 1.5 | נירולוגיה |
| 1.0 | 1.2 | 1.1 | אונקולוגיה |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | עור ומין |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | השתלת מוח עצם |
| 1.9 | 2.3 | 2.1 | טיפול נמרץ כללי |
| 2.9 | 4.5 | 3.7 | טיפול נמרץ לב |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | טיפול נמרץ נשימתי |
| 13.2 | 14.9 | 14.0 | כירורגייה כללית |
| 6.6 | 3.6 | 5.1 | אורתופדיה |
| 1.2 | 5.4 | 3.3 | אורולוגיה |
| 0.8 | 0.9 | 0.8 | נירוכירורגייה |
| 1.5 | 2.5 | 2.0 | כירורגייה חזה ולב |
| 0.8 | 1.6 | 1.2 | כירורגייה כלי דם |
| 0.5 | 0.7 | 0.6 | כירורגייה פלסטית |
| 4.6 | 3.9 | 4.3 | עיניים |
| 0.9 | 1.1 | 1.0 | אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | פה ולסת |
| 1.7 | 0.0 | 0.9 | נשים |
| 5.8 | 4.6 | 5.2 | השהיה |

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - קובץ אשפוזים
 * שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות) בכל בתי החולים

לוח 2.40: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2010

ימים

| כלל האוכלוסייה | | | בני +65 | | | |
|----------------|-------|------|---------|-------|------|------------------------------------|
| נשים | גברים | סה"כ | נשים | גברים | סה"כ | |
| 4.0 | 4.2 | 4.1 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | כלל המחלקות הכלליות* |
| 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | פנימית |
| 8.3 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 7.2 | 7.8 | ריאות |
| 13.3 | 12.6 | 13.0 | 13.0 | 12.6 | 12.9 | גריאטרייה חריפה |
| 5.3 | 5.4 | 5.3 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | נירולוגיה |
| 7.9 | 7.8 | 7.8 | 9.2 | 8.5 | 8.9 | אונקולוגיה |
| 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | עור ומין |
| 18.0 | 17.1 | 17.5 | 11.9 | 13.5 | 13.0 | השתלת מוח עצם |
| 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | טיפול נמרץ כללי |
| 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | טיפול נמרץ לב |
| 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 12.9 | 12.1 | טיפול נמרץ נשימתי |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | כירורגייה כללית |
| 6.0 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | אורתופדיה |
| 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | אורולוגיה |
| 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | נירוכיורגייה |
| 6.0 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | כירורגייה חזה ולב |
| 4.2 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | כירורגייה כלי דם |
| 5.1 | 5.7 | 5.4 | 6.0 | 4.7 | 5.3 | כירורגייה פלסטית |
| 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | עיניים |
| 3.1 | 3.0 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר |
| 3.7 | 3.8 | 3.7 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | פה ולסת |
| 2.3 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | נשים |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | השהיה |

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - קובץ אשפוזים * שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות) בכל בתי החולים

לוח 2.41: בני +65 וכלל האוכלוסייה, המטופלים* בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי, 2011

סוף שנה

| סה"כ | |
|------------------------------|--------------|
| מספרים מוחלטים | |
| מטופלים בני +65 | 5,866 |
| מטופלים בכלל האוכלוסייה | 53,721 |
| אחוזים | |
| בני +65 מכלל המטופלים | 10.9 |
| מטופלים בני +65 מכלל בני +65 | 0.7 |
| כלל המטופלים מתוך האוכלוסייה | 0.7 |

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה
* אנשים שהיה להם לפחות מגע אחד בתקופה הנתונה

לוח 2.42: בני +65 וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2011

מספרים מוחלטים, סוף שנה

| נשים | גברים | סה"כ | |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| 6 | 16 | 22 | בני +65 |
| 6 | 14 | 20 | בני 65-74 |
| 0 | 2 | 2 | בני 75-84 |
| 0 | 0 | 0 | בני +85 |
| 148 | 239 | 387 | כלל האוכלוסייה |

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.43: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2011

סוף שנה

| נשים | גברים | סה"כ | |
|---|------------|------------|--------------------|
| מספרים מוחלטים | | | |
| 160 | 130 | 290 | כלל בני 65+ |
| 102 | 97 | 199 | בני 65-74 |
| 52 | 26 | 78 | בני 75-84 |
| 6 | 7 | 13 | בני 85+ |
| 1,174 | 2,315 | 3,489 | כלל האוכלוסייה |
| שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה | | | |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | כלל בני 65+ |
| 0.4 | 0.5 | 0.5 | בני 65-74 |
| 0.3 | 0.2 | 0.3 | בני 75-84 |
| 0.1 | 0.2 | 0.1 | בני 85+ |
| 0.3 | 0.6 | 0.4 | כלל האוכלוסייה |

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.44: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש, סוף שנה

| | 2011 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1990 | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | | כלל בני 65+ |
| | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | סה"כ |
| | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | גברים |
| | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.9 | נשים |
| | | | | | | | בני 65-74 |
| | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 3.6 | סה"כ |
| | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 3.7 | גברים |
| | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 3.5 | נשים |
| | | | | | | | בני 75-84 |
| | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 3.6 | סה"כ |
| | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | גברים |
| | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 4.5 | נשים |
| | | | | | | | בני 85+ |
| | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 3.1 | סה"כ |
| | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | גברים |
| | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 4.0 | נשים |
| | | | | | | | כלל האוכלוסייה |
| | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | סה"כ |
| | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | גברים |
| | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | נשים |

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.45: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1990 | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| כלל בני 65+ | | | | | | | | |
| סה"כ | 1,613 | 1,645 | 1,478 | 1,582 | 1,746 | 1,867 | 1,412 | |
| גברים | 692 | 758 | 659 | 646 | 628 | 641 | 526 | |
| נשים | 921 | 887 | 819 | 936 | 1,118 | 1,226 | 886 | |
| בני 65-74 | | | | | | | | |
| סה"כ | 973 | 1,005 | 939 | 1,010 | 1,072 | 1,117 | 892 | |
| גברים | 455 | 497 | 430 | 444 | 387 | 408 | 321 | |
| נשים | 518 | 508 | 509 | 566 | 685 | 709 | 571 | |
| בני 75-84 | | | | | | | | |
| סה"כ | 538 | 540 | 449 | 480 | 567 | 621 | 467 | |
| גברים | 200 | 214 | 185 | 165 | 203 | 186 | 181 | |
| נשים | 338 | 326 | 264 | 315 | 364 | 435 | 286 | |
| בני 85+ | | | | | | | | |
| סה"כ | 102 | 100 | 90 | 92 | 107 | 129 | 53 | |
| גברים | 37 | 47 | 44 | 37 | 38 | 47 | 24 | |
| נשים | 65 | 53 | 46 | 55 | 69 | 82 | 29 | |
| כלל האוכלוסייה | | | | | | | | |
| סה"כ | 21,271 | 20,918 | 20,866 | 20,547 | 20,892 | 18,172 | 12,262 | |
| גברים | 13,140 | 13,095 | 13,141 | 12,847 | 12,605 | 10,632 | 6,788 | |
| נשים | 8,131 | 7,823 | 7,725 | 7,700 | 8,287 | 7,540 | 5,474 | |

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.46: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2011

| כלל האוכלוסייה | בני 85+ | בני 74-75 | בני 65-74 | בני 65+ | |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| | | | | | מספרים מוחלטים |
| | | | | | סה"כ קבלות |
| 21,763 | 103 | 543 | 986 | 1,632 | סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות |
| 11,020 | 11 | 158 | 409 | 578 | הפרעות פסיכוטיות חריפות |
| 1,495 | 10 | 34 | 44 | 88 | הפרעות אפקטיביות |
| 2,979 | 33 | 193 | 342 | 568 | הפרעות אורגניות |
| 647 | 43 | 112 | 63 | 218 | הפרעות נירוטיות |
| 1,344 | 3 | 25 | 54 | 82 | הפרעות אישיות |
| 990 | 0 | 4 | 13 | 17 | סמים ואלכוהול |
| 744 | 0 | 2 | 11 | 13 | פיגור שכלי |
| 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרעות בגיל הילדות |
| 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | גורמי פניה אחרים |
| 1,945 | 3 | 15 | 50 | 68 | |
| | | | | | אחוזים |
| | | | | | סה"כ קבלות |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות |
| 50.6 | 10.7 | 29.1 | 41.5 | 35.4 | הפרעות פסיכוטיות חריפות |
| 6.9 | 9.7 | 6.3 | 4.5 | 5.4 | הפרעות אפקטיביות |
| 13.7 | 32.0 | 35.5 | 34.7 | 34.8 | הפרעות אורגניות |
| 3.0 | 41.7 | 20.6 | 6.4 | 13.4 | הפרעות נירוטיות |
| 6.2 | 2.9 | 4.6 | 5.5 | 5.0 | הפרעות אישיות |
| 4.5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | סמים ואלכוהול |
| 3.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | פיגור שכלי |
| 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | הפרעות בגיל הילדות |
| 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | גורמי פניה אחרים |
| 8.9 | 2.9 | 2.8 | 5.1 | 4.2 | |

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.47: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2011

| נשים | גברים | סה"כ | |
|------------|------------|------------|---|
| | | | מספרים מוחלטים |
| 279 | 212 | 491 | כלל בני 65+ |
| 123 | 108 | 231 | בני 74-65 |
| 115 | 76 | 191 | בני 84-75 |
| 41 | 28 | 69 | בני 85+ |
| 1,913 | 2,716 | 4,629 | כלל האוכלוסייה |
| | | | שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | כלל בני 65+ |
| 0.5 | 0.6 | 0.5 | בני 74-65 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | בני 84-75 |
| 0.6 | 0.7 | 0.6 | בני 85+ |
| 0.5 | 0.7 | 0.6 | כלל האוכלוסייה |

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.48: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

| | | | | | בני 65+ | בני 74-65 | בני 84-75 | בני 85+ | כלל האוכלוסייה |
|--------------------|---------------------|------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------------|
| נובמבר 2005 | | | | | | | | | |
| | | | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | סה"כ | | | | | | | | |
| | שירותי בריאות כללית | 69.3 | 65.9 | 72.4 | 75.6 | 53.9 | | | |
| | מכבי שירותי בריאות | 16.6 | 18.8 | 14.4 | 12.5 | 24.1 | | | |
| | קופת חולים לאומית | 7.7 | 8.0 | 7.4 | 6.7 | 9.9 | | | |
| | קופת חולים מאוחדת | 6.5 | 7.3 | 5.7 | 5.3 | 12.1 | | | |
| נובמבר 2007 | | | | | | | | | |
| | סה"כ | | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | שירותי בריאות כללית | 67.9 | 64.1 | 71.3 | 74.3 | 53.2 | | | |
| | מכבי שירותי בריאות | 17.5 | 19.9 | 15.2 | 13.3 | 24.3 | | | |
| | קופת חולים לאומית | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 9.5 | | | |
| | קופת חולים מאוחדת | 7.1 | 8.0 | 6.1 | 5.7 | 13.1 | | | |
| נובמבר 2008 | | | | | | | | | |
| | סה"כ | | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | שירותי בריאות כללית | 67.2 | 63.4 | 70.7 | 73.7 | 52.8 | | | |
| | מכבי שירותי בריאות | 17.9 | 20.5 | 15.7 | 13.6 | 24.6 | | | |
| | קופת חולים לאומית | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 9.3 | | | |
| | קופת חולים מאוחדת | 7.3 | 8.4 | 6.3 | 5.9 | 13.3 | | | |
| נובמבר 2009 | | | | | | | | | |
| | סה"כ | | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | שירותי בריאות כללית | 66.5 | 62.5 | 70.0 | 73.3 | 52.4 | | | |
| | מכבי שירותי בריאות | 18.4 | 21.1 | 16.1 | 14.0 | 24.8 | | | |
| | קופת חולים לאומית | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 9.2 | | | |
| | קופת חולים מאוחדת | 7.6 | 8.7 | 6.5 | 5.9 | 13.5 | | | |

לוח 2.48: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +65 בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות (המשך)

אחוזים

| בני +65 | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------|---------------------|
| בני 74-65 | | | | | |
| בני 84-75 | | | | | |
| בני +85 כלל האוכלוסייה | | | | | |
| נובמבר 2010 | | | | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | סה"כ |
| 52.5 | 73.1 | 69.3 | 62.1 | 66.0 | שירותי בריאות כללית |
| 24.7 | 14.1 | 16.7 | 21.4 | 18.8 | מכבי שירותי בריאות |
| 9.2 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | קופת חולים לאומית |
| 13.6 | 6.0 | 6.7 | 8.9 | 7.8 | קופת חולים מאוחדת |
| נובמבר 2011 | | | | | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | סה"כ |
| 52.3 | 72.9 | 69.1 | 61.8 | 65.8 | שירותי בריאות כללית |
| 25.0 | 14.2 | 16.8 | 21.6 | 19.0 | מכבי שירותי בריאות |
| 9.1 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | קופת חולים לאומית |
| 13.6 | 6.0 | 6.8 | 9.0 | 7.8 | קופת חולים מאוחדת |

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.49: בני +65 מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, 1994-2011

אחוזים

| קופת חולים מאוחדת | קופת חולים לאומית | מכבי שירותי בריאות | שירותי בריאות כללית | סה"כ | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| 4.1 | 7.2 | 4.9 | 13.1 | 10.2 | דצמבר 1994 |
| 4.4 | 7.4 | 5.1 | 12.9 | 10.1 | דצמבר 1995 |
| 4.4 | 7.3 | 5.2 | 13.0 | 10.0 | נובמבר 1996 |
| 4.4 | 7.2 | 5.4 | 13.2 | 10.1 | נובמבר 1997 |
| 4.6 | 7.4 | 5.5 | 13.2 | 10.0 | נובמבר 1998 |
| 4.7 | 7.4 | 5.6 | 13.1 | 10.0 | נובמבר 1999 |
| 4.8 | 7.5 | 5.8 | 13.1 | 10.0 | נובמבר 2000 |
| 5.0 | 7.5 | 6.0 | 13.1 | 10.0 | נובמבר 2001 |
| 5.2 | 7.7 | 6.3 | 13.1 | 10.1 | נובמבר 2002 |
| 5.3 | 7.9 | 6.6 | 13.2 | 10.2 | נובמבר 2003 |
| 5.4 | 8.0 | 6.8 | 13.2 | 10.2 | נובמבר 2004 |
| 5.5 | 7.9 | 7.0 | 13.1 | 10.2 | נובמבר 2005 |
| 5.8 | 8.0 | 7.3 | 13.2 | 10.4 | נובמבר 2006 |
| 5.5 | 8.1 | 7.3 | 12.9 | 10.1 | נובמבר 2007 |
| 5.5 | 8.1 | 7.3 | 12.8 | 10.1 | נובמבר 2008 |
| 5.6 | 8.1 | 7.5 | 12.8 | 10.1 | נובמבר 2009 |
| 5.8 | 8.2 | 7.7 | 12.8 | 10.2 | נובמבר 2010 |
| 5.8 | 8.2 | 7.6 | 12.6 | 10.0 | נובמבר 2011 |

מקור: המוסד לביטוח לאומי