

## 2. מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



### מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של הקשישים בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד ובשמירה על בריאות הקשישים.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשות באיכות חייו של הקשיש. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, תמותה, סגנון חיים, מחלות ומוגבלות, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. כמו כן, מובאים נתונים על דפוסי שימוש של קשישים בשירותי בריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

## ממצאים עיקריים

- ◆ **תוחלת החיים בלידה** עולה בהדרגה והגיעה בשנת 2003 ל-81.8 שנים לנשים ו-77.6 שנים לגברים. תוחלת החיים של היהודים גבוהה מזו של הערבים; בשנת 2003 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 4 שנים בקרב הנשים, ועל 3.2 שנים בקרב הגברים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** היא 19.3 שנים לנשים ו-17.3 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 84 בממוצע, וגבר - עד גיל 82 (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 11.8 שנים ולגברים 10.9 שנים (לוח 2.3).
- ◆ על פי הסקר החברתי, 39% מבני 65 ומעלה מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד**, לעומת 78% בקרב בני 20 ומעלה. בקרב הקשישים, 47% מהגברים ו-33% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד (לוח 2.4). 61% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם בדרך כלל לא-כל-כך-טוב או בכלל-לא-טוב, לעומת 23% בקרב בני 20 ומעלה (לוח 2.5).
- ◆ על פי סקר הבריאות הלאומי, 35% מבני 65 ומעלה מדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת, לעומת 64% בקרב כלל האוכלוסייה. בקרב הקשישים, 40% מהגברים ו-31% מהנשים דיווחו על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת. בקרב היהודים ואחרים 35% דיווחו על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת, לעומת 25% בקרב הערבים. אחוז הקשישים ממוצא ישראלי המדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת כפול מאחוז יתר הקשישים (75% לעומת כ-35%), ובקרב עולי בריה"מ רק 10% מדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת (לוח 2.7).
- ◆ על פי סקר הבריאות הלאומי, 41% מבני 65 ומעלה מדווחים על עיסוק בפעילות גופנית (שלוש פעמים בשבוע או יותר, במשך 20 דקות רצופות או יותר). אותו שיעור של עוסקים בפעילות גופנית דווח גם בקרב מבוגרים יותר. בקרב הגברים, 49% מדווחים על עיסוק בפעילות גופנית ובקרב הנשים 35%. בקרב כלל האוכלוסייה, רק 29% מדווחים על עיסוק בפעילות גופנית (לוח 2.8).
- ◆ **מדד מסת הגוף (BMI)** מחושב על-פי גובה ומשקל. ערכים שמעל 25 נחשבים למשקל עודף. על פי סקר הבריאות הלאומי, בקרב כלל האוכלוסייה ל-46% יש BMI של 25 ויותר. לעומת זאת, ל-57% מבני 65 ומעלה יש BMI של 25 ויותר

- (61% מבני 65-74 ו-52% מבני 75 ומעלה). אין הבדל בין גברים לנשים. בקרב הערבים רק ל-47% יש BMI מעל 25, ואילו בקרב העולים מבריה"מ לשעבר אחוז זה גבוה במיוחד (68%); (לוח 2.9).
- ◆ עשרה אחוזים מהקשישים **מעשנים** לעומת 28% בכלל האוכלוסייה. אחוז הגברים המעשנים בערך כפול מאחוז הנשים המעשנות (14% לעומת 7.6%). אחוז הקשישים הערבים המעשנים גבוה מאחוז הקשישים היהודים (18% לעומת 10%). רק 5% מקרב עולי בריה"מ לשעבר מעשנים (לוח 2.10).
  - ◆ ארבעים וחמישה אחוזים מבני 65 ומעלה מדווחים על **שימוש בתרופות ללא מרשם רופא** לעומת 36% בכלל האוכלוסייה. בקרב בני 75 ומעלה השיעור מגיע ל-47%. הקשישים הגברים משתמשים פחות בתרופות ללא מרשם בהשוואה לנשים הקשישות (35% לעומת 52%, בהתאמה); הקשישים היהודים משתמשים יותר בתרופות ללא מרשם לעומת הקשישים הערבים (46% לעומת 21%, בהתאמה); (לוח 2.11).
  - ◆ 86% מבני 65 ומעלה מדווחים על שימוש **בתרופות עם מרשם רופא** (81% מבני 65-74 ו-94% מבני 75 ומעלה), וזאת לעומת 46% בקרב כלל האוכלוסייה. בתרופות עם מרשם רופא אין הבדל בדיווח על שימוש בין יהודים לערבים (לוח 2.12).
  - ◆ עשרים וחמישה מכל 1,000 בני 65+ ביצעו **בדיקת MRI** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), לעומת 11 מכל 1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעורם של גברים בני 65+ אשר ביצעו בדיקת MRI גבוה פי 1.5 משיעורן של הנשים. בתקופה הנדונה ביצעו 163 מכל 1,000 בני 65+ בדיקת CT, לעומת 55 איש מכל 1,000 בכלל האוכלוסייה (לוח 2.13).
  - ◆ כ-45% מבני 65+ קיבלו **חיסון נגד שפעת** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000). שיעורם של המקבלים חיסון נגד שפעת בקרב בני 65+ גבוה פי חמישה מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור המקבלים חיסון בקרב עולי בריה"מ לשעבר הוא כמחצית השיעור בקרב קבוצת היהודים ואחרים (23% לעומת 45%, בהתאמה); (לוח 2.13).
  - ◆ מעט פחות משליש מבנות 65+ עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה. שיעור בנות ה-75+ שעברו את הבדיקה נמוך יותר מאשר שיעור בנות 65-74 (17% לעומת 38% בהתאמה); (לוח 2.14).

- ◆ שלושים ושמונה אחוזים מהקשישים **ביקרו אצל רופא** לפחות פעם אחת בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), כפול מהאחוז בקרב כלל האוכלוסייה. אצל רופא משפחה ביקרו 32% ואצל רופא מומחה כ-10% (לוח 2.15).
- ◆ קשיש **מבקר אצל רופא** בממוצע כ-15 פעמים בשנה (לא כולל רופא שיניים), מתוכן 11.5 פעמים אצל רופא משפחה ו-3.6 פעמים אצל רופא מומחה. ממוצע הביקורים בשנה אצל רופא משפחה בקרב כלל האוכלוסייה הוא 5 ואצל רופא מומחה כ-2 (לוח 2.16).
- ממוצע **הביקורים לנפש של קשישים אצל רופא שיניים** בשנה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000) היה 2.5, ובקרב בני 75+ היה ממוצע הביקורים לנפש נמוך יותר (2 ביקורים); (לוח 2.16).
- עשרים ושניים אחוזים מסך הביקורים אצל רופא משפחה, 19% מסך הביקורים אצל רופא מומחה ו-9% מסך הביקורים אצל רופא שיניים נעשים בידי קשישים. חלקן של הנשים הקשישות מתוך סך הביקורים אצל רופא משפחה הוא 13%, לעומת 9% בקרב הגברים הקשישים (לוח 2.17).
- ◆ מחצית מבני 65 ומעלה מדווחים על **בעיות שינה** (שנמשכות שבועיים ויותר) לעומת 30% בקרב כלל האוכלוסייה. 42% מהגברים בני 65 ומעלה ו-57% מהנשים מדווחים על בעיות שינה (לוח 2.18).
- ◆ קצת למעלה משליש מהקשישים (34%) דיווחו על **בעיות ראייה** (28% מהגברים ו-39% מהנשים); (לפי סקר בני 60 ומעלה שנערך ב-1997). אחוז הסובלים מבעיות ראייה עולה עם הגיל ומגיע ל-47% בקרב בני 80+. עשרים ושמונה אחוזים מהקשישים דיווחו על **בעיות שמיעה** (31% מהגברים ו-26% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות שמיעה מגיע ל-48% בקרב בני 80+ (לוח 2.19). שבעה עשר אחוזים מהקשישים דיווחו על **אי שליטה על סוגר השתן** (13% מהגברים ו-19% מהנשים). אחוז הסובלים מאי שליטה על סוגר השתן מגיע ל-33% בקרב בני 80+ (26% מהגברים ו-39% מהנשים); (לוח 2.20).
- ◆ שלושים ושמונה אחוזים מהגברים היהודים ואחרים בני 65+ דיווחו **שהרופא אבחן אצלם יתר לחץ-דם**, בעוד שבקרב הגברים הערבים רק 24% דיווחו על כך (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000). אחוז גבוה בהרבה של נשים ערביות (44%) ויהודיות (45%) דיווחו על כך. עשרים ואחד אחוזים

- מהגברים היהודים ו-18% בקרב הגברים הערבים **דיווחו על אוטם שריר הלב**, לעומת 10% בקרב הנשים היהודיות ו-14% בקרב הנשים הערביות. על אבחון **סוכרת** דיווחו 15% מבני +65 היהודים - נשים וגברים, לעומת 26% מהגברים ו-32% מהנשים באוכלוסייה הערבית (לוח 2.21 א' ו-ב').
- ◆ שיעור בני 65 ומעלה המקבלים **טיפול בדיאליזה** הוא 266 לכל 100,000 נפש בני 65 ומעלה. השיעור בקרב הגברים גבוה מאשר בקרב הנשים: 376 לעומת 185 לכל 100,000 נפש בהתאמה. בכלל האוכלוסייה השיעור הוא 52 לכל 100,000 נפש (לוח 2.22). 612 חולים חדשים בני 65 ומעלה קיבלו טיפול בדיאליזה בשנת 2001 (לוח 2.23).
  - ◆ בשנת 2001 נרשמו 12,492 **מקרים חדשים של שאתות ממאירות** בקרב בני +65, אשר מהווים 1,761 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. השיעור בקרב הגברים גבוה יותר מאשר בקרב הנשים (2,134 לעומת 1,482 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.24).
  - מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים גבוה יותר מאשר בקרב הערבים (2,180 לעומת 1,426 לכל 100,000 נפש בהתאמה). גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,524 לעומת 735 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.25).
  - ◆ על פי מחקר שנערך על ידי מאירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בקרב האוכלוסייה היהודית לגבי שכיחות **מחלת הדמנטיה** נמצא כי 19% מבני +65 (כ-117 אלף איש) סבלו מהמחלה. 84% מהם מתגוררים בקהילה והיתר במוסדות (לוח 2.27).
  - מקרב החולים המתגוררים בקהילה, 47% לוקים במחלה בדרגת חומרה קלה, 24% לוקים בה ברמת חומרה בינונית ואילו 30% לוקים בה ברמת חומרה קשה. בהשוואה לפי מין נמצא כי 19% מהנשים לוקות במחלה לעומת 14% מהגברים. שכיחות המחלה בקרב בני +65 עולה עם הגיל ומגיעה לשיא בקבוצת בני +85; 47% מבני קבוצת גיל זו לוקים במחלה (לוח 2.28).
  - ◆ על פי סקר הבריאות הלאומי, 25% מבני 65 ומעלה מדווחים על **בעיה גופנית** שנמשכת 6 חודשים ויותר וגורמת קושי גדול או גדול מאוד בביצוע פעולות יום-יומיות, לעומת 10% מכלל האוכלוסייה. 18% מהגברים בני 65 ומעלה דיווחו על

בעיה גופנית לעומת 31% מהנשים. 25% מהקשישים היהודים דיווחו על בעיה גופנית לעומת 30% מהקשישים הערבים (לוח 2.29).

♦ אומדן היכולת של הקשישים לבצע **פעולות יום-יומיות ללא עזרה** מצביע על כך שכ-80% מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים להתלבש לבד ללא קושי; 75% מסוגלים להתקלח או להתרחץ ללא קושי; 92% מסוגלים לאכול ללא קושי ו-81% מסוגלים להיכנס ולצאת מהמיטה או להתיישב על כיסא ולקום ממנו ללא קושי. 7% מהקשישים הגרים בקהילה אינם מסוגלים להתלבש לבדם, ו-11% מהם אינם מסוגלים להתקלח או להתרחץ לבד (לוח 2.30).

- בחינת אומדן **מידת הניידות** של בני +65 הגרים בקהילה מראה כי 13% מהם אינם מסוגלים להסתובב מחוץ לבית והם מרותקים לביתם, ו-8% מסוגלים לצאת מביתם רק בעזרת אדם אחר או באמצעות כיסא גלגלים. 72% מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים לניידות מחוץ לביתם למרחק של 400 מ' ללא עזרה. חמישה אחוזים מהקשישים הגרים בקהילה מוגבלים בניידות בתוך הבית (לוח 2.31).

♦ אומדן **אחוז הקשישים המוגבלים**, דהיינו **הזקוקים לעזרה באחת מפעולות היום-יום<sup>1</sup> לפחות** (להתרחץ או להתקלח, להתלבש, לאכול, לשבת ולקום מהכיסא, להיכנס ולצאת מהמיטה, להסתובב בתוך הבית), עומד בסוף 2004 על 16% (12% בקרב הגברים ו-20% בקרב הנשים). אחוז המוגבלים עולה בצורה חדה עם העלייה בגיל: 40% בקרב בני +80 לעומת 7% בקרב בני 65-74. אחוז הקשישים המוגבלים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה פי שניים בערך מהאחוז המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית (31% ו-15%, בהתאמה); (לוח 2.32).

- אומדן **מספר הקשישים המוגבלים** (הזקוקים לעזרה בפעולות טיפול אישי) בסוף 2004 עומד על 111 אלף איש. עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים המוגבלים הם דיירי המוסדות לטיפול ממושך ו-76% גרים בקהילה (לוח 2.33).

♦ כחמישית מהקשישים בקהילה **נפלו** במהלך חצי השנה האחרונה (לפי סקר בני 60 ומעלה 1997). הגברים סובלים פחות מנפילות (14%) לעומת הנשים (24%). אחוז הקשישים שנפלו מגיע ל-31% בקרב בני +80 (לוח 2.34).

- ♦ בשנת 2004 נפגעו **בתאונות דרכים** 1,910 קשישים. מתוכם, 5% נהרגו (88 קשישים), 16% נפצעו קשה (314 קשישים) ו-79% נפצעו קל (1,508 קשישים). כשליש מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 36% נהגו ברכב ו-27% נסעו ברכב. 66% מהקשישים שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (לוח 2.35).
- שיעור הקשישים שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2004 נמוך מזה שבקרב כלל האוכלוסייה (283 ו-542 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך **שיעור ההרוגים** כמעט כפול בקרב הקשישים לעומת השיעור בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב הקשישים. שיעור הקשישים שנפגעו בתאונות דרכים בקרב הערבים גבוה מאשר בקרב היהודים (393 ו-277 בהתאמה); (לוח 2.36).
- **שיעור הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בקרב כלל האוכלוסייה בשנת 2004 גבוה ב-41% משיעור הנהגים בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים (לוח 2.38).
- ♦ שיעור **הביקורים של בני +65 בחדר מיון** לכל 1,000 נפש הוא 644 לעומת 380 בקרב כלל האוכלוסייה. ביקורים של בני +65 בחדר מיון מהווים 17% מכלל הביקורים במיון. שיעור הביקורים במיון עולה עם הגיל: 524 בקרב בני 65-74 ו-1,139 בקרב בני +85 (לוח 2.39). 89% מהביקורים של בני +65 בחדר מיון נגרמו בגלל מחלות, לעומת 72% מהביקורים של כלל האוכלוסייה (לוח 2.40).
- ♦ עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים דיווחו על **אשפוז** בשנה האחרונה (לפי סקר הבריאות הלאומי), 26% בקרב הגברים ו-22% בקרב הנשים. שיעור האשפוזים בקרב הערבים גבוה יותר ועומד על 28% לעומת שיעור האשפוזים בקרב קבוצת היהודים ואחרים (24%). בקרב היהודים, שיעור האשפוז הנמוך ביותר הוא של קשישים שיבשת המוצא שלהם היא אסיה (20%) והגבוה ביותר הוא של קשישים שיבשת המוצא שלהם היא אפריקה (26%); (לוח 2.42).
- ♦ **שיעורי האשפוז של הקשישים במחלקות האשפוז הכלליות** גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. בשנת 2002 נרשמו 543 אשפוזים ל-1,000 קשישים במחלקות האשפוז הכלליות, בהשוואה ל-155 ל-1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-423 ל-1,000 נפש בגיל 65-74

ל-900 בגיל +85). שיעור האשפוז נמצא במגמת עלייה, הן בקרב כלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב הקשישים (לוח 2.43).

- בבחינת שיעור אשפוז הקשישים מכלל האשפוזים נמצא, כי בשנת 2002, כשליש (35%) מהאשפוזים היו של בני +65 (בעוד שהם מהווים פחות מ-10% מכלל האוכלוסייה), ו-20% מהאשפוזים היו של בני +75 (בעוד שהם מהווים כ-4% מכלל האוכלוסייה). שיעור אשפוז הקשישים מכלל האשפוזים נמצא במגמת עלייה (לוח 2.44). חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים במחלקות הפנימיות גבוה במיוחד והגיע ל-59% בשנת 2002 (לוח 2.45).

- התפלגות האשפוזים של הקשישים במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר, ומהווה קצת מעל מחצית האשפוזים (לוח 2.46).

♦ לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000, המתינו 16,700 בני +65 לאשפוז במהלך השנה האחרונה, והם היוו 3% מבני +65, לעומת 0.1% שהמתינו לאשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. ארבעים אחוזים מקרב הקשישים הממתינים לאשפוז - ממתינים לאשפוז שלושה חודשים ויותר (6,600 איש); (לוח 2.48).

♦ ב-2003 קיבלו 6,404 בני +65 (כ-10% מבני +65) טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי. הטיפולים של בני +65 מהווים כ-12% מכלל הטיפולים שניתנו ב-2003. 38% מהטיפולים ניתנו לגברים בני +65 ו-62% לנשים בנות +65. בקרב כלל האוכלוסייה היחס בין גברים לנשים שונה: 53% מהטיפולים ניתנו לגברים ו-47% לנשים (לוח 2.49).

♦ ב-2003 היו 31 קשישים באשפוז יום פסיכיאטרי, והם היוו 3% מסך השוהים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 87% מכלל הקשישים השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.50).

♦ בסוף 2003 היו 706 קשישים מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 1.1 מאושפזים ל-1,000 נפש. זאת, בהשוואה ל-0.7 מאושפזים ל-1,000 נפש בקרב כלל האוכלוסייה. חמישה-עשר אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני +65 (לוח 2.51). משנת 1990 ועד שנת 2003 חלה ירידה בשיעור הקשישים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-1.1 ל-1,000 נפש); (לוח 2.52).



- במהלך 2003 היו 1,720 **קבלות לאשפוז פסיכיאטרי** של בני +65, ואלה היוו 9% מסך הקבלות לאשפוז. 63% מהקבלות של בני +65 היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (לוח 2.53). שלוש **האבחנות השכיחות** לקבלה לאשפוז (89% מהקבלות) היו: הפרעות אפקטיביות, סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות והפרעות אורגניות (לוח 2.54).
- שנים עשר אחוזים מכלל **הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי** בשנת 2003 היו של בני +65 (מרביתם בני 65-84, ורק מיעוטם בני +85); (לוח 2.55).
- ◆ ב-2003 עמד **שיעור הפטירה** המתוקן ל-1,000 בני +65 על 53 בקרב הגברים ועל 41 בקרב הנשים. שיעור הפטירה של הגברים היהודים והאחרים נמוך מזה של הגברים הערבים עד גיל 84, ואילו בקרב בני +85 אין הבדל. שיעור הפטירה של נשים יהודיות נמוך מזה של נשים ערביות (לוח 2.56).
- ◆ שישים ושבעה אחוזים מהקשישים **נפטרו בבית חולים** בשנת 2003, לעומת 58% מבני 0-64. בקרב הקשישים 69% מהגברים ו-66% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 52% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 68% מהנשים (לוח 2.57).
- ב-2003 נפטרו 30,159 אנשים בגיל +65, שהם 79% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. **סיבות הפטירה העיקריות** בקרב הקשישים הן שאתות ממאירות (23%) ומחלות לב שונות (23%). בקרב הגברים, אין הבדל בין הקשישים לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתוך סך הפטירות (25%); ובקרב הנשים הקשישות השיעור (21%) נמוך מעט מאשר בקרב הנשים בכלל האוכלוסייה (25%); (לוחות 2.60 א, ב, ג).
- עם העלייה בגיל, עולה חלקן היחסי של מחלות לב וכלי דם בין סיבות פטירה: מ-26% בקרב בני 65-74 ל-38% בקרב בני +85. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-35% בקרב בני 65-74 ל-14% בקרב בני +85 (לוח 2.60א).
- ◆ בנובמבר שנת 2004 היו 70% מהקשישים **מבוטחים** בשירותי בריאות כללית (בהשוואה ל-54% מכלל האוכלוסייה), 16% במכבי שירותי בריאות (בהשוואה ל-24% מכלל האוכלוסייה), 8% בקופת חולים לאומית ו-6% בקופת חולים מאוחדת (בהשוואה ל-10% ו-12% מכלל האוכלוסייה בהתאמה). יש ירידה לאורך השנים באחוז הקשישים המבוטחים בשירותי בריאות כללית (לוח 2.61).

שלושה עשר אחוזים מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם קשישים, בהשוואה ל-7% במכבי שירותי בריאות, 8% בקופת חולים לאומית ו-5% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.62).

◆ על פי סקרים שנערכו במאירס-גיוינט-מכון-ברוקדייל, ב-2005 היה ל-67% מהקשישים **ביטוח בריאות משלים**, לעומת 79% בקרב כלל האוכלוסייה. מאז שנת 1997 גדל מספר הקשישים בעלי הביטוח המשלים ביותר מפי שניים (בשנת 1997 ל-27% מהקשישים היה ביטוח משלים). ל-22% מהגברים הקשישים ול-15% מהנשים הקשישות יש **ביטוח בריאות פרטי**. אחוז הקשישים בעלי ביטוח בריאות פרטי נמוך יחסית לאוכלוסייה הכללית (37% מהגברים ו-31% מהנשים בכלל האוכלוסייה); (לוח 2.63).

## הגדרות והסברים

**קבוצות אוכלוסייה ודת:** החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד, וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

**תמותה:** הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

**תוחלת החיים** בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

**אומדני המוגבלות** בקרב הקשישים מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בסקר בני 60 ומעלה שנערך ע"י הלמ"ס בשנת 1997.

שיעורים אלה יוחסו לקבוצות הדמוגרפיות המרכיבות את אוכלוסיית הקשישים הנוכחית על מנת לקבל אומדני מוגבלות נוכחיים.

**אשפוז במחלקות כלליות:** הנתונים עד 1995 מבוססים על קובצי האשפוזים בבתי חולים לאשפוז כללי שהוכנו בלמ"ס. הנתונים לשנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכז-אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות) ללא יולדות מכל מוסדות האשפוז ולא רק מבתי חולים לאשפוז כללי. המאגר כולל 93% מכלל האשפוזים לפי גיל ומין באשפוז הכללי ונופח לסך-כל האשפוזים בהתאם ל"מוסדות האשפוז בישראל". הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

**מספר האשפוזים במחלקה** מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

**ימי אשפוז** הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

**שהייה ממוצעת** היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

### אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

**אשפוז פסיכיאטרי:** אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

**אשפוז מלא:** מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

**אשפוז יום:** מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

**קבלות:** קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

**קבלות ראשונות:** קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

**סך-כל הקבלות לאשפוז** כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

### **נתונים מסקר בריאות**

**אשפוז:** אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוז יום בבתי חולים.

**רופא משפחה:** רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים.

**רופא שיניים:** רופא שיניים ומרפא שיניים, אורתודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

**ביקור אצל רופא:** ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים, במרפאת חוץ של בית חולים, בתחנת "מגן דוד אדום", בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית בביתו של הרופא וביקור בבית החולה. לא נכללו התייעצויות בטלפון או ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

**מבקר:** אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

**חולה במחלות כרוניות:** אדם המדווח שאי-פעם הרופא אבחן אצלו מחלה כרונית.

**סקר בריאות לאומי:** נערך ביוזמת משרד הבריאות ובוצע על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 2003/2004. במסגרת הסקר רואיינו קרוב ל-5,000 משיבים בני 21 ומעלה. הסקר נועד בין היתר לאמוד את שכיחותם של מצבי בריאות גופנית

ונפשית באוכלוסייה הכללית. הסקר הוא חלק מפרויקט בין-לאומי שמוביל ארגון הבריאות העולמי במטרה להרחיב את המידע על תחלואה נפשית באוכלוסייה הכללית.

### סימנים מיוחדים

- ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים  
 .. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-40%  
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40%

### עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

### מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומאירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.  
 מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

**לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות**

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.2	75.1	80.3	76.6	80.0	76.3	1996
76.8	74.3	80.6	76.4	80.1	76.0	1997
76.8	74.4	80.7	76.4	80.3	76.1	1998
78.1	74.9	80.7	77.0	80.4	76.6	1999
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
77.8	74.5	81.6	77.7	81.2	77.3	2001
77.9	74.7	81.9	77.9	81.5	77.5	2002
<b>78.2</b>	<b>74.9</b>	<b>82.2</b>	<b>78.1</b>	<b>81.8</b>	<b>77.6</b>	<b>2003</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת חיים בגיל 65, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.7	15.3	14.8	13.7	14.9	13.8	1974-1970
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1990-1994
16.4	16.0	17.9	15.8	17.9	15.8	1995-1991
16.8	16.1	18.1	16.0	18.0	16.0	1996-1992
17.0	16.4	18.3	16.2	18.2	16.2	1997-1993
17.0	16.4	18.5	16.3	18.4	16.3	1998-1994
17.2	16.6	18.6	16.4	18.5	16.4	1999-1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
16.6	16.5	18.8	16.7	18.7	16.6	2000-1996
16.7	16.3	19.0	16.8	18.8	16.8	2001-1997
16.7	16.1	19.2	17.1	19.1	17.1	2002-1998
<b>17.0</b>	<b>16.1</b>	<b>19.5</b>	<b>17.4</b>	<b>19.3</b>	<b>17.3</b>	<b>2003-1999</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

## לוח 2.3: תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין

בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
5.8	5.5	8.0	7.3	10.8	9.7	1995-1991
5.8	5.5	8.0	7.4	10.8	9.8	1996-1992
5.9	5.5	8.2	7.4	11.0	9.9	1997-1993
5.9	5.5	8.2	7.4	11.1	10.0	1998-1994
5.8	5.6	8.1	7.5	11.1	10.1	1999-1995
5.9	5.7	8.2	7.6	11.3	10.2	2000-1996
5.9	5.8	8.3	7.8	11.4	10.4	2001-1997
6.0	6.1	8.4	8.1	11.6	10.7	2002-1998
<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>8.7</b>	<b>8.3</b>	<b>11.8</b>	<b>10.9</b>	<b>2003-1999</b>

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי



לוח 2.4: בני 65+ ובני 20+ המדווחים שמצב בריאותם בדרך כלל הוא טוב או טוב מאוד, 2003

אחוזים			
	נשים	גברים	סה"כ
<b>כלל בני 65+</b>	<b>32.7</b>	<b>47.3</b>	<b>39.1</b>
<b>גיל</b>			
74-65	40.6	51.0	45.2
75+	21.8	41.7	30.1
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>			
יהודים ואחרים	33.1	48.0	39.5
מזה: עולי בריה"מ לשעבר*	12.3	28.8	19.0
ערבים	23.8	(36.1)	30.3
<b>כלל בני 20+</b>	<b>74.2</b>	<b>81.0</b>	<b>77.5</b>

מקור: למ"ס, הסקר החברתי  
\* שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.5: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ובני 20+, 2003**  
אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
6.7	9.2	7.8	טוב מאוד
26.0	38.1	31.3	טוב
46.1	36.5	41.9	לא כל כך טוב
21.2	16.2	19.0	בכלל לא טוב
<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>סה"כ בני 20+</b>
39.4	46.2	42.7	טוב מאוד
34.8	34.8	34.8	טוב
19.3	13.4	16.5	לא כל כך טוב
6.6	5.6	6.1	בכלל לא טוב

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

לוח 2.6: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בריאות גופנית טובה מאוד או מצוינת לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה <sup>(1)</sup>
<b>סה"כ</b>	49.7	8.0	15.9	12.9
<b>מין</b>				
גברים	52.0	10.7	22.6	18.3
נשים	47.6	(6.1)	10.5	8.7
<b>יבשת מוצא של יהודים ואחרים<sup>(2)</sup></b>				
סה"כ יהודים ואחרים	49.2	7.9	16.7	13.3
ישראל	78.9	..	(53.7)	(47.6)
אסיה	50.9	..	17.2	14.9
אפריקה	53.6	..	(10.9)	(8.7)
אירופה-אמריקה	37.9	8.3	15.9	12.5
<b>קופת החולים</b>				
כללית	45.8	6.9	15.5	12.2
מכבי	54.6	(11.8)	19.2	17.0
מאוחדת	56.7	..	..	(12.8)
לאומית	49.5	..	..	(11.2)

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה

2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

**לוח 2.7: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003**

אחוזים				
כלל האוכלוסייה <sup>(1)</sup>	75+	74-65	65+	
<b>63.5</b>	<b>29.3</b>	<b>38.0</b>	<b>34.7</b>	<b>סה"כ</b>
				<b>מין</b>
66.1	36.4	42.0	<b>40.0</b>	גברים
61.1	24.3	34.8	<b>30.7</b>	נשים
				<b>קבוצת אוכלוסייה</b>
63.9	29.3	39.0	<b>35.3</b>	יהודים ואחרים <sup>(2)</sup>
60.9	..	(24.6)	<b>25.4</b>	ערבים
				<b>יבשת מוצא של יהודים ואחרים<sup>(2)</sup></b>
86.5	..	(72.2)	<b>(75.4)</b>	ישראל
67.9	32.6	35.9	<b>34.9</b>	אסיה
68.0	(27.8)	39.5	<b>37.1</b>	אפריקה
53.9	28.1	38.0	<b>33.6</b>	אירופה-אמריקה
25.4	(9.8)	(9.6)	<b>9.7</b>	מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(3)</sup>
				<b>קופת החולים</b>
61.9	28.7	39.9	<b>35.6</b>	כללית
65.6	25.9	34.5	<b>31.9</b>	מכבי
69.4	(34.6)	41.9	<b>38.4</b>	מאוחדת
59.8	(33.9)	(27.4)	<b>30.2</b>	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.8: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על עיסוק בפעילות גופנית<sup>(1)</sup> שלוש פעמים בשבוע או יותר, לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>
<b>סה"כ</b>	40.9	41.6	41.3	28.7
<b>מין</b>				
גברים	54.1	46.4	49.1	31.5
נשים	31.6	37.7	35.3	26.2
<b>יבשת מוצא של יהודים ואחרים<sup>(3)</sup></b>				
סה"כ יהודים ואחרים	41.4	43.9	43.0	30.8
ישראל	..	(64.0)	(68.1)	30.7
אסיה	37.4	30.8	32.8	26.9
אפריקה	(31.6)	32.2	32.0	23.9
אירופה-אמריקה	42.5	50.6	46.9	35.0
מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(4)</sup>	33.2	56.1	47.1	34.7
<b>קופת החולים</b>				
כללית	39.0	43.5	41.8	28.7
מכבי	50.5	41.6	44.3	31.3
מאוחדת	(31.1)	(32.5)	31.9	27.1
לאומית	52.5	(34.3)	42.2	25.1

- מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי
- עיסוק בפעילות גופנית בשלושים הימים האחרונים לפני הסקר, כגון: הליכה, שחייה, או התעמלות, שנמשכה 20 דקות רצופות או יותר
  - אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
  - כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
  - שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.9: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על מסת גוף BMI של 25 ויותר<sup>(1)</sup>, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים			
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>	75+	74-65	65+
46.3	51.6	61.0	57.4
<b>סה"כ</b>			
<b>מין</b>			
52.0	51.8	60.5	57.4
41.0	51.4	61.4	57.5
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>			
45.9	52.4	61.5	58.0
48.6	..	53.1	47.0
<b>יבשת מוצא של יהודים ואחרים<sup>(3)</sup></b>			
27.5	..	(40.9)	(43.6)
43.6	53.9	51.2	52.0
48.1	48.9	60.7	58.2
51.6	52.3	66.7	60.2
56.9	61.6	72.0	67.9
<b>קופת החולים</b>			
47.6	51.2	58.7	55.9
44.1	63.1	70.8	68.5
44.1	(37.1)	68.6	53.9
48.2	50.3	60.1	55.8

- מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי
1. דיווח על גובה ומשקל לפיהם חושב מדד מסת הגוף (Body Mass Index). ערכי BMI שבין 18.5 ל-25 נחשבים כמשקל תקין; מעל 25 - משקל עודף; מעל 30 - השמנת יתר; מעל 40 - השמנה במידה מסוכנת
  2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
  3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
  4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.10: בני 65+ ובני 20+ אשר מעשנים סיגרייה אחת לפחות ביום, לפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, 2003  
אחוזים

	נשים	גברים	סה"כ	
	7.6	14.0	10.3	<b>בני 65+</b>
				<b>גיל</b>
	9.8	15.4	12.3	בני 65-74
	(4.3)	11.7	7.5	בני 75+
				<b>קבוצת אוכלוסייה</b>
	7.7	12.9	9.9	יהודים ואחרים
	..	(9.9)	4.8	מזה: עולי בריה"מ לשעבר*
	..	(31.3)	18.2	ערבים
	19.2	36.4	27.5	<b>בני 20+</b>

מקור: למ"ס, הסקר החברתי  
\* שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.11: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על שימוש בתרופות ללא מרשם רופא<sup>(1)</sup>, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003**

אחוזים				
	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>
<b>סה"כ</b>	47.1	43.2	44.7	36.1
<b>מין</b>				
גברים	39.9	31.9	34.8	27.0
נשים	52.2	52.3	52.3	44.6
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>				
יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>	48.5	44.4	46.0	37.6
ערבים	..	(26.9)	(21.3)	26.1
<b>יבשת מוצא של יהודים ואחרים<sup>(3)</sup></b>				
ישראל	..	(60.4)	(64.9)	34.7
אסיה	46.3	44.5	45.1	29.2
אפריקה	54.4	31.6	36.2	34.7
אירופה-אמריקה	48.0	46.8	47.3	43.0
מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(4)</sup>	37.9	38.4	38.2	41.3
<b>קופת החולים</b>				
כללית	50.7	43.2	46.0	35.8
מכבי	51.4	46.0	47.6	37.2
מאוחדת	(28.5)	41.9	35.6	34.7
לאומית	36.7	43.1	40.3	40.6

- מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי
1. מדווחים כי לקחו תרופה אחת לפחות שאינה מחייבת מרשם רופא בשבעת הימים שקדמו לריאיון
  2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
  3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
  4. שעלו משנת 1990 ואילך



לוח 2.12: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על שימוש בתרופות עם מרשם רופא<sup>(1)</sup>, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>	75+	74-65	65+	
46.4	93.6	81.0	85.8	סה"כ
				מין
38.8	93.6	75.9	82.2	גברים
53.5	93.7	85.2	88.6	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
47.2	93.8	80.8	85.8	יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>
41.4	(89.8)	84.4	85.6	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>
35.4	..	(55.6)	(60.6)	ישראל
44.4	89.3	80.3	83.0	אסיה
39.2	92.3	74.8	78.3	אפריקה
54.9	94.7	84.1	88.9	אירופה-אמריקה
52.2	95.4	84.8	89.0	מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(4)</sup>
				קופת החולים
50.5	95.3	84.2	88.4	כללית
43.8	98.2	79.6	85.2	מכבי
42.2	96.2	73.4	84.0	מאוחדת
41.6	87.1	70.4	77.7	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. מדווחים כי לקחו תרופה אחת לפחות המחייבת מרשם רופא בשבעת הימים שקדמו לריאיון
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.13: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות MRI ו-CT או קיבלו חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000**

שיעורים ל-1,000 נפש

חיסון נגד שפעת	CT	MRI	
90	55	11	<b>כלל האוכלוסייה</b>
<b>447</b>	<b>163</b>	<b>25</b>	<b>כלל בני +65</b>
			<b>מין</b>
473	173	31	גברים
427	155	19	נשים
			<b>גיל</b>
414	153	22	בני 65-74
496	177	28	בני +75
			<b>קבוצות אוכלוסייה</b>
449	161	25	יהודים ואחרים <sup>(1)</sup>
405	183	..	ערבים
			<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים<sup>(1)</sup></b>
515	163	..	ישראל
444	157	(26)	אסיה
487	116	30	אפריקה
533	183	(30)	אירופה-אמריקה
230	149	(16)	בריה"מ לשעבר <sup>(2)</sup>

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 2000/1999

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.14: נשים בנות +65 ובנות +40 אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

שיעורים ל-1,000 נשים

שיעורים ל-1,000 נשים	
298	בנות +65
305	בנות +40
	גיל
382	בנות 65-74
(172)	בנות +75
	קבוצת אוכלוסייה
309	יהודיות ואחרות <sup>(1)</sup>
(121)	ערביות
	יבשת לידה של יהודיות ואחרות <sup>(1)</sup>
468	ישראל
255	אסיה
230	אפריקה
361	אירופה-אמריקה
222	בריה"מ לשעבר <sup>(2)</sup>

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 2000/1999

1. כולל: יהודיות, נוצריות שאינן ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.15: בני 65+ וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה, רופא מומחה או רופא שיניים בשבועיים האחרונים, לפי מין, גיל ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

אחוזים

רופא משפחה ומומחה	רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
18.7	14.9	5.0	6.8	כלל האוכלוסייה
38.3	32.0	9.7	5.9	כלל בני 65+
				מין
34.6	28.6	9.2	6.4	גברים
41.2	34.6	10.0	5.5	נשים
				גיל
38.0	31.2	10.4	6.8	בני 65-74
38.9	33.4	8.6	4.5	בני 75+
				יבשת לידה של יהודים ואחרים <sup>(1)</sup>
34.1	24.0	11.1	8.2	ישראל
40.1	35.2	7.4	7.0	אסיה
40.3	36.9	6.3	(4.9)	אפריקה
40.5	32.3	12.3	6.4	אירופה-אמריקה
34.0	29.5	8.4	3.6	בריה"מ לשעבר <sup>(2)</sup>

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 2000/1999

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.16: ביקורים של בני +65, של בני +75 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא בשנה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000**

ממוצע לנפש

רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
<b>בני +65</b>			
<b>11.5</b>	<b>3.6</b>	<b>2.5</b>	<b>סה"כ</b>
10.6	3.4	2.7	גברים
12.1	3.7	2.3	נשים
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>			
11.1	3.6	2.5	יהודים ואחרים*
17.2	..	(2.0)	ערבים
<b>בני +75</b>			
11.5	3.0	2.0	סה"כ
10.9	2.7	2.1	גברים
12.0	3.2	2.0	נשים
<b>כלל האוכלוסייה</b>			
5.3	1.8	2.6	סה"כ
4.8	1.4	2.1	גברים
5.7	2.3	3.1	נשים

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 2000/1999

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.17: ביקורים של בני +65 אצל רופא מתוך סך הביקורים (של כלל האוכלוסייה), אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000, לפי התמחות הרופא ומין

אחוזים

סה"כ	גברים	נשים	
<b>17.8</b>	<b>7.3</b>	<b>10.5</b>	<b>סה"כ*</b>
21.5	8.6	13.0	רופא משפחה
19.4	8.0	11.4	רופא מומחה
9.4	4.5	4.9	רופא שיניים

מקור: למ"ס, סקר בריאות, 2000/1999

\* לא כולל רופא שיניים

לוח 2.18: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה<sup>(1)</sup>, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>	75+	74-65	65+	
29.8	52.2	49.4	50.5	סה"כ
				מין
23.3	40.0	42.9	42.0	גברים
35.7	61.1	54.2	56.9	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
29.8	52.6	49.5	50.7	יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>
30.0	(38.4)	48.3	46.2	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>
19.7	..	(48.4)	(47.0)	ישראל
30.3	48.9	51.0	50.4	אסיה
35.6	48.2	61.0	58.4	אפריקה
30.4	53.8	46.0	49.5	אירופה-אמריקה
33.3	58.0	48.6	52.3	מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(4)</sup>
				קופת החולים
33.6	53.5	52.8	53.1	כללית
23.3	44.5	43.9	44.1	מכבי
25.7	(36.5)	(35.3)	35.9	מאוחדת
30.5	58.8	39.6	47.9	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. בעיית שינה בשנים עשר החודשים הקודמים לריאיון (שנמשכה שבועיים ויותר)
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.19: בני 65+ שדיווחו על בעיות ראייה, שמיעה ולעיסה<sup>(1)</sup>, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים

בעיות ראייה	בעיות שמיעה	בעיות לעיסה	
34.3	27.9	31.4	<b>כלל בני 65+</b>
<b>מין</b>			
27.6	31.1	28.7	גברים
39.3	25.5	33.3	נשים
<b>גיל</b>			
29.6	21.7	29.1	בני 65-74
35.5	27.7	32.8	בני 75-79
47.4	47.5	36.7	בני 80+
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>			
33.5	28.0	30.5	יהודים ואחרים <sup>(2)</sup>
39.0	32.4	34.8	מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(3)</sup>
44.4	18.7	45.0	ערבים
<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים<sup>(2)</sup></b>			
21.3	17.7	17.1	ישראל
42.0	30.1	42.0	אסיה-אפריקה
31.5	29.1	27.1	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. בעיות ראייה: קשיים בראייה מרחוק ו/או מקרוב (גם כאשר מרכיבים משקפיים)  
בעיות שמיעה: קשיים בשמיעה (גם כאשר משתמשים במכשיר שמיעה)  
בעיות לעיסה: קשיים באכילה עם שיניים תותבות או בעיות בלעיסה למי שאין להם שיניים תותבות
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך



לוח 2.20: בני +65 שדיווחו על אי שליטה על סוגר השתן<sup>(1)</sup>, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
	נשים	גברים	סה"כ
<b>כלל בני +65</b>	<b>19.3</b>	<b>12.7</b>	<b>16.5</b>
<b>גיל</b>			
בני 65-74	12.8	8.1	10.8
בני 75-79	19.6	14.2	17.2
בני 80+	39.1	25.8	33.4
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>			
יהודים ואחרים <sup>(2)</sup>	19.7	12.6	16.6
מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(3)</sup>	20.2	12.7	17.2
ערבים	13.9	12.6	13.3
<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים<sup>(2)</sup></b>			
ישראל	9.5	6.5	8.2
אסיה-אפריקה	24.4	17.4	21.2
אירופה-אמריקה	18.9	11.3	15.7

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. קורה שיש להם בריחת שתן או שאינם מספיקים להגיע לשירותים
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.21א: גברים בני 65+ וכלל הגברים שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000**

שיעורים ל-1,000 גברים

כלל הגברים (בני כל הגילים)	75+	74-65	65+	
				<b>יהודים ואחרים*</b>
90	369	368	377	יתר-לחץ דם
35	211	205	208	אוטם שריר הלב
23	134	96	111	מחלת לב אחרת
7	..	..	54	שבץ מוח
33	130	167	152	סוכרת
43	..	..	46	אסתמה
15	..	..	42	מחלת ריאה
31	109	99	103	כיב במערכת העיכול
9	59	48	53	מחלה ממארת (סרטן)
				<b>ערבים</b>
25	(172)	282	237	יתר-לחץ דם
19	..	(173)	(176)	אוטם שריר הלב
13	(167)	..	(96)	מחלת לב אחרת
27	(308)	231	263	סוכרת

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 2000/1999

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

**לוח 2.21: נשים בנות +65 וכלל הנשים שדיווחו שהרופא אבחן אצלן אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000**

שיעורים ל-1,000 נשים

כלל הנשים (בנות כל הגילים)	75+	74-65	65+	
<b>יהודיות ואחרות*</b>				
113	476	430	449	יתר-לחץ דם
16	109	84	95	אוטם שריר הלב
28	133	98	112	מחלת לב אחרת
6	..	..	39	שבץ מוח
37	143	155	150	סוכרת
38	45	28	58	אסתמה
15	..	..	52	מחלת ריאה
29	104	89	95	כיב במערכת העיכול
16	65	54	58	מחלה ממארת (סרטן)
<b>ערביות</b>				
41	444	432	436	יתר-לחץ דם
10	..	(144)	(143)	אוטם שריר הלב
11	..	(135)	(129)	מחלת לב אחרת
34	(248)	345	317	סוכרת
14	..	(141)	(111)	כיב במערכת העיכול

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 2000/1999

\* כולל: יהודיות, נוצריות שאינן ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

**לוח 2.22: חולים בני +65 ובכלל האוכלוסייה בטיפול בדיאליזה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות**

שיעור ל-100,000 נפש באוכלוסייה המתאימה, סוף שנה

	2000	1995	1990	
<b>סה"כ בני +65</b>	<b>266</b>	<b>159</b>	<b>106</b>	
גברים	376	243	157	
נשים	185	96	62	
<b>סה"כ בני 65-74</b>	<b>289</b>	<b>185</b>	<b>123</b>	
גברים	375	165	173	
נשים	220	122	81	
<b>סה"כ בני +75</b>	<b>248</b>	<b>127</b>	<b>83</b>	
גברים	383	207	131	
נשים	155	69	43	
<b>כלל האוכלוסייה</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	
גברים	65	49	36	
נשים	41	31	24	

מקור: משרד הבריאות, חולים בטיפול בדיאליזה בישראל מדדי מעקב 1989-2001 (פורסם באינטרנט)

**לוח 2.23: חולים חדשים המקבלים טיפול בדיאליזה, בקרב בני 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות**

מספרים מוחלטים, סוף שנה

	2001	2000	1995	1990	
<b>סה"כ בני 65+</b>	<b>612</b>	<b>577</b>	<b>331</b>	<b>179</b>	
גברים	361	360	228	122	
נשים	251	217	103	54	
<b>סה"כ בני 65-74</b>	<b>336</b>	<b>314</b>	<b>217</b>	<b>112</b>	
גברים	186	189	144	73	
נשים	150	125	73	37	
<b>סה"כ בני 75+</b>	<b>276</b>	<b>263</b>	<b>114</b>	<b>67</b>	
גברים	175	171	84	49	
נשים	101	92	30	17	
<b>כלל האוכלוסייה</b>	<b>1090</b>	<b>1053</b>	<b>696</b>	<b>462</b>	
גברים	657	654	464	297	
נשים	433	399	232	160	

מקור: משרד הבריאות, חולים בטיפול בדיאליזה בישראל מדדי מעקב 1989-2001 (פורסם באינטרנט)

לוח 2.24: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2001

סוף שנה

85+	84-80	79-75	74-70	69-65	65+	
						<b>מספרים מוחלטים</b>
<b>1,716</b>	<b>1,823</b>	<b>2,993</b>	<b>3,164</b>	<b>2,796</b>	<b>12,492</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
853	930	1,528	1,686	1,464	6,461	גברים
863	893	1,465	1,478	1,332	6,031	נשים
						<b>שיעורים ל-100,000 נפש</b>
<b>2,456</b>	<b>2,446</b>	<b>2,078</b>	<b>1,781</b>	<b>1,414</b>	<b>1,761</b>	<b>סה"כ בני 65+</b>
3,086	2,970	2,548	2,222	1,642	2,134	<b>גברים סה"כ</b>
166	160	105	88	64	91	מזה: קיבה
593	626	437	349	241	352	מעג גס וחלחולת
203	239	268	256	183	221	ריאה
604	527	534	530	388	475	ערמונית
329	294	262	230	157	215	שלפוחית השתן
72	121	77	76	61	73	לימפומה ממארת
134	73	78	57	39	59	ליקמיה
2,044	2,065	1,743	1,452	1,226	1,482	<b>נשים סה"כ</b>
83	97	74	50	38	54	מזה: קיבה
391	377	314	235	178	243	מעג גס וחלחולת
111	106	93	87	68	83	ריאה
360	416	366	356	339	355	שד
26	32	40	38	35	36	שחלה
54	55	58	35	28	38	שלפוחית השתן
76	76	96	66	57	68	לימפומה ממארת
50	65	62	49	28	43	ליקמיה

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות

**לוח 2.25: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני +65, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, 2001-1997**

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

2001	2000	1999	1998	1997	
<b>2,134</b>	2,114	2,165	2,175	2,017	<b>סה"כ גברים</b>
<b>2,180</b>	2,177	2,217	2,230	2,068	סה"כ יהודים ואחרים*
<b>94</b>	104	98	115	95	מזה: קיבה
<b>366</b>	364	401	378	346	מעני גס וחלחולת
<b>215</b>	214	222	221	234	ריאה
<b>489</b>	448	451	478	447	ערמונית
<b>219</b>	219	242	239	219	שלפוחית השתן
<b>73</b>	94	102	89	82	לימפומה ממארת
<b>60</b>	71	43	53	50	ליקמיה
<b>1,426</b>	1,192	1,361	1,352	1,267	סה"כ ערבים
<b>49</b>	48	69	30	64	מזה: קיבה
<b>140</b>	124	175	136	129	מעני גס וחלחולת
<b>309</b>	232	312	289	347	ריאה
<b>249</b>	209	182	225	181	ערמונית
<b>159</b>	95	141	153	118	שלפוחית השתן
<b>69</b>	58	48	51	57	לימפומה ממארת
<b>42</b>	60	21	44	16	ליקמיה
<b>1,482</b>	1,509	1,508	1,508	1,401	<b>סה"כ נשים</b>
<b>1,524</b>	1,557	1,554	1,554	1,442	סה"כ יהודיות ואחרות*
<b>56</b>	52	42	50	50	מזה: קיבה
<b>251</b>	267	273	261	233	מעני גס וחלחולת
<b>86</b>	83	82	80	74	ריאה
<b>365</b>	428	409	434	396	שד
<b>37</b>	39	40	44	40	שחלה
<b>39</b>	40	47	46	36	שלפוחית השתן
<b>69</b>	67	72	77	56	לימפומה ממארת
<b>44</b>	38	34	29	24	ליקמיה
<b>735</b>	725	743	697	724	סה"כ ערביות
<b>22</b>	27	31	18	47	מזה: קיבה
<b>84</b>	103	96	140	59	מעני גס וחלחולת
<b>26</b>	19	47	54	35	ריאה
<b>169</b>	121	196	123	109	שד
<b>14</b>	28	25	23	15	שלפוחית השתן
<b>52</b>	42	49	47	56	לימפומה ממארת

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות

\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.26: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים\*  
בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2001

סוף שנה

75+	74-70	69-65	65+	
<b>מספרים מוחלטים</b>				
6,388	3,046	2,674	<b>12,108</b>	<b>סה"כ יהודים ואחרים בני +65</b>
3,221	1,606	1,395	<b>6,222</b>	גברים
3,167	1,440	1,279	<b>5,886</b>	נשים
<b>שיעורים ל-100,000 נפש</b>				
<b>גברים</b>				
2,086	1,630	1,738	<b>1,807</b>	ילידי ישראל
3,054	2,719	1,743	<b>2,397</b>	ילידי אירופה-אמריקה
2,469	1,617	1,754	<b>1,919</b>	ילידי אסיה
2,784	2,018	1,878	<b>2,177</b>	ילידי אפריקה
<b>נשים</b>				
1,558	1,554	1,532	<b>1,546</b>	ילידות ישראל
2,011	1,862	1,353	<b>1,687</b>	ילידות אירופה-אמריקה
1,482	1,164	1,131	<b>1,241</b>	ילידות אסיה
1,504	1,016	1,090	<b>1,187</b>	ילידות אפריקה

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות  
\* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)



לוח 2.27: אומדן בני 65+ יהודים ואחרים<sup>(1)</sup> הסובלים מדמנטיה, 2002  
סוף שנה

סה"כ	בקהילה	במוסדות <sup>(2)</sup>	
116.8	98.1	18.7	אלפים
100.0	84.0	16.0	אחוזים
19.0	16.7	69.8	אחוז מתוך האוכלוסייה המתאימה

מקור: ורטמן, א'; ברודסקי, ג'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2005, קשישים הלוקים בדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, מאיירס-גוינט-מכון ברוקדייל

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת (ראו מבוא)
2. כולל: בתי אבות, בתי חולים לחולים כרוניים ומחלקות סיעודיות

**לוח 2.28: אומדן בני 65+ יהודים ואחרים<sup>(1)</sup> הגרים בקהילה אשר סובלים מדמנטיה, לפי חומרת המחלה, גיל ומין, 2002**

סוף שנה

רמת החומרה של המחלה				סה"כ חולים	
קשה	בינונית	קלה	סה"כ <sup>(2)</sup>		
<b>אלפים</b>					
27.5	22.1	43.2	92.9	98.1	
<b>אחוזים</b>					
מתוך החולים בדמנטיה				מתוך האוכלוסייה המתאימה	גיל
30.0	24.0	47.0	100.0	16.7	בני 65+
34.0	28.0	39.0	100.0	23.8	בני 75+
27.0	9.0	64.0	100.0	9.7	69-65
18.0	22.0	59.0	100.0	12.6	74-70
41.0	23.0	36.0	100.0	19.2	79-75
12.0	42.0	47.0	100.0	17.4	84-80
39.0	24.0	37.0	100.0	46.6	בני 85+
<b>מין</b>					
28.0	28.0	44.0	100.0	13.6	גברים
31.0	22.0	48.0	100.0	19.0	נשים

מקור: ורטמן, א'; ברודסקי, ג'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2005, קשישים הלוקים בדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, מאירס-גיוינט-מכון ברוקדייל

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת (ראו מבוא)
2. הנתונים לגבי חומרת המחלה מתייחסים ל-95% מבני 65+ הגרים בקהילה שעבורם התקבל דיווח בנוגע לכך

לוח 2.29: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיה גופנית<sup>(1)</sup>, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

				אחוזים
כלל האוכלוסייה <sup>(2)</sup>	75+	74-65	65+	
9.9	34.2	19.4	25.0	סה"כ
				מין
8.0	25.6	13.0	17.5	גברים
11.7	40.2	24.6	30.7	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
9.2	34.2	18.7	24.7	יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>
15.2	(33.9)	(29.3)	30.2	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>
2.1	..	..	..	ישראל
10.4	36.0	28.5	30.8	אסיה
11.7	(41.5)	33.3	35.0	אפריקה
9.8	33.6	12.4	22.0	אירופה-אמריקה
12.4	47.8	15.1	27.9	מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(4)</sup>
				קופת החולים
12.7	33.7	22.4	26.7	כללית
6.1	33.0	(14.4)	20.0	מכבי
5.3	(34.4)	..	(19.8)	מאוחדת
8.4	36.5	..	21.6	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. בעיה שנמשכת 6 חודשים או יותר, עקב מחלה, תאונה או מלידה וגורמת כיום קושי גדול או גדול מאוד בביצוע פעולות יום-יומיות כמו ניקיון הבית או קניות
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.30: אומדנים\* של מידת יכולתם של בני 65+ הגרים בקהילה לבצע פעולות יום-יומיות ללא עזרה, 2004**

אחוזים, סוף שנה

לא יכול	יכול אך בקושי	יכול ללא קושי	סה"כ	
6.6	14.4	79.0	100.0	להתלבש
11.4	13.8	74.8	100.0	להתקלח או להתרחץ
2.6	5.9	91.5	100.0	לאכול
3.9	15.1	81.0	100.0	להיכנס למיטה ולצאת ממנה
4.0	15.3	80.7	100.0	להתיישב על כיסא ולקום ממנו

מקור: משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה  
\* לגבי מקור האומדנים ראו במבוא

**לוח 2.31: אומדנים<sup>(1)</sup> של מידת הניידות של בני 65+ הגרים בקהילה, 2004**

אחוזים, סוף שנה

מסוגל להיות נייד/לניידות					
מרותק לבית	בעזרת אדם אחר או יושב בכיסא גלגלים	בעזרת מכשיר (מקל, הליכון)	ללא עזרת אדם או מכשיר		סה"כ
			71.5	7.6	
13.2	7.7	7.6	71.5	100.0	ניידות מחוץ לבית <sup>(2)</sup>
1.8	2.7	95.5		100.0	ניידות בתוך הבית

מקור: משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה  
1. לגבי מקור האומדנים ראו במבוא  
2. יכולת ללכת (להסתובב) מרחק של 400 מטר

לוח 2.32: אומדן<sup>(1)</sup> בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היום-יומיות (ADL)<sup>(2)</sup>, 2004

אחוזים, סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
19.5	11.9	16.3	כלל בני 65+
			גיל
7.9	4.9	6.5	בני 65-74
14.3	10.8	12.9	בני 75-79
47.0	30.2	40.4	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
18.2	11.3	15.3	יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>
20.1	10.4	16.4	מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(4)</sup>
39.9	19.9	30.7	ערבים
			יבשת לידה של יהודים ואחרים <sup>(3)</sup>
21.1	14.1	17.9	אסיה-אפריקה
17.2	10.1	14.2	אירופה-אמריקה וישראל

מקור: משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה

1. לגבי מקור האומדנים - ראו במבוא
2. כולל שתי אוכלוסיות:
  - (א) קשישים הגרים בקהילה הזקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, נידות בתוך הבית;
  - (ב) קשישים דיירי מוסדות לטיפול ממושך: תשושים סיעודיים ותשושי נפש
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.33: אומדן<sup>(1)</sup> בני +65 המוגבלים בביצוע הפעולות היום-יומיות (ADL), שנים נבחרות**

סוף שנה

אחוז המוגבלים מתוך בני +65 <sup>(2)</sup>	אחוזים	אלפים	
<b>1990</b>			
<b>13.2</b>	<b>100.0</b>	<b>58.3</b>	<b>סה"כ מוגבלים</b>
11.0	80.1	46.7	בקהילה <sup>(3)</sup>
67.2	19.9	11.6	במוסדות לטיפול ממושך <sup>(4)</sup>
<b>1999</b>			
<b>14.5</b>	<b>100.0</b>	<b>88.4</b>	<b>סה"כ מוגבלים</b>
11.8	78.1	69.0	בקהילה <sup>(3)</sup>
77.7	21.9	19.4	במוסדות לטיפול ממושך <sup>(4)</sup>
<b>2004</b>			
<b>16.3</b>	<b>100.0</b>	<b>110.9</b>	<b>סה"כ מוגבלים</b>
12.9	76.0	84.3	בקהילה <sup>(3)</sup>
94.2	24.0	26.6	במוסדות לטיפול ממושך <sup>(4)</sup>

מקור: משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה

1. לגבי מקור האומדנים - ראו במבוא לפרק זה ב"הגדרות והסברים"
2. מתוך האוכלוסייה המתאימה
3. זקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, ניידות בתוך הבית
4. דיירים תשושים, סיעודיים ותשושי נפש

לוח 2.34: בני 65+ בקהילה אשר נפלו במהלך חצי השנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
	נשים	גברים	סה"כ
<b>כלל בני 65+</b>	<b>23.9</b>	<b>14.0</b>	<b>19.6</b>
<b>גיל</b>			
בני 65-74	19.8	9.0	15.1
בני 75-79	26.5	15.6	21.7
בני 80+	33.7	27.9	31.2
<b>קבוצת אוכלוסייה</b>			
יהודים ואחרים <sup>(1)</sup>	24.4	14.3	20.1
מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(2)</sup>	23.4	10.3	18.3
ערבים	15.0	8.1	11.8
<b>יבשת לידה של יהודים ואחרים<sup>(1)</sup></b>			
ישראל	18.9	12.8	16.2
אסיה-אפריקה	30.6	19.6	25.6
אירופה-אמריקה	22.5	12.1	18.2

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.35: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2004**

מספרים מוחלטים

סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל	
<b>בני +65</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>88</b>	<b>314</b>	<b>1,508</b>	
גברים	50	169	874	
נשים	38	145	634	
<b>בני 65-74</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>33</b>	<b>165</b>	<b>994</b>	
גברים	22	92	570	
נשים	11	73	424	
<b>בני +75</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>55</b>	<b>149</b>	<b>514</b>	
גברים	28	77	304	
נשים	27	72	210	
<b>בני +65 לפי מעמד הנפגע</b>				
הולך רגל	58	212	369	
נהג רכב	15	45	626	
נוסע ברכב	11	28	475	
אחר	4	29	38	
<b>בני +65 לפי קבוצת אוכלוסייה*</b>				
יהודים	76	286	1,343	
ערבים	10	22	136	
<b>כלל האוכלוסייה</b>				
<b>סה"כ</b>	<b>480</b>	<b>2,442</b>	<b>33,997</b>	
גברים	332	1,617	20,970	
נשים	148	825	13,027	

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

\* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים



לוח 2.36: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2004  
שיעורים ל-100,000 נפש

סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל	
<b>בני +65</b>				
<b>283</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>223</b>	<b>סה"כ</b>
380	17	59	304	גברים
211	10	37	163	נשים
<b>בני 65-74</b>				
323	9	45	269	סה"כ
415	13	56	346	גברים
249	5	36	208	נשים
<b>בני +75</b>				
234	18	49	167	סה"כ
333	23	63	247	גברים
168	15	39	114	נשים
<b>בני +65 לפי קבוצת אוכלוסייה*</b>				
277	12	46	218	יהודים
393	23	52	319	ערבים
<b>כלל האוכלוסייה</b>				
542	7	36	499	סה"כ
682	10	48	624	גברים
406	4	24	378	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; שנתון סטטיסטי \* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

**לוח 2.37: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות**  
שיעורים ל-100,000 נפש

מזה: הרוגים		סה"כ נפגעים		
כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	
9	24	442	378	1985
9	23	594	459	1990
9	23	818	408	1996
9	21	814	385	1997
9	21	826	379	1998
8	18	743	363	1999
8	12	584	219	2001
8	16	581	290	2002
7	12	554	273	2003
<b>7</b>	<b>13</b>	<b>542</b>	<b>283</b>	<b>2004</b>

מקור: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.38: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2004

חומרת התאונות				
קלות	קשות	קטלניות	סה"כ	
<b>1,413</b>	<b>157</b>	<b>31</b>	<b>1,601</b>	<b>מספרים מוחלטים</b>
				<b>נהגים מעורבים בני 65+</b>
				<b>גיל</b>
1000	118	19	1,137	בני 65-74
413	39	12	464	בני 75+
				<b>מין</b>
1,184	138	29	1,351	גברים
229	19	2	250	נשים
				<b>כלל הנהגים המעורבים</b>
30,275	3,091	671	34,037	סה"כ <sup>(1)</sup>
22,297	2,532	568	25,397	גברים
7,061	479	83	7,623	נשים
				<b>שיעורים ל-10,000 נהגים<sup>(2)</sup></b>
				<b>בני 65+</b>
<b>73</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>סה"כ</b>
83	10	2	95	גברים
44	4	0	48	נשים
				<b>כלל הנהגים</b>
<b>101</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>סה"כ</b>
123	14	3	140	גברים
59	4	1	64	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מצבת הנהגים בישראל

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2003 ובסוף 2004

**לוח 2.39: ביקורים בחדרי מיון\* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2002**

שיעור ביקורים ל-1,000 נפש	אחוז הביקורים של בני 65+ מתוך כלל הביקורים		מספר ביקורים	
	644	17.0		
				<b>גיל</b>
524	7.2	176,151		בני 65-74
766	6.8	167,089		בני 75-84
1,139	3.0	73,272		בני 85+
<b>380</b>		<b>2,452,101</b>		<b>כלל האוכלוסייה</b>

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)  
 \* מבוסס על דיווח של 28 חדרי מיון בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים כוללים את הביקורים בכל חדרי המיון במוסדות לאשפוז כללי פרט לביקורים בחדרי מיון בבתי חולים במזרח ירושלים

לוח 2.40: סיבות כניסה לחדרי מיון\* של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2002

אחוזים

אחוז מכלל הסיבות		סה"כ	
סיבות חיצוניות	מחלות		
<b>סה"כ</b>			
<b>10.7</b>	<b>89.3</b>	<b>100.0</b>	<b>כלל בני +65</b>
11.3	88.7	100.0	בני 74-65
9.8	90.2	100.0	בני 84-75
11.1	88.9	100.0	בני +85
27.9	72.1	100.0	כלל האוכלוסייה
<b>גברים</b>			
<b>9.5</b>	<b>90.5</b>	<b>100.0</b>	<b>כלל בני +65</b>
10.6	89.4	100.0	בני 74-65
8.3	91.7	100.0	בני 84-75
9.3	90.7	100.0	בני +85
36.0	64.0	100.0	כלל האוכלוסייה
<b>נשים</b>			
<b>11.7</b>	<b>88.3</b>	<b>100.0</b>	<b>כלל בני +65</b>
12.1	87.9	100.0	בני 74-65
11.0	89.0	100.0	בני 84-75
12.4	87.6	100.0	בני +85
18.8	81.2	100.0	כלל האוכלוסייה

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)  
 \* מבוסס על דיווח של 19 בתי חולים בבעלות ממשלתית, עירונית-ממשלתית ובעלותה של שירותי בריאות כללית, הכוללים 85% מכלל הביקורים בחדרי מיון בשנת 2002

**לוח 2.41: ביקורים בחדרי מיון\* עקב סיבות חיצוניות של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2002**

אחוזים

פגיעה לא מכוונת/ כוונה לא ברורה	פגיעה מכוונת	פעולת איבה	תאונות עבודה	תאונות דרכים	סה"כ	
84.6	1.9	0.3	1.8	11.4	100.0	<b>כלל בני +65</b>
75.5	2.7	0.4	3.6	17.8	100.0	בני 74-65
89.0	1.5	0.2	0.7	8.6	100.0	בני 84-75
96.6	0.9	0.1	0.0	2.4	100.0	בני +85
60.0	3.7	0.5	10.8	25.0	100.0	כלל האוכלוסייה

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)  
 \* מבוסס על דיווח של 19 בתי חולים בבעלות ממשלתית, עירונית-ממשלתית ובעלותה של שירותי בריאות כללית, הכוללים 85% מכלל הביקורים בחדרי מיון בשנת 2002

לוח 2.42: בני +65 וכלל האוכלוסייה המדווחים על אשפוז בבית חולים<sup>(1)</sup>, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה	75+	74-65	65+	
13.9	25.1	23.2	24.0	סה"כ
				מין
13.1	24.1	27.4	26.2	גברים
14.7	25.9	19.8	22.2	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
13.6	24.9	23.0	23.7	יהודים ואחרים <sup>(2)</sup>
15.9	..	(26.2)	(27.9)	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים <sup>(2)</sup>
12.6	..	..	..	ישראל
13.1	(24.3)	18.7	20.4	אסיה
15.0	(24.9)	26.5	26.2	אפריקה
13.6	24.9	23.9	24.3	אירופה-אמריקה
12.3	25.3	21.2	22.8	מזה: עולי בריה"מ לשעבר <sup>(3)</sup>
				קופת החולים
16.7	29.6	26.0	27.4	כללית
10.5	(14.8)	(16.0)	15.6	מכבי
12.0	(25.2)	..	(19.6)	מאוחדת
11.4	..	(24.3)	(17.3)	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. אשפוז בשנים עשר החודשים הקודמים לריאיון, לצורך ניתוח או טיפול רפואי במסגרת אשפוז או אשפוז יום
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.43: אשפוזים<sup>(1)</sup> של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות כלליות, לפי מין וגיל, שנים נבחרות**

שיעורים ל-1,000 נפש

	2002	2001	<sup>(2)</sup> 2000	1995	1990	
<b>בני 65+</b>						
סה"כ	543	546	527	483	407	
גברים	626	629	609	567	471	
נשים	481	486	467	418	354	
<b>בני 65-74</b>						
סה"כ	423	433	420	402	342	
גברים	502	508	496	479	401	
נשים	360	373	360	343	294	
<b>בני 75+</b>						
סה"כ	689	687	664			
גברים	793	791	764			
נשים	619	617	596			
<b>בני 75-84</b>						
סה"כ	628	632	609	573	477	
גברים	726	729	707	673	548	
נשים	559	564	539	499	419	
<b>בני 85+</b>						
סה"כ	900	868	840	717	586	
גברים	1,042	1,010	956	826	671	
נשים	814	780	766	638	521	
<b>כלל האוכלוסייה</b>						
סה"כ	155	156	150	144	123	
גברים	155	156	151	142	122	
נשים	155	157	150	146	125	

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים בבתי חולים לאשפוז כללי, 1995

1. שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד
2. הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך-הכול כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)



לוח 2.44: אשפוזים<sup>(1)</sup> של בני 65+ במחלקות כלליות מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות  
אחוזים

	2002	2001	2000 <sup>(2)</sup>	1995	1990	
<b>בני 65+</b>						
סה"כ	34.5	34.2	34.3	31.9	30.0	
גברים	34.4	34.1	34.2	33.1	31.8	
נשים	34.6	34.3	34.4	30.9	28.2	
<b>בני 75+</b>						
סה"כ	19.7	19.2	19.0	15.9	15.4	
גברים	18.5	18.2	18.1	16.1	16.1	
נשים	20.7	20.1	19.9	15.8	14.7	
<b>בני 85+</b>						
סה"כ	5.8	5.7	5.8	4.1	3.0	
גברים	5.1	5.1	5.2	4.0	3.1	
נשים	6.4	6.2	6.4	4.1	3.0	

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים";  
למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

- שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד
- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך-הכול כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)

**לוח 2.45: בני +65 מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות**

אחוזים

2002	2001	<sup>(1)</sup> 2000	1995	1990	
34.5	34.2	34.3	31.9	30.0	כלל המחלקות הכלליות <sup>(2)</sup>
58.9	58.2	58.3	57.9	55.2	פנימית
45.9	45.8	45.9	48.0	46.4	ריאות
96.4	96.2	95.9	91.8	79.4	גריאטרייה אקוטית
33.5	32.7	34.1	34.9	33.7	נירולוגיה
38.4	37.5	38.2	38.0	38.5	אונקולוגיה
29.9	32.3	32.1	33.7	31.1	עור ומין
6.4	4.4	4.0			השתלת מוח עצם
49.3	48.3	47.0	47.2	43.8	טיפול נמרץ כללי
49.7	50.4	50.2	45.3	44.4	טיפול נמרץ לב
73.5	71.8	73.9	52.7	47.2	טיפול נמרץ נשימתי
26.5	26.5	27.0	27.5	26.2	כירורגייה כללית
32.8	33.0	32.4	30.0	25.2	אורתופדיה
41.8	40.7	40.3	40.4	41.7	אורולוגיה
29.9	27.9	28.8	22.6	23.7	נירוכירורגייה
49.3	47.9	47.4	43.8	36.4	כירורגייה חזה ולב
56.4	57.0	56.2	49.4	45.8	כירורגייה כלי דם
29.5	29.1	28.2	15.1	22.0	כירורגייה פלסטית
60.3	60.0	58.3	55.5	56.4	עיניים
13.0	12.4	12.8	10.6	10.0	אף-אוזן-גרון
13.1	12.9	11.8	14.8	15.1	פה ולסת
4.7	4.5	4.1	5.5	4.0	נשים
31.9	33.8	36.3	38.9	39.7	השהיה

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים";

למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

1. הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך-הכול כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
2. לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות

לוח 2.46: התפלגות האשפוזים בקרב בני +65 במחלקות כלליות, לפי מין, 2002<sup>(1)</sup>

אחוזים			
נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	סה"כ מחלקות כלליות <sup>(2)</sup>
54.6	52.6	53.6	פנימית
0.4	0.5	0.4	ריאות
5.1	3.7	4.4	גריאטרייה אקוטית
1.4	1.6	1.5	נירולוגיה
1.0	1.3	1.1	אונקולוגיה
0.4	0.4	0.4	עור ומין
0.0	0.0	0.0	השתלת מוח עצם
1.4	1.6	1.5	טיפול נמרץ כללי
2.6	4.2	3.4	טיפול נמרץ לב
0.1	0.1	0.1	טיפול נמרץ נשימתי
11.6	12.3	12.0	כירורגייה כללית
6.2	3.2	4.8	אורתופדיה
1.4	6.0	3.7	אורולוגיה
0.5	0.6	0.5	נירוכירורגייה
1.2	2.1	1.6	כירורגייה חזה ולב
1.0	1.9	1.4	כירורגייה כלי דם
0.6	0.8	0.7	כירורגייה פלסטית
5.2	3.9	4.6	עיניים
0.9	1.1	1.0	אף-אוזן-גרון
0.1	0.1	0.1	פה ולסת
2.2	0.0	1.1	נשים
2.3	1.8	2.1	השהיה

- מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"
- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך-הכול כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
  - לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות

לוח 2.47: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי, 2002<sup>(1)</sup>

ימים

כלל האוכלוסייה			בני 65+			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
4.3	4.5	4.4	5.9	5.7	5.8 <sup>(2)</sup>	כלל המחלקות הכלליות
4.6	4.2	4.4	5.1	4.9	5.0	פנימית
9.0	12.0	10.7	9.1	8.9	8.9	ריאות
12.1	11.2	11.7	11.9	11.1	11.5	גריאטרייה אקוטית
6.0	6.1	6.1	7.8	7.9	7.9	נירולוגיה
6.8	6.0	6.4	8.6	7.3	7.9	אונקולוגיה
7.6	8.2	7.9	9.4	9.8	9.6	עור ומין
12.6	11.7	12.0	7.8	9.3	8.8	השתלת מוח עצם
5.8	6.2	6.0	6.6	7.0	6.8	טיפול נמרץ כללי
2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	טיפול נמרץ לב
9.1	8.0	8.5	10.0	8.6	9.3	טיפול נמרץ נשימתי
2.9	3.2	3.0	4.8	4.7	4.7	כירורגייה כללית
6.2	5.0	5.5	8.0	7.7	7.9	אורתופדיה
4.5	4.4	4.4	5.2	5.3	5.3	אורולוגיה
7.7	7.3	7.5	9.2	8.7	8.9	נירוכירורגייה
7.3	6.9	7.0	8.2	7.5	7.8	כירורגייה חזה ולב
4.7	5.3	5.1	5.4	5.6	5.6	כירורגייה כלי דם
5.7	6.5	6.1	7.6	5.3	6.3	כירורגייה פלסטית
2.7	2.9	2.8	2.5	2.6	2.6	עיניים
3.2	3.1	3.1	4.6	4.4	4.5	אף-אוזן-גרון
3.6	3.7	3.6	4.1	3.9	4.0	פה ולסת
2.4	1.2	2.4	4.1	1.0	4.1	נשים
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	השהיה

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"

- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך-הכול כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
- לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל שהייה במחלקות יולדות

**לוח 2.48: בני 65+ וכלל האוכלוסייה הממתינים לאשפוז, לפי משך ההמתנה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000**

סה"כ	עד חודש	2-1 חודשים	3 חודשים ויותר	
<b>אלפים</b>				
<b>16.7</b>	<b>7.1</b>	<b>(2.6)</b>	<b>6.6</b>	<b>כלל בני 65+</b>
50.0	18.2	10.7	19.8	כלל האוכלוסייה
<b>שיעורים ל-1,000 נפש</b>				
<b>29.0</b>	<b>12.0</b>	<b>(5.0)</b>	<b>11.0</b>	<b>כלל בני 65+</b>
9.0	3.0	2.0	3.0	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

**לוח 2.49: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המטופלים<sup>(1)</sup> בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי<sup>(2)</sup>, לפי מין, 2003**

סוף שנה

סה"כ	גברים	נשים	
<b>מספרים מוחלטים</b>			
<b>6,404</b>	<b>2,424</b>	<b>3,980</b>	<b>מטופלים בני 65+</b>
51,505	27,348	24,157	מטופלים בכלל האוכלוסייה
<b>אחוזים</b>			
12.4	8.9	16.1	בני 65+ מכלל המטופלים
0.9	0.8	1.0	מטופלים בני 65+ מכלל בני 65+
0.7	0.8	0.7	כלל המטופלים מתוך האוכלוסייה

מקור: בריאות הנפש בישראל, שנתון סטטיסטי 2004

1. אנשים שהיה להם מפגש אחד לפחות עם מטפל או עם גורם אחר במחצית השנייה של 2003
2. נתונים אלה אינם ארציים אלא מתייחסים למרפאות ממשלתיות ממוחשבות, אשר לפי ההערכה מהוות כ-50% מכלל המרפאות בארץ

**לוח 2.50: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המאושפזים במסגרת אישפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2003**

מספרים מוחלטים, סוף שנה

סה"כ	גברים	נשים	
<b>31</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>בני 65+</b>
27	14	13	בני 65-74
4	2	2	בני 75-84
0	0	0	בני 85+
1,015	624	391	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.51: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי  
מלא, לפי גיל ומין, 2003

סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
<b>מספרים מוחלטים</b>			
<b>414</b>	<b>292</b>	<b>706</b>	<b>כלל בני 65+</b>
241	222	463	בני 65-74
147	54	201	בני 75-84
26	16	42	בני 85+
1,835	2,950	4,785	כלל האוכלוסייה
<b>שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה</b>			
<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>כלל בני 65+</b>
1.2	1.4	1.3	בני 65-74
1.0	0.6	0.8	בני 75-84
0.6	0.6	0.6	בני 85+
0.5	0.9	0.7	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.52: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+,  
והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין,

**שנים נבחרות**

שיעורים ל-1,000 נפש, סוף שנה

2003	2002	2001	2000	1990	
					<b>כלל בני 65+</b>
<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>3.5</b>	<b>סה"כ</b>
1.0	1.3	1.3	1.4	3.1	גברים
1.1	1.2	1.4	1.5	3.9	נשים
					<b>בני 65-74</b>
					סה"כ
1.3	1.4	1.5	1.7	3.6	גברים
1.4	1.6	1.6	1.7	3.7	נשים
1.2	1.3	1.5	1.6	3.5	
					<b>בני 75-84</b>
					סה"כ
0.8	1.1	1.2	1.3	3.6	גברים
0.6	0.9	0.9	1.0	2.3	נשים
1.0	1.2	1.4	1.5	4.5	
					<b>בני 85+</b>
					סה"כ
0.6	0.7	0.9	1.0	3.1	גברים
0.6	0.5	0.6	0.6	1.8	נשים
0.6	0.8	1.0	1.2	4.0	
					<b>כלל האוכלוסייה</b>
					סה"כ
0.7	0.7	0.8	0.8	1.8	גברים
0.9	0.9	1.0	1.0	2.1	נשים
0.5	0.6	0.6	0.7	1.5	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה



**לוח 2.53: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות**

מספרים מוחלטים

	2003	2002	2001	2000	1990	
<b>כלל בני 65+</b>						
סה"כ	1,720	1,707	1,751	1,867	1,412	
גברים	644	669	636	641	526	
נשים	1,076	1,038	1,115	1,226	886	
<b>בני 65-74</b>						
סה"כ	1,098	1,049	1,062	1,117	892	
גברים	429	436	401	408	321	
נשים	669	613	661	709	571	
<b>בני 75-84</b>						
סה"כ	537	583	587	621	467	
גברים	180	199	195	186	181	
נשים	357	384	392	435	286	
<b>בני 85+</b>						
סה"כ	85	75	102	129	53	
גברים	35	34	40	47	24	
נשים	50	41	62	82	29	
<b>כלל האוכלוסייה</b>						
סה"כ	19,007	18,264	17,869	18,172	12,262	
גברים	11,330	10,844	10,594	10,632	6,788	
נשים	7,677	7,420	7,275	7,540	5,474	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.54: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2003

בני +85	בני 75-84	בני 65-74	בני +65	
				<b>מספרים מוחלטים</b>
				<b>סה"כ קבלות</b>
85	537	1,098	1,720	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
11	94	425	530	הפרעות פסיכוטיות חריפות
3	8	25	36	הפרעות אפקטיביות
20	251	461	732	הפרעות אורגניות
43	134	94	271	הפרעות נירוטיות
0	26	37	63	הפרעות אישיות
0	5	11	16	סמים ואלכוהול
1	3	10	14	פיגור שכלי
0	0	1	1	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
6	16	30	52	לא רשום/לא ידוע
1	0	4	5	
				<b>אחוזים</b>
				<b>סה"כ קבלות</b>
100.0	100.0	100.0	100.0	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
12.9	17.5	38.7	30.8	הפרעות פסיכוטיות חריפות
3.5	1.5	2.3	2.1	הפרעות אפקטיביות
23.5	46.7	42.0	42.6	הפרעות אורגניות
50.6	25.0	8.6	15.8	הפרעות נירוטיות
0.0	4.8	3.4	3.7	הפרעות אישיות
0.0	0.9	1.0	0.9	סמים ואלכוהול
1.2	0.6	0.9	0.8	פיגור שכלי
0.0	0.0	0.1	0.1	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
7.1	3.0	2.7	3.0	לא רשום/לא ידוע
1.2	0.0	0.4	0.3	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

**לוח 2.55: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2003**

נשים	גברים	סה"כ	
			<b>מספרים מוחלטים</b>
<b>293</b>	<b>215</b>	<b>508</b>	<b>כלל בני 65+</b>
147	109	256	בני 74-65
123	82	205	בני 84-75
23	24	47	בני 85+
1,758	2,451	4,209	כלל האוכלוסייה
			<b>שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה</b>
<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>כלל בני 65+</b>
0.7	0.7	0.7	בני 74-65
0.9	0.8	0.9	בני 84-75
0.6	1.0	0.7	בני 85+
0.5	0.7	0.6	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

**לוח 2.56: פטירות של בני +65, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2003**

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

	יהודים ואחרים <sup>(1)</sup>			סה"כ			סה"כ		
	ערבים	סה"כ גברים	נשים	סה"כ גברים	נשים	סה"כ גברים	נשים	נשים	
<b>בני +65</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>46</b>
בני 65-69	17	29	23	11	18	14	11	19	15
בני 70-74	31	41	35	19	31	24	20	31	25
<b>בני +75</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>71</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>78</b>
בני 75-79	64	71	67	34	51	41	36	52	42
בני 80-84	83	85	84	63	80	70	64	81	71
<b>בני +85</b>	<b>197</b>	<b>174</b>	<b>185</b>	<b>160</b>	<b>174</b>	<b>165</b>	<b>161</b>	<b>174</b>	<b>166</b>
שיעורים מתוקננים בני +65 <sup>(2)</sup>	57	63	60	40	52	46	41	53	47

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. אוכלוסיית התקן היא ממוצע (גברים ונשים) של כלל האוכלוסייה בשנת 2003 לפי קבוצת גיל

לוח 2.57: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים\*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, 2000-2003

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
<b>2000</b>			
<b>67.3</b>	<b>69.8</b>	<b>68.5</b>	<b>בני 65+</b>
71.6	69.8	70.6	בני 74-65
66.1	69.8	67.8	בני 75+
69.4	55.8	60.8	בני 0-64
67.6	65.9	66.8	כלל האוכלוסייה
<b>2001</b>			
<b>66.7</b>	<b>68.6</b>	<b>67.6</b>	<b>בני 65+</b>
70.3	68.7	69.4	בני 74-65
65.7	68.5	67.0	בני 75+
68.8	52.8	58.8	בני 0-64
67.0	64.3	65.6	כלל האוכלוסייה
<b>2002</b>			
<b>66.6</b>	<b>68.5</b>	<b>67.5</b>	<b>בני 65+</b>
69.9	67.6	68.6	בני 74-65
65.8	68.8	67.2	בני 75+
65.2	52.3	57.1	בני 0-64
66.4	64.0	65.2	כלל האוכלוסייה
<b>2003</b>			
<b>65.5</b>	<b>69.3</b>	<b>67.2</b>	<b>בני 65+</b>
70.8	68.1	69.3	בני 74-65
65.5	69.3	67.2	בני 75+
68.3	51.9	58.1	בני 0-64
66.8	64.4	65.6	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות

\* כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

**לוח 2.58: פטירות של יהודים ואחרים<sup>(1)</sup> בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2003**

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

בני 75+			בני 65-74			65+	
80+	75+	סה"כ	74-70	69-65	סה"כ		
109	77	41	24	14	19	<b>45</b>	<b>סה"כ</b>
116	85	51	31	18	24	<b>50</b>	גברים
104	71	34	19	10	15	<b>42</b>	נשים
73	48	31	17	11	13	<b>23</b> <sup>(2)</sup>	<b>סה"כ ילידי ישראל<sup>(2)</sup></b>
73	54	40	22	13	16	<b>26</b>	גברים
72	43	25	14	9	10	<b>20</b>	נשים
116	80	44	26	13	19	<b>43</b>	<b>סה"כ ילידי אסיה</b>
119	86	53	33	17	24	<b>47</b>	גברים
113	75	38	21	10	15	<b>39</b>	נשים
132	90	54	28	17	22	<b>46</b>	<b>סה"כ ילידי אפריקה</b>
136	95	62	35	23	28	<b>51</b>	גברים
129	86	47	22	13	17	<b>41</b>	נשים
108	77	39	24	14	19	<b>50</b>	<b>סה"כ ילידי אירופה- אמריקה</b>
117	87	50	31	19	25	<b>56</b>	גברים
102	71	33	19	11	15	<b>46</b>	נשים
101	68	40	26	15	20	<b>40</b> <sup>(3)</sup>	<b>עולי בריה"מ לשעבר<sup>(3)</sup></b>
110	75	51	33	20	26	<b>45</b>	גברים
97	64	33	22	11	15	<b>38</b>	נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

### לוח 2.59: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2003

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני +65			סה"כ	
גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ		
562	585	576	4,187	5,042	4,551	סה"כ*	
16	16	16	126	142	133	מחלות זיהומיות	
141	144	143	894	1,253	1,047	שאתות ממאירות	
45	38	42	364	384	373	סוכרת	
12	7	10	105	70	90	יתר לחץ-דם	
26	30	28	212	284	242	אוטם חריף של שריר הלב	
47	57	52	406	591	485	מחלת לב איסכמית אחרת	
37	32	35	300	302	301	מחלות לב אחרות	
40	34	37	333	355	342	מחלות של כלי דם במוח	
6	6	6	46	61	52	מחלות אחרות של מחזור הדם	
10	10	10	80	104	90	דלקת ריאות	
						מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	
15	18	17	126	184	151		
13	11	12	105	109	107	יתר מחלות מערכת הנשימה	
5	7	6	33	46	39	מחלות כבד	
18	23	21	146	242	187	מחלות כליה	
3	4	4	0	0	0	מומים מולדים	
						סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	
21	30	26	147	190	165		
84	65	75	671	618	648	כל המחלות האחרות	
4	11	8	9	21	14	תאונות דרכים	
2	10	6	5	21	12	פגיעה עצמית מכוונת	
13	25	19	77	87	81	כל הסיבות החיצוניות האחרות	

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

\* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.60: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2003

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות - במספרים מוחלטים*
בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	האוכלוסייה	
10,705	12,484	6,970	30,159	38,359	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
2.9	3.1	2.6	2.9	2.8	מחלות זיהומיות
14.1	24.0	34.8	23.0	24.8	שאותות ממאירות
6.4	9.0	9.5	8.2	7.2	סוכרת
2.6	1.9	1.2	2.0	1.7	יתר לחץ-דם
5.6	5.5	4.5	5.3	4.9	אוטם חריף של שריר הלב
12.6	10.5	7.9	10.7	9.1	מחלת לב איסכמית אחרת
8.3	6.2	4.7	6.6	6.0	מחלות לב אחרות
7.9	7.7	6.7	7.5	6.5	מחלות של כלי דם במוח
1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	מחלות אחרות של מחזור הדם
2.7	1.8	1.1	2.0	1.7	דלקת ריאות
3.3	3.4	3.1	3.3	2.9	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.1	2.1	1.6	2.3	2.1	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.5	0.9	1.4	0.8	1.0	מחלות כבד
4.7	3.9	3.5	4.1	3.6	מחלות כליה
0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	מומים מולדים
3.8	3.5	3.7	3.6	4.4	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
18.6	13.0	9.8	14.2	13.0	כל המחלות האחרות
0.1	0.3	0.6	0.3	1.3	תאונות דרכים
0.1	0.2	0.6	0.3	1.0	פגיעה עצמית מכוונת
2.1	1.8	1.3	1.8	3.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

\* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות



לוח 2.60: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני +65 ובקרב כלל הגברים, לפי גיל, 2003

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות - במספרים מוחלטים*
בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני +65	הגברים	
4,266	6,031	3,920	14,217	19,332	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
2.8	3.0	2.6	2.8	2.7	מחלות זיהומיות
16.5	25.7	32.5	24.9	24.6	שאותות ממאירות
5.9	7.9	9.0	7.6	6.5	סוכרת
1.8	1.4	0.9	1.4	1.2	יתר לחץ-דם
6.1	5.6	5.2	5.6	5.1	אוטם חריף של שריר הלב
13.5	11.8	9.7	11.7	9.7	מחלת לב איסכמית אחרת
7.3	6.0	4.5	6.0	5.5	מחלות לב אחרות
7.3	6.9	7.0	7.0	5.8	מחלות של כלי דם במוח
1.2	1.1	1.4	1.2	1.0	מחלות אחרות של מחזור הדם
2.9	1.9	1.4	2.1	1.7	דלקת ריאות
4.1	3.5	3.4	3.7	3.1	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
2.6	2.2	1.5	2.2	1.9	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.6	0.8	1.4	0.9	1.2	מחלות כבד
6.3	4.6	3.4	4.8	3.9	מחלות כליה
0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	מומים מולדים
3.3	3.5	4.6	3.8	5.1	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
17.1	11.2	8.6	12.3	11.1	כל המחלות האחרות
0.2	0.4	0.7	0.4	1.9	תאונות דרכים
0.3	0.3	0.8	0.4	1.7	פגיעה עצמית מכוונת
1.9	1.9	1.3	1.7	4.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

\* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.60: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +65 ובקרב כלל הנשים, לפי גיל, 2003

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות - במספרים מוחלטים*
85+	84-75	74-65	בנות +65	הנשים	
6,439	6,453	3,050	15,942	19,027	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3.0	3.2	2.5	3.0	2.8	מחלות זיהומיות
12.5	22.5	37.7	21.4	25.1	שאתות ממאירות
6.8	9.9	10.1	8.7	8.0	סוכרת
3.1	2.3	1.7	2.5	2.1	יתר לחץ-דם
5.2	5.5	3.7	5.1	4.6	אוטם חריף של שריר הלב
12.0	9.3	5.7	9.7	8.4	מחלת לב איסכמית אחרת
8.9	6.5	4.9	7.2	6.6	מחלות לב אחרות
8.3	8.3	6.3	7.9	7.1	מחלות של כלי דם במוח
1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	מחלות אחרות של מחזור הדם
2.5	1.8	0.9	1.9	1.8	דלקת ריאות
2.9	3.3	2.6	3.0	2.7	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.4	1.9	1.9	2.5	2.3	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.4	1.0	1.3	0.8	0.9	מחלות כבד
3.7	3.3	3.6	3.5	3.2	מחלות כליה
0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	מומים מולדים
4.1	3.4	2.5	3.5	3.7	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
19.6	14.7	11.3	16.0	14.9	כל המחלות האחרות
0.1	0.2	0.5	0.2	0.7	תאונות דרכים
0.0	0.1	0.4	0.1	0.4	פגיעה עצמית מכוונת
2.3	1.6	1.3	1.8	2.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

\* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

**לוח 2.61: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, 2001-2004**

אחוזים

כלל האוכלוסייה	בני 65+	בני 65-74	בני 75+	
<b>נובמבר 2001</b>				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
55.6	72.9	70.8	75.5	שירותי בריאות כללית
23.5	14.1	15.5	12.5	מכבי שירותי בריאות
10.0	7.5	7.9	7.1	קופת חולים לאומית
10.9	5.4	5.8	4.9	קופת חולים מאוחדת
<b>נובמבר 2002</b>				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
55.2	71.9	69.4	74.9	שירותי בריאות כללית
23.7	14.8	16.4	12.9	מכבי שירותי בריאות
10.0	7.6	8.0	7.1	קופת חולים לאומית
11.1	5.7	6.2	5.1	קופת חולים מאוחדת
<b>נובמבר 2003</b>				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
54.9	71.0	68.2	74.3	שירותי בריאות כללית
23.9	15.5	17.3	13.2	מכבי שירותי בריאות
9.9	7.6	8.0	7.2	קופת חולים לאומית
11.4	5.9	6.5	5.3	קופת חולים מאוחדת
<b>נובמבר 2004</b>				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
54.4	70.1	67.0	73.6	שירותי בריאות כללית
24.0	16.1	18.1	13.6	מכבי שירותי בריאות
9.8	7.7	8.0	7.3	קופת חולים לאומית
11.7	6.2	6.9	5.4	קופת חולים מאוחדת

מקור: המוסד לביטוח לאומי

**לוח 2.62: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, 1994-2004**

אחוזים

קופת חולים מאוחדת	קופת חולים לאומית	מכבי שירותי בריאות	שירותי בריאות כללית	סה"כ	
4.1	7.2	4.9	13.1	10.2	דצמבר 1994
4.4	7.4	5.1	12.9	10.1	דצמבר 1995
4.4	7.3	5.2	13.0	10.0	נובמבר 1996
4.4	7.2	5.4	13.2	10.1	נובמבר 1997
4.6	7.4	5.5	13.2	10.0	נובמבר 1998
4.7	7.4	5.6	13.1	10.0	נובמבר 1999
4.8	7.5	5.8	13.1	10.0	נובמבר 2000
5.0	7.5	6.0	13.1	10.0	נובמבר 2001
5.2	7.7	6.3	13.1	10.1	נובמבר 2002
5.3	7.9	6.6	13.2	10.2	נובמבר 2003
<b>5.4</b>	<b>8.0</b>	<b>6.8</b>	<b>13.2</b>	<b>10.2</b>	<b>נובמבר 2004</b>

מקור: המוסד לביטוח לאומי

**לוח 2.63: בעלי ביטוח בריאות משלים וביטוחי בריאות נוספים בקרב בני 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי מין, שנים נבחרות**

אחוזים

כלל האוכלוסייה			בני 65+			סה"כ	
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ		
<b>ביטוח בריאות משלים<sup>(1)</sup></b>							
40.0	35.0	37.5	30.0	22.0	<b>27.0</b>	1997	
52.0	50.0	51.0	31.5	37.0	<b>34.0</b>	1999	
66.0	62.0	65.0	58.0	58.0	<b>58.0</b>	2001	
73.0	70.0	72.0	58.0	63.0	<b>60.0</b>	2003	
79.0	79.0	79.0	60.0	69.0	<b>67.0</b>	2005	
<b>ביטוח בריאות פרטי<sup>(2)</sup></b>							
22.0	29.0	26.0	5.0	21.0	<b>12.0</b>	2001	
30.0	38.0	34.0	16.0	21.0	<b>18.0</b>	2003	
31.0	37.0	34.0	15.0	22.0	<b>18.0</b>	2005	
<b>ביטוח סיעודי פרטי<sup>(3)</sup></b>							
27.0	25.0	25.0	25.0	25.0	<b>25.0</b>	2001	
26.0	26.0	26.0	28.0	37.0	<b>32.0</b>	2003	
33.0	35.0	34.0	30.0	43.0	<b>36.0</b>	2005	

- מקורות: גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'. 2000. לקט נתונים על ביטוחי בריאות משלמים ומסחריים 1995-1999, גוינט-מכון ברוקדייל; גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'. 2003. שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל, גוינט-מכון ברוקדייל; גרוס, א'; ברמלי-גרינברג, ש'; מצליח, ר'. 2004. דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות 2003 והשוואה לשנים קודמות. מאיירס-גוינט-מכון ברוקדייל
1. תוכניות לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) המשוקות למבוטחים של קופות החולים בידי הקופות, שהן מלכ"רים
  2. ביטוחים המשוקים בידי חברות ביטוח, שהן למטרות רווח
  3. הביטוח הסיעודי משוק כולו בידי חברות ביטוח. הנתונים לגבי הביטוח הסיעודי הם נתוני חסר, הכיסוי הביטוחי בפועל גדול יותר ממה שנמצא בנתוני הסקר, כנראה בגלל חוסר מודעות לקיום הביטוח