

**מאפיינים בריאותיים
של הקשישים ודפוסי שימוש
בשירותי בריאות נבחרים**



2. מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של הקשישים בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים שונים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד ובשמירה על בריאות הקשישים.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשות באיכות חייו של הקשיש. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, תמותה, סגנון חיים, מחלות ומוגבלות, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. כמו כן, מובאים נתונים על דפוסי שימוש של קשישים בשירותי בריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ♦ **תוחלת החיים בלידה** עולה בהדרגה והגיעה בשנת 2001 ל-81.2 שנים לנשים ו-77.3 שנים לגברים. תוחלת החיים של היהודים גבוהה מזו של האוכלוסייה הערבית; בשנת 2001 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 3.8 שנים בקרב הנשים, ו-3.2 שנים בקרב הגברים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** היא 18.8 שנים לנשים ו-16.8 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 84 בממוצע, וגבר - עד גיל 82 (לוח 2.2).
- ♦ כשליש (36%) מבני 65+ **עוסקים בפעילות גופנית** באופן קבוע, גברים יותר מנשים (41% ו-31%, בהתאמה). העיסוק בפעילות גופנית יורד עם עליית הגיל. רק 22% מבני 80+ עוסקים בפעילות גופנית לעומת 41% מבני 65-74. אחוז העוסקים בפעילות גופנית נמוך מאוד בקרב האוכלוסייה הערבית: 3% לעומת 38% בקרב היהודים (לוח 2.4).
- **הפעילות הגופנית** הנפוצה בקרב קשישים היא הליכה: כ-24% מכלל הקשישים, וכ-67% מבין הקשישים העוסקים בפעילות גופנית, דיווחו על הליכה באופן קבוע (לוח 2.5).
- ♦ תשעה אחוזים מהקשישים **מעשנים**. אחוז הגברים המעשנים יותר מכפול מאחוז הנשים המעשנות (13% לעומת 5%). אחוז הקשישים המעשנים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה מאשר בקרב הקשישים היהודים (13% לעומת 8%). רק 5% מקרב עולי בריה"מ לשעבר מעשנים לעומת 14% מקרב ילידי הארץ (לוח 2.6).
- ♦ עשרים וחמישה מכל 1,000 בני 65+ ביצעו **בדיקת MRI** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), לעומת 11 מכל 1,000 בכלל האוכלוסייה. בקרב בני 65+, שיעורם של הגברים אשר ביצעו בדיקת MRI גבוה פי 1.5 מאשר בקרב הנשים. בתקופה הנדונה ביצעו 163 מכל 1,000 בני 65+ בדיקת CT, לעומת 55 איש מכל 1,000 בכלל האוכלוסייה (לוח 2.7).
- ♦ כ-45% מבני 65+ קיבלו **חיסון נגד שפעת** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000). שיעורם של המקבלים חיסון נגד שפעת בקרב בני 65+ גבוה פי חמישה מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור המקבלים חיסון בקרב עולי בריה"מ לשעבר הוא כמחצית השיעור בקרב קבוצת היהודים ואחרים (23% לעומת 45%, בהתאמה); (לוח 2.7).

- ◆ מעט פחות משליש מבנות +65 עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה. שיעור בנות ה-75 שעברו את הבדיקה הוא נמוך יותר מאשר בקרב בנות 65-74 (17% לעומת 38% בהתאמה); (לוח 2.8).
- ◆ כמעט 40% מהקשישים **ביקרו אצל רופא** פעם אחת לפחות בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), כפול מהאחוז בכלל האוכלוסייה. אצל רופא משפחה ביקרו 32% ואצל רופא מומחה כ-10% (לוח 2.9).
- ◆ קשיש **מבקר אצל רופא** בממוצע כ-15 פעמים בשנה (לא כולל רופא שיניים), מתוכן 11.5 פעמים אצל רופא משפחה ו-3.6 פעמים אצל רופא מומחה. ממוצע הביקורים אצל רופא בשנה בכלל האוכלוסייה הוא כשבעה (לוח 2.10).
- ממוצע הביקורים **לנפש של קשישים אצל רופא שיניים** בשנה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000) היה 2.5, ובקרב בני +75 היה ממוצע הביקורים לנפש נמוך יותר (2 ביקורים); (לוח 2.10).
- עשרים ושניים אחוזים מסך הביקורים אצל רופא משפחה, 19% מסך הביקורים אצל רופא מומחה ו-9% מסך הביקורים אצל רופא שיניים נעשים בידי קשישים. חלקן של הנשים הקשיות מתוך סך הביקורים אצל רופא משפחה הוא 13%, לעומת 9% בקרב הגברים הקשישים (לוח 2.11).
- ◆ קצת למעלה משליש מהקשישים (34%) דיווחו על **בעיות ראייה** (28% מהגברים ו-39% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות ראייה עולה עם הגיל ומגיע ל-47% בקרב בני +80. עשרים ושמונה אחוזים מהקשישים דיווחו על **בעיות שמיעה** (31% מהגברים ו-26% מהנשים). אחוז הסובלים מבעיות שמיעה מגיע ל-48% בקרב בני +80 (לוח 2.12). שבעה עשר אחוזים מהקשישים דיווחו על **אי שליטה על סוגר השתן** (13% מהגברים ו-19% מהנשים). אחוז הסובלים מאי שליטה על סוגר השתן מגיע ל-33% בקרב בני +80 (26% מהגברים ו-39% מהנשים); (לוח 2.13).
- ◆ שלושים ושמונה אחוזים מהגברים בני +65 היהודים ואחרים דיווחו **שהרופא אבחן אצלם יתר לחץ-דם**, בעוד שבקרב הגברים באוכלוסייה הערבית רק 24% דיווחו על כך. אחוז גבוה בהרבה של נשים ערביות ויהודיות דיווחו על כך (45%). עשרים ואחד אחוזים מהגברים היהודים ו-18% בקרב הגברים באוכלוסייה הערבית **דיווחו על אוטם בשריר הלב**, לעומת 10% בקרב הנשים היהודיות ו-14%

בקרב הנשים הערביות. על אבחון **סוכרת** דיווחו 15% מבני +65 היהודים - נשים וגברים, לעומת 26% מהגברים ו-32% מהנשים באוכלוסייה הערבית (לוח 2.14 א' ו-ב').

♦ בשנת 2000 נרשמו 11,484 **מקרים חדשים של שאתות ממאירות** בקרב בני +65, אשר מהווים 1,844 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. השיעור בקרב הגברים גבוה יותר מאשר בקרב הנשים (2,114 לעומת 1,509 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.15).

- בהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה מתקבל כי בקרב יהודים ואחרים שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות גבוה מאשר בקרב האוכלוסייה הערבית (2,177 לעומת 1,192 לכל 100,000 נפש בהתאמה). גם בקרב הנשים שיעור המקרים החדשים גבוה יותר אצל קבוצת היהודיות ואחרות מאשר בקרב האוכלוסייה הערבית: 1,557 לעומת 725 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.16).

♦ על פי מחקר שנערך על ידי ג'וינט-מכון ברוקדייל בקרב האוכלוסייה היהודית לגבי שכיחות **מחלת הדמנטיה** נמצא כי 19% מבני +65 (כ-117 אלף איש) סבלו מהמחלה. 84% מהם מתגוררים בקהילה והיתר במוסדות (לוח 2.18).

- ארבעים ושבעה אחוזים מהחולים המתגוררים בקהילה לוקים במחלה בדרגת חומרה קלה, 24% לוקים ברמת חומרה בינונית ואילו 30% לוקים בה ברמת חומרה קשה. בהשוואה לפי מין נמצא כי 19% מהנשים לוקות במחלה לעומת 14% מהגברים. שכיחות המחלה בקרב בני +65 עולה עם הגיל ומגיעה לשיא בקבוצת בני +85; 47% מבני קבוצת גיל זו לוקים במחלה (לוח 2.19).

♦ מבדיקת יכולת ה**ניידות של הקשישים מחוץ לבית** עולה, כי קרוב לשלושה רבעים מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים ללכת מחוץ לבית למרחק של 400 מטר, ללא כל סיוע. הקשישים שיש להם קושי בניידות מחוץ לבית מתפלגים באופן הבא: 7% מסוגלים ללכת למרחק של 400 מטר בעזרת מכשיר (מקל או הליכון), 7% זקוקים לעזרתו של אדם אחר או שהם יושבים בכיסא גלגלים ו-12% מרותקים לבית. שיעור המוגבלות עולה עם הגיל, והוא גבוה יותר בקרב האוכלוסייה הערבית לעומת היהודית (לוח 2.20).

- ♦ בקרב הקשישים בני 65+ הגרים בקהילה (מחוץ למוסדות), 11% אינם יכולים להתרחץ או להתקלח ללא עזרה, 6% זקוקים לעזרה כדי להתלבש ו-3% זקוקים לעזרה באכילה. בנוסף, אחוז הקשישים שדיווחו על קושי לבצע פעולות אלה, על אף שהם יכולים לבצע אותן ללא עזרה, הגיע ל-13% ברחצה, ל-14% בלבישה ול-6% באכילה. בנוסף, 4% מהקשישים הגרים בקהילה לא יכולים להיכנס למיטה ולצאת ממנה באופן עצמאי, להתיישב ולקום מהכיסא ולנוע בתוך הבית (לוח 2.21, א, ב).
- ♦ אומדן אחוז הקשישים המוגבלים, דהיינו הזקוקים לעזרה באחת מפעולות היומיום לפחות (להתרחץ או להתקלח, להתלבש, לאכול, לשבת ולקום מהכיסא, להיכנס ולצאת מהמיטה, להסתובב בתוך הבית); (ADL = Activities of Daily Living), עומד בסוף 2002 על 16% (12% בקרב הגברים ו-19% בקרב הנשים). אחוז המוגבלים עולה בצורה חדה עם העלייה בגיל: 40% בקרב בני 80+ לעומת 7% בקרב בני 65-74. אחוז הקשישים המוגבלים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה פי שניים בערך מהאחוז המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית (31% ו-15%, בהתאמה); (לוח 2.22).
- בשנים 1990-2002 גדל מספר הקשישים המוגבלים בארץ ב-76% והגיע לכ-102,600 איש בסוף 2002. עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים המוגבלים הם דיירי המוסדות לטיפול ממושך ו-76% גרים בקהילה (לוח 2.23).
- ♦ כחמישית מהקשישים בקהילה נפלו במהלך חצי השנה האחרונה. הגברים סובלים פחות מנפילות (14%) לעומת הנשים (24%). אחוז הקשישים שנפלו מגיע ל-31% בקרב בני 80+ (לוח 2.24).
- ♦ בשנת 2002 נפגעו בתאונות דרכים 1,874 קשישים. מתוכם, 5% נהרגו (102 קשישים), 16% נפצעו קשה (303 קשישים) ו-78% נפצעו קל (1,469 קשישים). שלושים ושישה אחוזים מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 32% נהגו ברכב ו-28% נסעו ברכב. 65% מהקשישים שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (לוח 2.25).
- שיעור הקשישים שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2002 נמוך מזה שבקרב כלל האוכלוסייה (290 ו-581 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך שיעור ההרוגים מתוך הנפגעים כפול בקרב הקשישים לעומת השיעור בכלל האוכלוסייה. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן

בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב הקשישים. שיעור הקשישים שנפגעו בתאונות דרכים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה מאשר בקרב קבוצת היהודים ואחרים (327 ו-286 בהתאמה); (לוח 2.26).

- בשנת 2002 חלה עלייה בשיעור הקשישים שנפגעו בתאונות דרכים, לעומת שנת 2001 (מ-219 ל-290 ל-100,000 נפש), אך השיעור נמוך לעומת השיעור בשנים קודמות. בקרב כלל האוכלוסייה לא חל שינוי משמעותי בשיעור הנפגעים (לוח 2.27).

- שיעור הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים בקרב כלל האוכלוסייה בשנת 2002 גבוה ב-47% משיעור הנהגים בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים (לוח 2.28).

♦ עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים דיווחו על אשפוז בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), 26% בקרב הגברים ו-22% בקרב הנשים. שיעור האשפוזים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה יותר ועומד על 31% לעומת שיעור האשפוזים בקרב קבוצת היהודים ואחרים (23%). מבין היהודים, שיעור האשפוז הנמוך ביותר הוא של ילידי ישראל (18%) והגבוה ביותר הוא של ילידי אפריקה (27%); (לוח 2.29).

♦ שיעורי האשפוז של הקשישים במחלקות האשפוז הכלליות גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. בשנת 2001 נרשמו 542 אשפוזים ל-1,000 קשישים במחלקות האשפוז הכלליות, בהשוואה ל-155 ל-1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-429 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-861 בגיל +85). שיעור האשפוז נמצא במגמת עלייה, הן בקרב כלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב הקשישים (לוח 2.30).

- בבחינת חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים נמצא, כי בשנת 2001, כשליש (34%) מהאשפוזים היו של בני +65 (לאור העובדה שהם מהווים פחות מ-10% מכלל האוכלוסייה), ו-19% מהאשפוזים היו של בני +75 (לאור העובדה שהם מהווים כ-4% מכלל האוכלוסייה). שיעור הקשישים מכלל האשפוזים נמצא במגמת עלייה (לוח 2.31). חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים במחלקות הפנימיות גבוה במיוחד והגיע ל-58% בשנת 2001 (לוח 2.32).

- התפלגות **האשפוזים של הקשישים במחלקות האשפוז** מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר, ומהווה קצת מעל מחצית האשפוזים (לוח 2.33).
- **השהייה הממוצעת במחלקה** בקרב הקשישים גבוהה מזו של כלל האוכלוסייה, גם בקרב הגברים וגם בקרב הנשים. בחינת השהייה הממוצעת במחלקות השונות מצביעה על שהייה ממוצעת גבוהה יחסית במחלקות גריאטריה אקוטית וריאות (לוח 2.34).
- ♦ לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000, **המתינו** 16,700 בני 65+ **לאשפוז** במהלך השנה האחרונה, והם מהווים 3% מבני 65+, לעומת 0.1% שהמתינו לאשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. מכלל הקשישים המתמינים לאשפוז, 40% מתמינים לאשפוז שלושה חודשים ויותר (6,600 איש); (לוח 2.35).
- ♦ ב-2001 היו 63 קשישים **באשפוז יום פסיכיאטרי**, והם היוו 6% מסך השוהים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 83% מכלל הקשישים השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.36).
- ♦ בסוף 2001 היו 869 קשישים מאושפזים **באשפוז פסיכיאטרי**, שיעור של 1.4 מאושפזים ל-1,000 נפש. זאת, בהשוואה ל-0.8 מאושפזים ל-1,000 נפש בקרב כלל האוכלוסייה. שבעה-עשר אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.37). משנת 1990 ועד שנת 2001 חלה ירידה בשיעור הקשישים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-1.4 ל-1,000 נפש); (לוח 2.38).
- במהלך 2001 היו 1,751 **קבלות לאשפוז פסיכיאטרי** של בני 65+, ואלה היוו 10% מסך הקבלות לאשפוז. כשני שלישים מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (לוח 2.39). **שלוש האבחנות השכיחות** לקבלה לאשפוז (91% מהקבלות) היו: הפרעות אפקטיביות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות והפרעות אורגניות (לוח 2.40).
- שנים עשר אחוזים מכלל **הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי** בשנת 2001 היו של בני 65+ (מרביתם בני 65-84, ורק מיעוטם בני 85+); (לוח 2.41).
- ♦ ב-2000 עמד **שיעור הפטירה** ל-1,000 בני 65+ על 53 בקרב הגברים ועל 44 בקרב הנשים. שיעור הפטירה של הגברים היהודים ואחרים נמוך מזה של הגברים

באוכלוסייה הערבית עד גיל 84, ואילו בקרב בני 85+ המצב הפוך. שיעור הפטירה של הנשים היהודיות נמוך מזה של הנשים באוכלוסייה הערבית (לוח 2.42).

◆ שישים ושמונה אחוזים מהקשישים **נפטרו בבית חולים** בשנת 2001, לעומת 59% מבני 0-64. בקרב הקשישים 69% מהגברים ו-67% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 53% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 69% מהנשים (לוח 2.43).

- ב-1999 נפטרו 29,182 אנשים בגיל 65+, שהם 78% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. **סיבות הפטירה העיקריות** בקרב הקשישים הן מחלות במערכת הדם והלב וכן שאתות ממאירות (35% ו-21% בהתאמה). בקרב הגברים, אין הבדל בין הקשישים לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתוך סך הפטירות (23%); ובקרב הנשים השיעור בכלל האוכלוסייה (23%) גבוה מעט מזה שבקרב הנשים הקשישות (20%); (לוחות 2.43; 2.44 א, ב, ג).

- עם העלייה בגיל, עולה חלקן היחסי של מחלות לב וכלי דם בין סיבות פטירה: מ-29% בקרב בני 65-74 ל-38% בקרב בני 85+. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-30% בקרב בני 65-74 ל-13% בקרב בני 85+ (לוח 2.44).

◆ בנובמבר שנת 2002 היו 72% מהקשישים **מבוטחים** בשירותי בריאות כללית (בהשוואה ל-55% מכלל האוכלוסייה), 15% במכבי שירותי בריאות (בהשוואה ל-24% מכלל האוכלוסייה), 8% בקופת חולים לאומית ו-6% בקופת חולים מאוחדת (בהשוואה ל-10% ו-11% מכלל האוכלוסייה בהתאמה). ישנה ירידה לאורך השנים באחוז הקשישים המבוטחים בשירותי בריאות כללית (לוח 2.45). שלושה עשר אחוזים מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם קשישים, בהשוואה ל-6% במכבי שירותי בריאות, 8% בקופת חולים לאומית ו-5% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.46).

◆ ב-2001 היה ל-58% מהקשישים **ביטוח בריאות משלים**, לעומת 65% בקרב כלל האוכלוסייה. מאז שנת 1997 גדל מספר הקשישים בעלי הביטוח המשלים ביותר מפי שניים (בשנת 1997 ל-27% מהקשישים היה ביטוח משלים). לחמישית מהגברים הקשישים, לעומת 5% מהנשים הקשישות יש **ביטוח בריאות פרטי**. אחוז הקשישים בעלי ביטוח בריאות פרטי נמוך יחסית לאוכלוסייה הכללית

(29% מהגברים ו-22% מהנשים בכלל האוכלוסייה). כמו כן, רבע מהקשישים מבוטחים בביטוח סיעודי פרטי, בדומה לאחוז באוכלוסייה הכללית (לוח 2.47).

הגדרות והסברים

קבוצת אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצת האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצת אוכלוסייה: יהודים בלבד, וקבוצת "בני דתות אחרות" הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת. יש לציין כי סקר בני 60 ומעלה נערך בשנת 1997 על-פי ההגדרה החדשה.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מתייחסים לאשפוז במחלקות כלליות בבתי החולים הכלליים בלבד, כפי שמפורט בלוחות. הנתונים אינם כוללים אשפוז במחלקות יולדות ופסיכיאטרייה. הנתונים כוללים אשפוזים במסגרת מחלקות האשפוז בלבד ואינם כוללים מחלקות לאשפוז יום.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפרסם אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה בידי המחלקה למידע והערכה באגף בריאות הנפש, כתוצאה מעדכונים מאוחרים מבתי החולים.

קבלות ראשונות לאשפוז: אנשים שהתקבלו לראשונה בחייהם לבית חולים פסיכיאטרי.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות. הקבלות לאשפוז אינן כוללות קבלות לטיפול יום.

נתונים מסקר בריאות

אשפוז: אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוז יום בבתי חולים.

רופא משפחה: רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים.

רופא שיניים: רופא שיניים ומרפא שיניים, אורתודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

ביקור אצל רופא: ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים, במרפאת חוץ של בית חולים, בתחנת "מגן דוד

אדום", בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית בביתו של הרופא וביקור בבית החולה. לא נכללו התייעצויות בטלפון או ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

מבקר: אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

חולה במחלות כרוניות: אדם המדווח שאי-פעם הרופא אבחן אצלו מחלה כרונית.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
 .. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-40%
 () = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי וג'וינט-מכון ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.2	75.1	80.3	76.6	80.0	76.3	1996
76.8	74.3	80.6	76.4	80.1	76.0	1997
76.8	74.4	80.7	76.4	80.3	76.1	1998
78.1	74.9	80.7	77.0	80.4	76.6	1999
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
77.8	74.5	81.6	77.7	81.2	77.3	2001

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת חיים בגיל 65, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.7	15.3	14.8	13.7	14.9	13.8	1974-1970
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
16.4	16.0	17.9	15.8	17.9	15.8	1995-1991
16.8	16.1	18.1	16.0	18.0	16.0	1996-1992
17.0	16.4	18.3	16.2	18.2	16.2	1997-1993
17.0	16.4	18.5	16.3	18.4	16.3	1998-1994
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
16.6	16.6	18.7	16.5	18.6	16.5	1999-1996
16.6	16.5	18.8	16.7	18.7	16.6	2000-1996
16.7	16.3	19.0	16.8	18.8	16.8	2001-1997

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.3: תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין

בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
5.8	5.5	8.0	7.3	10.8	9.7	1995-1991
5.8	5.5	8.0	7.4	10.8	9.8	1996-1992
5.9	5.5	8.2	7.4	11.0	9.9	1997-1993
5.9	5.5	8.2	7.4	11.1	10.0	1998-1994
5.8	5.6	8.2	7.6	11.2	10.2	1999-1996
5.9	5.7	8.2	7.6	11.3	10.2	2000-1996
5.9	5.8	8.3	7.8	11.4	10.4	2001-1997

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: בני +65 העוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
	נשים	גברים	סה"כ
כלל בני +65	31.4	41.0	35.6
גיל			
בני 65-74	35.5	47.3	40.6
בני 75-79	31.9	35.7	33.6
בני 80+	18.6	26.5	21.9
קבוצת אוכלוסייה			
יהודים ואחרים ⁽¹⁾	33.2	43.5	37.6
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽²⁾	29.9	48.9	37.3
אוכלוסייה ערבית	..	(5.3)	3.0
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾			
ישראל	50.2	45.1	48.0
אסיה-אפריקה	19.6	30.3	24.5
אירופה-אמריקה	36.8	49.4	42.1

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.5: בני 65+ העוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית, לפי סוג הפעילות, ולפי מין, גיל ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים

שחייה		רכיבה על אופניים		התעמלות או ריקוד		הליכה		
מתוך כל העוסקים בפעילות גופנית	מתוך בני 65+	מתוך כל העוסקים בפעילות גופנית	מתוך בני 65+	מתוך כל העוסקים בפעילות גופנית	מתוך בני 65+	מתוך כל העוסקים בפעילות גופנית	מתוך בני 65+	
15.2	5.4	8.0	2.8	45.2	16.0	66.5	23.6	כלל בני 65+
מין								
16.1	6.6	11.7	4.8	34.0	13.8	73.4	30.0	גברים
14.3	4.4	4.3	1.3	56.3	17.6	59.6	18.7	נשים
גיל								
18.1	7.3	8.7	3.5	45.0	18.2	67.8	27.5	בני 65-74
9.6	3.2	7.1	2.4	39.3	12.9	68.9	23.1	בני 75-79
(7.3)	(1.6)	(5.1)	(1.1)	55.3	12.1	55.3	12.0	בני 80+
יבשת לידה של יהודים ואחרים*								
26.0	12.5	(12.3)	(5.9)	52.7	25.0	59.7	28.7	ישראל
11.2	2.7	10.7	2.6	50.3	12.3	61.0	14.9	אסיה-אפריקה
14.8	6.2	6.7	2.8	43.1	18.0	68.7	28.8	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997
 * כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.6: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר מעשנים סיגרייה אחת לפחות ביום, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
15.4	34.0	24.1	כלל האוכלוסייה
5.2	13.1	8.6	כלל בני +65
6.9	16.7	11.1	בני 65-74
2.7	7.8	4.9	בני +75
			קבוצת אוכלוסייה
5.3	12.4	8.4	יהודים ואחרים ⁽¹⁾
..	24.0	13.1	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים
		14.1	ישראל
		12.8	אסיה
		8.4	אפריקה
		7.5	אירופה-אמריקה
		4.6	בריה"מ לשעבר ⁽²⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.7: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות דימות או קיבלו חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

שיעורים ל-1,000 נפש

חיסון נגד שפעת	CT	MRI	
90	55	11	כלל האוכלוסייה
447	163	25	כלל בני +65
			מין
473	173	31	גברים
427	155	19	נשים
			גיל
414	153	22	בני 65-74
496	177	28	בני +75
			קבוצות אוכלוסייה
449	161	25	יהודים ואחרים ⁽¹⁾
405	183	..	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾
515	163	..	ישראל
444	157	(26)	אסיה
487	116	30	אפריקה
533	183	(30)	אירופה-אמריקה
230	149	(16)	בריה"מ לשעבר ⁽²⁾

מקור: למי"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.8: נשים בנות +65 ובנות +40 אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

שיעורים ל-1,000 נפש

שיעורים ל-1,000 נפש	
298	בנות +65
305	בנות +40
	גיל
382	בנות 65-74
(172)	בנות +75
	קבוצת אוכלוסייה
309	יהודיות ואחרות ⁽¹⁾
(121)	אוכלוסייה ערבית
	יבשת לידה של יהודיות ואחרות ⁽¹⁾
468	ישראל
255	אסיה
230	אפריקה
361	אירופה-אמריקה
222	בריה"מ לשעבר ⁽²⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודיות, נוצריות שאינן ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודיות

לוח 2.9: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה, רופא מומחה או רופא שיניים בשבועיים אחרונים, לפי מין, גיל ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

אחוזים

רופא משפחה ומומחה	רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
18.7	14.9	5.0	6.8	כלל האוכלוסייה
38.3	32.0	9.7	5.9	כלל בני +65
				מין
34.6	28.6	9.2	6.4	גברים
41.2	34.6	10.0	5.5	נשים
				גיל
38.0	31.2	10.4	6.8	בני 65-74
38.9	33.4	8.6	4.5	בני +75
				יבשת לידה של יהודים ואחרים ⁽¹⁾
34.1	24.0	11.1	8.2	ישראל
40.1	35.2	7.4	7.0	אסיה
40.3	36.9	6.3	(4.9)	אפריקה
40.5	32.3	12.3	6.4	אירופה-אמריקה
34.0	29.5	8.4	3.6	בריה"מ לשעבר ⁽²⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.10: ביקורים של בני 65+, של בני 75+ ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא בשנה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

ממוצע לנפש

רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
בני 65+			
11.5	3.6	2.5	סה"כ
10.6	3.4	2.7	גברים
12.1	3.7	2.3	נשים
קבוצות אוכלוסייה			
11.1	3.6	2.5	יהודים ואחרים*
17.2	..	(2.0)	אוכלוסייה ערבית
בני 75+			
11.5	3.0	2.0	סה"כ
10.9	2.7	2.1	גברים
12.0	3.2	2.0	נשים
כלל האוכלוסייה			
5.3	1.8	2.6	סה"כ
4.8	1.4	2.1	גברים
5.7	2.3	3.1	נשים

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.11: ביקורים של בני 65+ אצל רופא מתוך סך הביקורים (של כלל האוכלוסייה), אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000, לפי התמחות הרופא ומין

			אחוזים
נשים	גברים	סה"כ	
10.5	7.3	17.8	סה"כ*
13.0	8.6	21.5	רופא משפחה
11.4	8.0	19.4	רופא מומחה
4.9	4.5	9.4	רופא שיניים

מקור: למ"ס, סקר בריאות, 1999/2000
* לא כולל רופא שיניים

לוח 2.12: בני +65 שדיווחו על בעיות ראייה, שמיעה ולעיסה⁽¹⁾, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
	בעיות לעיסה	בעיות שמיעה	בעיות ראייה
כלל בני +65	31.4	27.9	34.3
מין			
גברים	28.7	31.1	27.6
נשים	33.3	25.5	39.3
גיל			
בני 65-74	29.1	21.7	29.6
בני 75-79	32.8	27.7	35.5
בני +80	36.7	47.5	47.4
קבוצת אוכלוסייה			
יהודים ואחרים ⁽²⁾	30.5	28.0	33.5
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾	34.8	32.4	39.0
אוכלוסייה ערבית	45.0	18.7	44.4
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽²⁾			
ישראל	17.1	17.7	21.3
אסיה-אפריקה	42.0	30.1	42.0
אירופה-אמריקה	27.1	29.1	31.5

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. בעיות ראייה: קשיים בראייה מרחוק ו/או מקרוב (גם כאשר מרכיבים משקפיים)
בעיות שמיעה: קשיים בשמיעה (גם כאשר משתמשים במכשיר שמיעה)
בעיות לעיסה: קשיים באכילה עם שיניים תותבות או בעיות בלעיסה למי שאין להם שיניים תותבות
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.13: בני +65 שדיווחו על אי שליטה על סוגר השתן⁽¹⁾, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
נשים	גברים	סה"כ	
19.3	12.7	16.5	כלל בני +65
גיל			
12.8	8.1	10.8	בני 65-74
19.6	14.2	17.2	בני 75-79
39.1	25.8	33.4	בני 80+
קבוצת אוכלוסייה			
19.7	12.6	16.6	יהודים ואחרים ⁽²⁾
20.2	12.7	17.2	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
13.9	12.6	13.3	אוכלוסייה ערבית
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽²⁾			
9.5	6.5	8.2	ישראל
24.4	17.4	21.2	אסיה-אפריקה
18.9	11.3	15.7	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. קורה שיש להם בריחת שתן או שאינם מספיקים להגיע לשירותים
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.14א: גברים בני 65+ וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן
 אצלם אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה
 אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

שיעורים ל-1,000 נפש

	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה	
יהודים ואחרים*					
	369	368	377	90	יתר-לחץ דם
	211	205	208	35	אוטם שריר הלב
	134	96	111	23	מחלת לב אחרת
	54	7	שבץ מוח
	130	167	152	33	סוכרת
	46	43	אסתמה
	42	15	מחלת ריאה
	109	99	103	31	כיב במערכת העיכול
	59	48	53	9	מחלה ממארת (סרטן)
אוכלוסייה ערבית					
	(172)	282	237	25	יתר-לחץ דם
	..	(173)	(176)	19	אוטם שריר הלב
	(167)	..	(96)	13	מחלת לב אחרת
	(308)	231	263	27	סוכרת

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000
 * כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.14ב: נשים בנות +65 וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן
אצלם אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה
אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

שיעורים ל-1,000 נפש

75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה	
יהודיות ואחרות*				
476	430	449	113	יתר-לחץ דם
109	84	95	16	אוטם שריר הלב
133	98	112	28	מחלת לב אחרת
..	..	39	6	שבץ מוח
143	155	150	37	סוכרת
45	28	58	38	אסתמה
..	..	52	15	מחלת ריאה
104	89	95	29	כיב במערכת העיכול
65	54	58	16	מחלה ממארת (סרטן)
אוכלוסייה ערבית				
444	432	436	41	יתר-לחץ דם
..	(144)	(143)	10	אוטם שריר הלב
..	(135)	(129)	11	מחלת לב אחרת
(248)	345	317	34	סוכרת
..	(141)	(111)	14	כיב במערכת העיכול

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000
* כולל: יהודיות, נוצריות שאין ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.15: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני +65, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2000

סוף שנה

85+	84-80	79-75	74-70	69-65	65+	
						מספרים מוחלטים
1,478	1,548	2,814	3,002	2,642	11,484	סה"כ בני +65
749	784	1,409	1,571	1,352	5,865	גברים
729	764	1,405	1,431	1,290	5,619	נשים
						שיעורים ל-100,000 נפש
2,239	2,121	2,053	1,807	1,462	1,844	סה"כ בני +65
2,949	2,694	2,507	2,238	1,667	2,114	גברים סה"כ
165	134	114	100	80	100	מזה: קיבה
602	564	456	339	242	349	מעיי גס וחלחולת
217	175	222	264	186	215	ריאה
551	498	489	447	374	433	ערמונית
268	285	272	251	143	211	שלפוחית השתן
98	113	116	94	78	92	לימפומה ממארת
94	96	77	74	57	70	ליקמיה
1,823	1,873	1,778	1,514	1,303	1,509	נשים סה"כ
95	76	80	47	30	50	מזה: קיבה
398	387	354	252	187	259	מעיי גס וחלחולת
58	96	99	75	77	79	ריאה
308	395	423	419	416	409	שד
35	41	37	41	30	36	שחלה
105	64	35	41	24	39	שלפוחית השתן
35	78	82	60	67	66	לימפומה ממארת
80	39	39	37	30	38	ליקמיה

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות

לוח 2.16: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני +65, לפי מין
וקבוצת אוכלוסייה, 1996-2000

סוף שנה, שיעורים ל-100,000 נפש

2000	1999	1998	1997	1996	
2,114	2,165	2,175	2,017	1,961	גברים סה"כ
2,177	2,217	2,230	2,068	1,980	יהודים ואחרים* סה"כ
104	98	115	95	88	מזה: קיבה
364	401	378	346	335	מעיי גס וחלחולת
214	222	221	234	196	ריאה
448	451	478	447	412	ערמונית
219	242	239	219	193	שלפוחית השתן
94	102	89	82	85	לימפומה ממארת
71	43	53	50	57	ליקמיה
1,192	1,361	1,352	1,267	1,531	ערבים סה"כ
48	69	30	64	49	מזה: קיבה
124	175	136	129	155	מעיי גס וחלחולת
232	312	289	347	338	ריאה
209	182	225	181	243	ערמונית
95	141	153	118	215	שלפוחית השתן
58	48	51	57	106	לימפומה ממארת
60	21	44	16	36	ליקמיה
1,509	1,508	1,508	1,401	1,438	נשים סה"כ
1,557	1,554	1,554	1,442	1,454	יהודיות ואחרות* סה"כ
52	42	50	50	50	מזה: קיבה
267	273	261	233	244	מעיי גס וחלחולת
83	82	80	74	69	ריאה
428	409	434	396	352	שד
39	40	44	40	43	שחלה
40	47	46	36	37	שלפוחית השתן
67	72	77	56	68	לימפומה ממארת
38	34	29	24	43	ליקמיה
725	743	697	724	985	ערביות סה"כ
27	31	18	47	54	מזה: קיבה
103	96	140	59	108	מעיי גס וחלחולת
19	47	54	35	93	ריאה
121	196	123	109	158	שד
28	25	23	15	45	שלפוחית השתן
42	49	47	56	46	לימפומה ממארת

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.17: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים*
בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2000

סוף שנה

75+	74-70	69-65	65+	
מספרים מוחלטים				
5,622	2,829	2,444	10,895	סה"כ יהודים ואחרים בני +65
2,871	1,496	1,262	5,629	גברים
2,751	1,333	1,182	5,266	נשים
שיעורים ל-100,000 נפש				
גברים				
2,006	2,070	1,690	2,226	ילידי ישראל
2,307	1,696	2,609	2,920	ילידי אירופה-אמריקה
1,870	1,646	1,846	2,229	ילידי אסיה
1,877	1,443	1,903	2,500	ילידי אפריקה
נשים				
1,561	1,768	1,347	1,467	ילידות ישראל
1,662	1,329	1,885	1,937	ילידות אירופה-אמריקה
1,160	994	978	1,590	ילידות אסיה
1,877	1,056	1,060	1,481	ילידות אפריקה

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.18: אומדן בני 65+ יהודים ואחרים⁽¹⁾ הסובלים מדמנטיה, 2002

סוף שנה

במוסדות ⁽²⁾	בקהילה	סה"כ	
18.7	98.1	116.8	אלפים
16.0	84.0	100.0	אחוזים
69.8	16.7	19.0	אחוז מתוך האוכלוסייה המתאימה

מקור: ברודסקי, ג'; ורטמן, א'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2004, קשישים הסובלים מדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, גוינט-מכון ברוקדייל (בהכנה)

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת (ראו מבוא)
2. כולל: בתי אבות, בתי חולים לחולים כרוניים ומחלקות סיעודיות

לוח 2.19: אומדן בני +65 יהודים ואחרים⁽¹⁾ גרים בקהילה אשר סובלים מדמנטיה, לפי חומרת המחלה, גיל ומין, 2002

סוף שנה

רמת החומרה של המחלה				סה"כ חולים	
קשה	בינונית	קלה	סה"כ ⁽²⁾		
27.5	22.1	43.2	92.9	98.1	אלפים
					אחוזים
מתוך החולים בדמנטיה				מתוך האוכלוסייה המתאימה	גיל
30.0	24.0	47.0	100.0	16.7	בני +65
34.0	28.0	39.0	100.0	23.8	בני +75
27.0	9.0	64.0	100.0	9.7	69-65
18.0	22.0	59.0	100.0	12.6	74-70
41.0	23.0	36.0	100.0	19.2	79-75
12.0	42.0	47.0	100.0	17.4	84-80
39.0	24.0	37.0	100.0	46.6	בני +85
					מין
28.0	28.0	44.0	100.0	13.6	גברים
31.0	22.0	48.0	100.0	19.0	נשים

מקור: ברודסקי, ג'; ורטמן, א'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2004, קשישים הסובלים מדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, ג'וינט-מכון ברוקדייל (בהכנה)

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת (ראו מבוא)
2. הנתונים לגבי חומרת המחלה מתייחסים ל-95% מבני +65 הגרים בקהילה שעבורם התקבל דיווח בנוגע לכך

לוח 2.20: מידת היכולת של בני +65 ללכת (להסתובב) מחוץ לבית מרחק של 400 מ', לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים

מסוגל בעזרת אדם אחר או יושב בכיסא גלגלים	מסוגל בעזרת מכשיר (מקל, הליכון)	מסוגל ללא עזרת אדם או מכשיר	סה"כ		
12.4	7.4	7.2	73.0	100.0	סה"כ בני +65
					מין
9.2	5.2	7.3	78.3	100.0	גברים
14.9	9.0	7.1	68.9	100.0	נשים
					גיל
7.3	4.7	4.1	83.9	100.0	בני 65-74
12.9	7.9	9.5	69.7	100.0	בני 75-79
27.8	15.0	14.5	42.6	100.0	בני 80+
					קבוצת אוכלוסייה
11.7	6.9	6.7	74.6	100.0	יהודים ואחרים ⁽¹⁾
10.9	9.7	6.7	72.7	100.0	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽²⁾
23.6	15.0	14.4	47.0	100.0	אוכלוסייה ערבית
					יבשת לידה של יהודים ואחרים ⁽¹⁾
7.1	..	(3.2)	87.2	100.0	ישראל
18.0	7.0	8.3	66.8	100.0	אסיה-אפריקה
9.6	7.4	6.5	76.5	100.0	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.21: מידת יכולתם של בני 65+ לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים

	להתקלח או להתרחץ				להתלבש			
	יכול לא	יכול אך קשה	יכול ללא קושי	סה"כ	יכול לא	יכול אך קשה	יכול ללא קושי	סה"כ
סה"כ בני 65+	10.6	13.3	76.1	100.0	6.2	13.8	80.0	100.0
מין								
גברים	7.8	11.1	81.1	100.0	5.6	11.6	82.8	100.0
נשים	12.8	14.9	72.3	100.0	6.6	15.5	77.8	100.0
גיל								
בני 65-74	4.8	10.1	85.0	100.0	3.2	9.6	87.2	100.0
בני 75-79	9.3	14.0	76.7	100.0	6.0	14.0	80.0	100.0
בני 80+	29.7	22.3	48.0	100.0	15.7	26.5	57.8	100.0
קבוצת אוכלוסייה								
יהודים ואחרים ⁽¹⁾	9.8	13.0	77.3	100.0	5.2	13.6	81.2	100.0
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽²⁾	12.8	13.3	73.9	100.0	5.2	13.7	81.1	100.0
אוכלוסייה ערבית	24.0	18.3	57.7	100.0	22.4	17.1	60.5	100.0
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾								
ישראל	(3.1)	(5.9)	91.1	100.0	..	(6.9)	90.7	100.0
אסיה-אפריקה	12.8	16.7	70.5	100.0	8.6	17.7	73.7	100.0
אירופה-אמריקה	9.2	12.2	78.6	100.0	4.0	12.7	83.4	100.0

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.21: מידת יכולתם של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים

	להיכנס למיטה ולצאת ממנה				לאכול				
	יכול לא יכול	יכול אך קשה	יכול ללא קושי	סה"כ	יכול לא יכול	יכול אך קשה	יכול ללא קושי	סה"כ	
	3.7	14.4	81.9	100.0	2.5	5.5	92.0	100.0	סה"כ בני +65
	מין								
גברים	3.2	10.5	86.4	100.0	1.9	4.1	94.0	100.0	
נשים	4.0	17.5	78.5	100.0	2.9	6.6	90.5	100.0	
	גיל								
בני 65-74	2.1	9.7	88.1	100.0	1.7	2.9	95.5	100.0	
בני 75-79	2.5	14.9	82.6	100.0	1.9	4.8	93.3	100.0	
בני 80+	9.7	28.4	61.9	100.0	5.7	14.2	80.0	100.0	
	קבוצת אוכלוסייה								
יהודים ואחרים ⁽¹⁾	2.8	14.4	82.7	100.0	1.8	5.1	93.1	100.0	
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽²⁾	2.8	17.1	80.1	100.0	2.4	5.1	92.5	100.0	
אוכלוסייה ערבית	17.2	14.4	68.3	100.0	13.1	12.3	74.6	100.0	
	יבשת לידה של יהודים ואחרים*								
ישראל	..	8.2	91.0	100.0	97.1	100.0	
אסיה-אפריקה	5.0	19.1	75.9	100.0	2.8	7.1	90.1	100.0	
אירופה-אמריקה	2.1	13.2	84.7	100.0	1.5	4.5	93.9	100.0	

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.21ג: מידת יכולתם של בני +65 לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים

לנוע (להסתובב) בתוך הבית		להתיישב על כיסא ולקום ממנו					
לא יכול	יכול ⁽³⁾	סה"כ	לא יכול	יכול אך קשה	יכול ללא קושי	סה"כ	
4.2	95.8	100.0	3.8	14.6	81.7	100.0	סה"כ בני +65
							מין
3.9	96.1	100.0	3.1	10.8	86.1	100.0	גברים
4.5	95.5	100.0	4.3	17.5	78.3	100.0	נשים
							גיל
2.2	97.8	100.0	2.2	9.2	88.6	100.0	בני 65-74
4.0	96.0	100.0	2.9	17.0	80.1	100.0	בני 75-79
10.8	89.2	100.0	9.4	28.6	62.0	100.0	בני +80
							קבוצת אוכלוסייה
3.2	96.8	100.0	2.8	14.6	82.6	100.0	יהודים ואחרים ⁽¹⁾
4.1	95.9	100.0	3.6	13.3	83.1	100.0	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽²⁾
20.4	79.6	100.0	18.8	13.8	67.4	100.0	אוכלוסייה ערבית
							יבשת לידה של יהודים ואחרים*
..	99.0	100.0	..	8.1	91.2	100.0	ישראל
4.8	95.2	100.0	4.6	19.7	75.7	100.0	אסיה-אפריקה
2.8	97.2	100.0	2.3	13.2	84.5	100.0	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך
3. עם או בלי מכשיר (כגון מקל או הליכון)

לוח 2.22: אומדן בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות
(ADL)⁽¹⁾, 2002

סוף שנה, אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
18.6	11.6	15.7	כלל בני 65+
			גיל
7.8	4.8	6.5	בני 65-74
14.2	10.8	12.8	בני 75-79
46.7	30.1	40.0	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
17.4	11.0	14.7	יהודים ואחרים ⁽²⁾
18.9	10.0	15.5	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
39.3	20.1	30.5	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים ⁽²⁾
20.7	14.2	17.8	אסיה-אפריקה
16.2	9.7	13.5	אירופה-אמריקה וישראל

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997;

באר ש'. 2003. מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך 1999-2000 ומגמות

בדפוס המיסוד של הקשישים בתקופה 1983-2000, דמ-429-04, ג'וינט-מכון ברוקדייל

1. כולל שתי אוכלוסיות:

(א) קשישים הגרים בקהילה הזקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה,

הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, ניידות בתוך הבית;

(ב) קשישים דיירי מוסדות לטיפול ממושך: תשושים סיעודיים ותשושי נפש. בשנתון הקודם

(2001) התייחסו הנתונים לאוכלוסייה הראשונה בלבד

2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)

3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.23: אומדן בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות
(ADL), 1990-2002

סוף שנה

אחוז המוגבלים מתוך בני 65+ ⁽¹⁾	אחוזים	אלפים	
			1990
13.2	100.0	58.3	סה"כ מוגבלים
11.0	80.1	46.7	בקהילה ⁽²⁾
67.2	19.9	11.6	במוסדות לטיפול ממושך ⁽³⁾
			1999
14.5	100.0	88.4	סה"כ מוגבלים
11.8	78.1	69.0	בקהילה ⁽²⁾
77.7	21.9	19.4	במוסדות לטיפול ממושך ⁽³⁾
			2002
15.7	100.0	102.6	סה"כ מוגבלים
12.4	75.9	77.9	בקהילה ⁽²⁾
90.7	24.1	24.7	במוסדות לטיפול ממושך ⁽³⁾

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997;

באר ש'. 2003. מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך 1999-2000 ומגמות

בדפוסי המיסוד של הקשישים בתקופה 1983-2000, דמ-429-04, גוינט-מכון ברוקדייל

1. מתוך האוכלוסייה המתאימה
2. זקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, נידות בתוך הבית
3. דיירים תשושים, סיעודיים ותשושי נפש

לוח 2.24: בני +65 בקהילה אשר נפלו במהלך חצי השנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
נשים	גברים	סה"כ	
23.9	14.0	19.6	כלל בני +65
גיל			
19.8	9.0	15.1	בני 65-74
26.5	15.6	21.7	בני 75-79
33.7	27.9	31.2	בני +80
קבוצת אוכלוסייה			
24.4	14.3	20.1	יהודים ואחרים ⁽¹⁾
23.4	10.3	18.3	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽²⁾
15.0	8.1	11.8	אוכלוסייה ערבית
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾			
18.9	12.8	16.2	ישראל
30.6	19.6	25.6	אסיה-אפריקה
22.5	12.1	18.2	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.25: בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין והנפגע, 2002

מספרים מוחלטים

פצועים קשה	פצועים קל	הרוגים	סה"כ	
				בני 65+
303	1,469	102	1,874	סה"כ
149	884	61	1,094	גברים
154	585	41	780	נשים
				בני 65-74
160	966	40	1,166	סה"כ
76	593	24	693	גברים
84	373	16	473	נשים
				בני 75+
143	503	62	708	סה"כ
73	291	37	401	גברים
70	212	25	307	נשים
				בני 65+ לפי הנפגע
213	399	66	678	הולך רגל
36	549	8	593	נהג רכב
43	467	22	532	נוסע ברכב
11	54	6	71	אחר

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

לוח 2.26: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2002

שיעורים ל-100,000 נפש

פצועים קשה	פצועים קל	הרוגים	סה"כ	
בני +65				
47	227	16	290	סה"כ
54	321	22	397	גברים
41	157	11	210	נשים
בני 65-74				
45	271	11	327	סה"כ
48	375	15	438	גברים
42	188	8	238	נשים
בני +75				
49	173	21	244	סה"כ
62	248	32	342	גברים
40	122	14	177	נשים
קבוצת אוכלוסייה				
46	224	16	286	יהודים ואחרים*
53	256	18	327	אוכלוסייה ערבית
כלל האוכלוסייה				
37	537	8	581	סה"כ
49	680	12	742	גברים
25	397	4	426	נשים

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים
 * כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
 הערה: בשנתון הקשישים 2002 נפלה טעות בנתוני בני +65

לוח 2.27: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש

מזה: הרוגים		סה"כ נפגעים		
כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	
9	24	442	378	1985
9	23	594	459	1990
9	23	818	408	1996
9	21	814	385	1997
9	21	826	379	1998
8	18	743	363	1999
8	12	584	219	2001
8	16	581	290	2002

מקור: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.28: נהגים בני +65 וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2002

תאונות				
קלות	קשות	קטלניות	סה"כ	
				מספרים מוחלטים
1,311	122	30	1,463	סה"כ בני +65
				גיל
937	84	19	1,040	בני 65-74
374	38	11	423	בני 75+
				מין
1,145	112	27	1,284	גברים
166	10	3	179	נשים
				כלל הנהגים⁽¹⁾
31,714	3,009	722	35,445	סה"כ
23,530	2,514	644	26,688	גברים
7,101	433	66	7,600	נשים
				שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾
				בני +65
76	7	2	85	סה"כ
89	9	2	100	גברים
38	2	1	41	נשים
				כלל הנהגים
112	11	3	125	סה"כ
136	15	4	155	גברים
65	4	1	69	נשים

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מצבת הנהגים בישראל

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2000 ובסוף 2001

לוח 2.29: בני +65 אשר אושפזו בשנה האחרונה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
22.1	25.7	23.7	כלל בני +65
			גיל
18.8	23.9	21.0	בני 65-74
27.2	28.5	27.0	בני +75
			קבוצת אוכלוסייה
21.7	25.2	23.2	יהודים ואחרים ⁽¹⁾
28.9	34.6	31.4	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים ⁽¹⁾
15.6	20.4	17.8	ישראל
22.1	26.5	24.1	אסיה
25.7	27.9	26.7	אפריקה
23.5	25.8	24.5	אירופה-אמריקה
18.8	23.7	20.7	בריה"מ לשעבר ⁽²⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.30: אשפוזים של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות כלליות⁽¹⁾, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

2001	2000 ⁽²⁾	1995	1990	
				בני +65
541.9	528.8	482.5	407.0	סה"כ
622.9	610.7	567.4	470.9	גברים
481.9	468.1	418.1	354.3	נשים
				בני 65-74
429.0	420.6	402.1	342.2	סה"כ
503.3	496.8	478.7	400.8	גברים
370.3	361.1	342.9	294.3	נשים
				בני +75
682.0				סה"כ
784.9				גברים
611.9				נשים
				בני 75-84
627.2	610.8	572.7	477.4	סה"כ
723.2	709.5	673.0	548.1	גברים
559.9	540.6	498.8	419.3	נשים
				בני +85
861.0	842.4	716.9	586.4	סה"כ
1,002.4	959.4	825.7	671.2	גברים
773.5	768.4	638.3	520.5	נשים
				כלל האוכלוסייה
154.8	150.7	144.1	123.3	סה"כ
154.1	150.8	142.0	121.8	גברים
155.5	150.6	145.7	124.8	נשים

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים";

למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

1. לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות
2. הנתונים משנת 2000 ואילך הם אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות, ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז הכללי בישראל ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)

לוח 2.31: אשפוזים של בני 65+ במחלקות כלליות⁽¹⁾ מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

אחוזים					
	2001	⁽²⁾ 2000	1995	1990	
					בני 65+
	34.3	34.3	31.9	30.0	סה"כ
	34.7	34.2	33.1	31.8	גברים
	35.0	34.5	30.9	28.2	נשים
					בני 75+
	19.3	19.0	15.9	15.4	סה"כ
	18.7	18.1	16.1	16.1	גברים
	20.6	19.9	15.8	14.7	נשים
					בני 85+
	5.7	5.8	4.1	3.0	סה"כ
	5.3	5.2	4.0	3.1	גברים
	6.4	6.4	4.1	3.0	נשים

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

1. לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות
2. הנתונים משנת 2000 ואילך הם אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות, ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז הכללי בישראל ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)

לוח 2.32: בני +65 מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות

אחוזים

2001	2000 ⁽¹⁾	1995	1990	
34.3	34.3	31.9	30.0	כלל המחלקות הכלליות ⁽²⁾
58.3	58.4	57.9	55.2	פנימית
45.8	45.8	48.0	46.4	ריאות
96.2	95.9	91.8	79.4	גריאטרייה אקוטית
32.7	34.1	34.9	33.7	נירולוגיה
35.9	38.2	38.0	38.5	אונקולוגיה
32.3	32.1	33.7	31.1	עור ומין
48.1	47.0	47.2	43.8	טיפול נמרץ כללי
50.3	50.1	45.3	44.4	טיפול נמרץ לב
71.8	73.9	52.7	47.2	טיפול נמרץ נשימתי
26.8	27.1	27.5	26.2	כירורגייה כללית
33.0	32.4	30.0	25.2	אורתופדיה
40.8	40.4	40.4	41.7	אורולוגיה
27.9	28.8	22.6	23.7	נירוכירורגייה
48.0	47.5	43.8	36.4	כירורגייה חזה ולב
57.1	56.1	49.4	45.8	כירורגייה כלי דם
29.2	28.3	15.1	22.0	כירורגייה פלסטית
60.1	58.4	55.5	56.4	עיניים
12.5	12.9	10.6	10.0	אף-אוזן-גרון
12.9	11.8	14.8	15.1	פה ולסת
4.5	4.1	5.5	4.0	נשים
33.8	36.3	38.9	39.7	השהיה

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

- הנתונים משנת 2000 ואילך הם אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות, ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז הכללי בישראל ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
- לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות

לוח 2.33: התפלגות האשפוזים בקרב בני +65 במחלקות כלליות, לפי מין, 2001⁽¹⁾

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	סה"כ מחלקות כלליות ⁽²⁾
55.4	53.4	53.5	פנימית
0.4	0.5	0.4	ריאות
5.3	3.8	4.3	גריאטרייה אקוטית
1.3	1.6	1.5	נירולוגיה
0.8	1.0	1.1	אונקולוגיה
0.4	0.4	0.4	עור ומין
1.2	1.5	1.5	טיפול נמרץ כללי
2.7	4.2	3.5	טיפול נמרץ לב
0.2	0.1	0.1	טיפול נמרץ נשימתי
12.2	12.2	12.0	כירורגייה כללית
6.2	3.3	4.9	אורתופדיה
1.2	5.8	3.5	אורולוגיה
0.4	0.5	0.5	נירוכירורגייה
1.2	2.0	1.6	כירורגייה חזה ולב
0.9	1.8	1.4	כירורגייה כלי דם
0.5	0.8	0.7	כירורגייה פלסטית
5.6	4.4	4.9	עיניים
0.9	1.1	1.0	אף-אוזן-גרון
0.1	0.1	0.1	פה ולסת
2.1	0.0	1.1	נשים
1.6	1.3	2.0	השהיה

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"
 1. הנתונים הם אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל במשרד הבריאות ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות
 2. לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות

לוח 2.34: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי, 2001⁽¹⁾

ימים

כלל האוכלוסייה			בני +65			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
4.3	4.5	4.4	5.9	5.6	5.8 ⁽²⁾	כלל המחלקות הכלליות
4.6	4.2	4.4	5.2	4.8	5.0	פנימית
9.9	11.2	10.6	11.6	10.0	10.7	ריאות
12.1	11.3	11.8	12.0	11.1	11.6	גריאטרייה אקוטית
6.1	6.1	6.3	8.4	7.7	8.4	נירולוגיה
5.6	4.8	5.1	6.4	5.1	5.6	אונקולוגיה
7.8	7.4	8.0	9.2	9.2	9.3	עור ומין
6.3	7.9	10.1	5.7	6.0	5.9	השתלת מוח עצם
6.0	5.9	6.1	6.7	6.5	6.7	טיפול נמרץ כללי
2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	טיפול נמרץ לב
8.4	7.5	7.9	8.8	8.0	8.4	טיפול נמרץ נשימתי
3.0	3.1	3.1	5.0	4.5	4.8	כירורגייה כללית
6.2	5.0	5.7	8.2	8.0	8.2	אורתופדיה
4.9	4.6	4.6	5.6	5.6	5.6	אורולוגיה
7.6	7.1	7.5	8.6	8.5	9.1	נירוכירורגייה
7.0	6.5	6.8	8.0	7.3	7.6	כירורגייה חזה ולב
4.8	5.3	5.4	5.7	5.4	5.8	כירורגייה כלי דם
6.8	7.0	6.4	8.3	7.0	7.0	כירורגייה פלסטית
2.5	2.8	2.6	2.4	2.5	2.4	עיניים
3.1	3.1	3.1	4.4	4.4	4.5	אף-אוזן-גרון
3.7	3.8	3.8	4.2	3.9	4.1	פה ולסת
2.5	1.4	2.5	4.5	0.0	4.6	נשים
1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	השהיה

- מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"
1. הנתונים הם אומדן המבוסס על נתוני "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל במשרד הבריאות ואשר כולל כ-90% מכלל האשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות
 2. לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות

לוח 2.35: בני 65+ וכלל האוכלוסייה הממתינים לאשפוז, לפי משך ההמתנה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

סה"כ	עד חודש	2-1 חודשים	3 חודשים ויותר	
אלפים				
16.7	7.1	(2.6)	6.6	כלל בני 65+
50.0	18.2	10.7	19.8	כלל האוכלוסייה
שיעורים ל-1,000 נפש				
29.0	12.0	(5.0)	11.0	כלל בני 65+
9.0	3.0	2.0	3.0	כלל האוכלוסייה

מקור: מ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

לוח 2.36: בני +65 וכלל האוכלוסייה המאושפזים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2001

סוף שנה, מספרים מוחלטים

נשים	גברים	סה"כ	
34	29	63	בני +65
28	24	52	בני 65-74
4	5	9	בני 75-84
2	0	2	בני +85
460	583	1,043	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.37: בני +65 וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2001

סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
מספרים מוחלטים			
516	353	869	כלל בני +65
289	254	543	בני 74-65
185	83	268	בני 84-75
42	16	58	בני +85
1,989	3,082	5,071	כלל האוכלוסייה
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
1.4	1.3	1.4	כלל בני +65
1.5	1.6	1.5	בני 74-65
1.4	0.9	1.2	בני 84-75
1	0.6	0.9	בני +85
0.6	1	0.8	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.38: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים בכלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים

נבחרות

סוף שנה, שיעורים ל-1,000 נפש

2001	2000	1999	1998	1997	1990	
						כלל בני 65+
1.4	1.5	2.0	2.3	2.5	3.5	סה"כ
1.3	1.4	1.9	2.1	2.3	3.1	גברים
1.4	1.5	2.0	2.4	2.6	3.9	נשים
						בני 65-74
1.5	1.7	2.1	2.5	2.7	3.6	סה"כ
1.6	1.7	2.3	2.5	2.7	3.7	גברים
1.5	1.6	2.0	2.4	2.7	3.5	נשים
						בני 75-84
1.2	1.3	1.8	2.0	2.2	3.6	סה"כ
0.9	1.0	1.5	1.7	1.8	2.3	גברים
1.4	1.5	2.0	2.3	2.5	4.5	נשים
						בני 85+
0.9	1.0	1.6	1.9	2.0	3.1	סה"כ
0.6	0.6	1.2	1.4	1.1	1.8	גברים
1.0	1.2	1.9	2.2	2.5	4.0	נשים
						כלל האוכלוסייה
0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	1.8	סה"כ
1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	2.1	גברים
0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.5	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.39: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

2001	2000	1999	1998	1997	1996	1990	
							כלל בני 65+
1,751	1,867	1,814	1,983	1,869	1,815	1,412	סה"כ
636	641	643	674	652	611	526	גברים
1,115	1,226	1,171	1,309	1,217	1,204	886	נשים
							בני 74-65
1,062	1,117	1,111	1,272	1,246	1,177	892	סה"כ
401	408	391	442	440	372	321	גברים
661	709	720	830	806	805	571	נשים
							בני 84-75
587	621	568	594	498	546	467	סה"כ
195	186	179	171	157	196	181	גברים
392	435	389	423	341	350	286	נשים
							בני 85+
102	129	135	117	125	92	53	סה"כ
40	47	73	61	55	43	24	גברים
62	82	62	56	70	49	29	נשים
							כלל האוכלוסייה
17,869	18,172	17,640	17,210	16,181	15,154	12,262	סה"כ
10,594	10,632	10,350	9,971	9,331	8,521	6,788	גברים
7,275	7,540	7,290	7,239	6,850	6,633	5,474	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.40: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2001

בני +85	בני 75-84	בני 65-74	בני +65	
מספרים מוחלטים				
102	587	1,062	1,751	סה"כ קבלות
14	160	445	619	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
2	4	17	23	הפרעות פסיכוטיות חריפות
20	243	405	668	הפרעות אפקטיביות
54	142	103	299	הפרעות אורגניות
4	23	41	68	הפרעות נירוטיות
2	7	23	32	הפרעות אישיות
2	3	8	13	סמים ואלכוהול
0	0	7	7	פיגור שכלי
3	4	11	18	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
1	1	2	4	לא רשום/לא ידוע
אחוזים				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ קבלות
13.7	27.3	41.9	35.4	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
2.0	0.7	1.6	1.3	הפרעות פסיכוטיות חריפות
19.6	41.4	38.1	38.1	הפרעות אפקטיביות
52.9	24.2	9.7	17.1	הפרעות אורגניות
3.9	3.9	3.9	3.9	הפרעות נירוטיות
2.0	1.2	2.2	1.8	הפרעות אישיות
2.0	0.5	0.8	0.7	סמים ואלכוהול
0.0	0.0	0.7	0.4	פיגור שכלי
2.9	0.7	1.0	1.0	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
1.0	0.2	0.2	0.2	לא רשום/לא ידוע

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.41: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2001

נשים	גברים	סה"כ	
			מספרים מוחלטים
298	213	511	כלל בני 65+
139	102	241	בני 74-65
118	81	199	בני 84-75
41	30	71	בני 85+
1,774	2,458	4,232	כלל האוכלוסייה
			שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה
0.8	0.8	0.8	כלל בני 65+
0.7	0.7	0.7	בני 74-65
0.9	0.9	0.9	בני 84-75
1.0	1.2	1.1	בני 85+
0.5	0.8	0.7	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.42: פטירות של בני +65, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2001

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

אוכלוסייה ערבית			⁽¹⁾ יהודים ואחרים			סה"כ			
סה"כ גברים	נשים	נשים	סה"כ גברים	נשים	נשים	סה"כ גברים	נשים	נשים	
בני +65									
43.8	56.1	49.5	41.4	50.9	45.4	41.6	51.2	45.7	שיעורים גולמיים
54.3	62.3	58.3	39.5	52.7	46.1	40.3	53.2	46.7	שיעורים מתוקננים ⁽²⁾
19.4	28.0	23.4	11.4	19.8	15.2	12.0	20.4	15.8	בני 65-69
33.6	45.2	38.7	20.2	30.8	24.8	21.0	31.7	25.6	בני 70-74
83.5	98.3	90.5	70.0	85.1	76.1	70.6	85.8	76.7	בני +75
51.0	74.6	61.1	34.5	50.1	40.8	35.2	51.2	41.6	בני 75-79
93.9	86.2	90.3	68.0	79.9	73.0	69.1	80.2	73.8	בני 80-84
165.4	148.3	155.5	145.1	174.3	155.9	145.8	172.6	156.0	בני +85

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. אוכלוסיית התקן היא סך כל האוכלוסייה הממוצעת (גברים ונשים) בשנת 2001 לפי קבוצת גיל

לוח 2.43: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
1998			
66.8	69.3	68.0	בני +65
71.6	68.8	71.6	בני 65-74
65.4	69.6	67.3	בני +75
70.8	57.4	62.4	בני 0-64
67.5	66.1	66.8	כלל האוכלוסייה
1999			
67.7	69.7	68.6	בני +65
70.0	69.9	70.0	בני 65-74
67.0	69.6	68.2	בני +75
71.1	56.5	62.1	בני 0-64
68.3	66.2	67.2	כלל האוכלוסייה
2000			
67.3	69.8	68.5	בני +65
71.6	69.8	70.6	בני 65-74
66.1	69.8	67.8	בני +75
69.4	55.8	60.8	בני 0-64
67.6	65.9	66.8	כלל האוכלוסייה
2001			
66.7	68.6	67.6	בני +65
70.3	68.7	69.4	בני 65-74
65.7	68.5	67.0	בני +75
68.8	52.8	58.8	בני 0-64
67.0	64.3	65.6	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות
* כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

לוח 2.44: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני +65, לפי גיל, מין ויבשת
לידה, 2001

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

בני +75	בני 65-74	בני +65	
			גברים ונשים
76	20	45	כלל הגברים והנשים ⁽²⁾
73	18	38	אסיה
84	23	43	אפריקה
74	18	46	אירופה-אמריקה
72	22	43	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
			גברים
86	25	51	כלל הגברים ⁽²⁾
81	23	44	אסיה
92	27	49	אפריקה
83	22	51	אירופה-אמריקה
80	28	47	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
			נשים
70	16	41	כלל הנשים ⁽²⁾
67	13	33	אסיה
77	19	39	אפריקה
69	14	42	אירופה-אמריקה
68	17	41	מזה: עולות בריה"מ לשעבר ⁽³⁾

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל ילידי ישראל ויבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.45: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 1999

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני +65			סה"כ
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
595	623	609	4,503	5,427	4,896	סה"כ
18	18	18	144	167	153	מחלות זיהומיות
139	143	141	885	1,229	1,032	שאתות ממאירות
40	33	37	326	320	323	סוכרת
15	9	12	130	90	113	יתר לחץ-דם
27	32	29	225	298	256	אוטם חריף של שריר הלב
60	71	65	526	709	604	מחלת לב איסכמית אחרת
37	34	36	307	323	314	מחלות לב אחרות
41	34	38	342	346	344	מחלות של כלי דם במוח
7	8	7	60	82	69	מחלות אחרות של מחזור הדם
10	11	10	88	105	95	דלקת ריאות
13	14	13	109	142	124	יתר מחלות מערכת הנשימה
5	7	6	37	51	43	מחלות כבד
14	17	15	116	174	140	מחלות כליה
26	37	31	186	262	218	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
110	99	105	894	969	926	כל המחלות האחרות*
5	12	8	14	32	22	תאונות דרכים
2	10	6	8	19	13	פגיעה עצמית מכוונת
15	26	20	105	106	106	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: מ"ס שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד

* כולל: מומים מולדים וסיבות סב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בני +65

לוח 2.46: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי גיל, 1999

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות במספרים מוחלטים
בני 85+	בני 75-84	בני 65-74	בני 65+	האוכלוסייה	
10,283	11,269	7,630	29,182	37,290	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3.2	3.2	2.9	3.1	3.0	מחלות זיהומיות
13.3	22.3	30.0	21.1	23.2	שאתות ממאירות
5.3	6.6	8.3	6.6	6.0	סוכרת
2.9	2.3	1.5	2.3	2.0	יתר לחץ-דם
5.1	5.5	5.1	5.2	4.8	אוטם חריף של שריר הלב
14.2	12.3	9.9	12.3	10.7	מחלת לב איסכמית אחרת
7.4	6.4	5.1	6.4	5.8	מחלות לב אחרות
7.1	7.5	6.2	7.0	6.2	מחלות של כלי דם במוח
1.6	1.3	1.3	1.4	1.2	מחלות אחרות של מחזור הדם
2.8	1.7	1.1	1.9	1.7	דלקת ריאות
3.0	2.4	2.0	2.5	2.2	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.5	0.8	1.5	0.9	1.0	מחלות כבד
3.1	2.8	2.5	2.9	2.5	מחלות כליה
4.1	4.2	5.3	4.5	5.2	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
23.4	17.8	14.4	18.9	17.2	כל המחלות האחרות*
0.3	0.5	0.7	0.4	1.4	תאונות דרכים
0.1	0.3	0.4	0.3	1.0	פגיעה עצמית מכוונת
2.6	2.1	1.6	2.2	3.4	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: מ"ס שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד

* כולל: מומים מולדים וסיבות סב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בני 65+

לוח 2.46: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי גיל, 1999

	קבוצת גיל			בני 65+	כלל האוכלוסייה	
	בני 85+	בני 84-75	בני 74-65			
	4,389	5,320	4,134	13,843	18,835	סה"כ פטירות במספרים מוחלטים
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
	3.4	3.2	2.5	3.1	2.9	מחלות זיהומיות
	15.0	23.8	29.4	22.6	23.0	שאתות ממאירות
	5.0	5.8	7.0	5.9	5.3	סוכרת
	2.1	1.6	1.2	1.7	1.4	יתר לחץ-דם
	5.4	5.7	5.3	5.5	5.1	אוטם חריף של שריר הלב
	14.5	13.2	11.3	13.1	11.4	מחלת לב איסכמית אחרת
	6.7	5.9	5.2	5.9	5.5	מחלות לב אחרות
	6.2	6.6	6.3	6.4	5.5	מחלות של כלי דם במוח
	1.7	1.4	1.4	1.5	1.3	מחלות אחרות של מחזור הדם
	2.9	1.8	1.0	1.9	1.8	דלקת ריאות
	3.0	2.7	2.1	2.6	2.2	יתר מחלות מערכת הנשימה
	0.5	0.8	1.6	0.9	1.1	מחלות כבד
	3.8	3.2	2.6	3.2	2.7	מחלות כליה
	4.2	4.2	6.3	4.8	5.9	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
	22.6	17.3	13.5	17.9	15.9	כל המחלות האחרות*
	0.4	0.7	0.8	0.6	1.9	תאונות דרכים
	0.1	0.5	0.4	0.3	1.6	פגיעה עצמית מכוונת
	2.3	1.7	1.9	2.0	4.2	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: מ"ס שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד

* כולל: מומים מולדים וסיבות סב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בני 65+

לוח 2.46: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי גיל, 1999

קבוצת גיל					סה"כ פטירות במספרים מוחלטים	אחוזים
בנות 85+	בנות 84-75	בנות 74-65	בנות 65+	כלל האוכלוסייה		
5,894	5,949	3,496	15,339	18,455		
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
3.0	3.3	3.4	3.2	3.0	מחלות זיהומיות	
12.0	21.0	30.7	19.7	23.4	שאתות ממאירות	
5.6	7.3	10.0	7.2	6.7	סוכרת	
3.5	2.9	1.8	2.9	2.5	יתר לחץ-דם	
4.9	5.3	4.7	5.0	4.5	אוטם חריף של שריר הלב	
13.9	11.4	8.2	11.7	10.1	מחלת לב איסכמית אחרת	
7.8	6.8	5.0	6.8	6.2	מחלות לב אחרות	
7.7	8.3	6.1	7.6	6.9	מחלות של כלי דם במוח	
1.6	1.2	1.1	1.3	1.2	מחלות אחרות של מחזור הדם	
2.8	1.5	1.2	1.9	1.7	דלקת ריאות	
2.9	2.2	1.9	2.4	2.2	יתר מחלות מערכת הנשימה	
0.4	0.9	1.4	0.8	0.8	מחלות כבד	
2.7	2.5	2.5	2.6	2.4	מחלות כליה	
4.1	4.2	4.1	4.1	4.4	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	
24.0	18.2	15.5	19.9	18.5	כל המחלות האחרות*	
0.2	0.3	0.6	0.3	0.8	תאונות דרכים	
0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	פגיעה עצמית מכוונת	
2.8	2.5	1.3	2.3	2.5	כל הסיבות החיצוניות האחרות	

מקור: מ"ס שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד

* כולל: מומים מולדים וסיבות סב-לידתיות אחרות שאינן רלוונטיות לאוכלוסיית בני 65+

לוח 2.47: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +65 בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

בני +75	בני 65-74	בני +65	כלל האוכלוסייה
נובמבר 1997			
100.0	100.0	100.0	100.0
78.9	75.8	77.1	58.6
10.2	11.9	11.2	21.1
6.6	7.6	7.2	10.1
4.3	4.7	4.5	10.3
נובמבר 1998			
100.0	100.0	100.0	100.0
78.0	74.8	76.2	58.0
10.8	12.6	11.8	21.7
6.7	7.7	7.3	9.9
4.5	4.9	4.7	10.3
נובמבר 1999			
100.0	100.0	100.0	100.0
77.2	73.5	75.1	57.2
11.4	13.6	12.6	22.4
6.9	7.8	7.4	10.0
4.6	5.2	4.9	10.5
נובמבר 2000			
100.0	100.0	100.0	100.0
76.4	72.0	73.9	56.3
11.9	14.6	13.4	23.1
7.0	7.9	7.5	9.9
4.8	5.5	5.2	10.7

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.47: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים,
לפי גיל, שנים נבחרות (המשך)

אחוזים

כלל האוכלוסייה בני 65+				
בני 75+	בני 65-74	בני 65+		
נובמבר 2001				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
75.5	70.8	72.9	55.6	שירותי בריאות כללית
12.5	15.5	14.1	23.5	מכבי שירותי בריאות
7.1	7.9	7.5	10.0	קופת חולים לאומית
4.9	5.8	5.4	10.9	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2002				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
74.9	69.4	71.9	55.2	שירותי בריאות כללית
12.9	16.4	14.8	23.7	מכבי שירותי בריאות
7.1	8.0	7.6	10.0	קופת חולים לאומית
5.1	6.2	5.7	11.1	קופת חולים מאוחדת

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.48: בני +65 מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות

אחוזים

קופת חולים מאוחדת	קופת חולים לאומית	מכבי שירותי בריאות	שירותי בריאות כללית	סה"כ	
4.1	7.2	4.9	13.1	10.2	דצמבר 1994
4.4	7.4	5.1	12.9	10.1	דצמבר 1995
4.4	7.3	5.2	13.0	10.0	נובמבר 1996
4.4	7.2	5.4	13.2	10.1	נובמבר 1997
4.6	7.4	5.5	13.2	10.0	נובמבר 1998
4.7	7.4	5.6	13.1	10.0	נובמבר 1999
4.8	7.5	5.8	13.1	10.0	נובמבר 2000
5.0	7.5	6.0	13.1	10.0	נובמבר 2001
5.2	7.7	6.3	13.1	10.1	נובמבר 2002

מקור: המוסד לביטוח לאומי
 הערה: בשנתון הקשישים 2002 השתבשו נתוני קופות החולים מכבי שירותי בריאות, קופת חולים לאומית וקופת חולים מאוחדת, בלוח זה

לוח 2.49: בעלי ביטוח בריאות משלים וביטוחי בריאות נוספים בקרב בני 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי שנה ומין

אחוזים

כלל האוכלוסייה			בני 65+					
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ			
ביטוח בריאות משלים⁽¹⁾								
40.0	35.0	37.5	30.0	22.0	27.0	1997		
52.0	50.0	51.0	31.5	37.0	34.0	1999		
66.0	62.0	65.0	58.0	58.0	58.0	2001		
ביטוח בריאות פרטי⁽²⁾								
22.0	29.0	26.0	5.0	21.0	12.0	2001		
ביטוח סיעודי פרטי⁽³⁾								
27.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	2001		

מקורות: גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'. 2000. לקט נתונים על ביטוחי בריאות משלימים ומסחריים 1995-1999, ג'וינט-מכון ברוקדייל; גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'. 2003.

שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל, ג'וינט-מכון ברוקדייל

1. תכניות לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) המשוקות למבוטחים של קופות החולים בידי הקופות, שהן מלכ"רים
2. ביטוחים המשוקים בידי חברות ביטוח, שהן למטרות רווח
3. הביטוח הסיעודי משוק כולו בידי חברות ביטוח