

2. מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של הקשישים בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד ובשמירה על בריאות הקשישים.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשות באיכות חייו של הקשיש. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, תמותה, סגנון חיים, מחלות ומוגבלות, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. כמו כן, מובאים נתונים על דפוסי שימוש של קשישים בשירותי בריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית. השנה נוספו מספר לוחות על מאפייני בריאות בפירוט גאוגרפי רחב יותר (ברמת מחוז ונפה

ואף ברמת יישובים, ככל שהיה ניתן) מתוך פרסום הלמ"ס **פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל**.

ממצאים עיקריים

- ◆ **תוחלת החיים בלידה** עולה בהדרגה והגיעה בשנת 2005 ל-82.3 שנים לנשים ו-78.3 שנים לגברים. תוחלת החיים של היהודים גבוהה מזו של הערבים: בשנת 2005 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 4 שנים בקירוב (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** היא 19.9 שנים לנשים ו-17.7 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 85 בממוצע, וגבר - עד גיל 83 (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 12.3 שנים ולגברים 11.1 שנים (לוח 2.3).
- **תוחלת החיים הגבוהה ביותר** בין היישובים שבהם מעל 50,000 תושבים היא ברעננה (83.7) והנמוכה ביותר בנצרת (75.7); (לוח 2.5). **במחוזות** - באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה, תוחלת החיים היא הגבוהה ביותר (80.6) ואחר כך במחוז ירושלים (80.1). במחוז הדרום תוחלת החיים היא הנמוכה ביותר (77.3); (לוח 2.4).
- ◆ ב-2004 עמד **שיעור הפטירה** המתוקנן ל-1,000 בני +65 על 51 בקרב הגברים ועל 40 בקרב הנשים (לוח 2.6).
- ◆ שישים ושבעה אחוזים מהקשישים **נפטרו בבית חולים** בשנת 2005, לעומת 61% מבני 0-64. בקרב הקשישים 69% מהגברים ו-66% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 56% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 69% מהנשים (לוח 2.7).
- ב-2003 נפטרו 30,159 אנשים בגיל +65, שהם 79% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. **סיבות הפטירה העיקריות** בקרב הקשישים הן שאתות ממאירות (23%) ומחלות לב שונות (23%). בקרב הגברים, אין הבדל בין הקשישים לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתוך סך הפטירות (25%); ובקרב הנשים הקשישות השיעור (21%) נמוך מעט מאשר בקרב הנשים בכלל האוכלוסייה (25%); (לוחות 2.13 א, ב, ג).

- עם העלייה בגיל, עולה חלקן היחסי של מחלות לב וכלי דם בסיבות הפטירה: מ-26% בקרב בני 65-74 ל-38% בקרב בני +85. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-35% בקרב בני 65-74 ל-14% בקרב בני +85 (לוח 2.13 א).
- ◆ על פי הסקר החברתי, 37% מבני 65 ומעלה מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד**, לעומת 77% בקרב בני 20 ומעלה. בקרב הקשישים, 44% מהגברים ו-33% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 63% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם בדרך כלל לא-כל-כך-טוב או בכלל-לא-טוב, לעומת 23% בקרב בני 20 ומעלה (לוח 2.14).
- ◆ על פי סקר הבריאות הלאומי, 35% מבני 65 ומעלה מדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת, לעומת 64% בקרב כלל האוכלוסייה. בקרב הקשישים, 40% מהגברים ו-31% מהנשים דיווחו על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת. בקרב היהודים ואחרים 35% דיווחו על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת, לעומת 25% בקרב הערבים. אחוז הקשישים ילידי ישראל המדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת כפול מאחוז יתר הקשישים (75% לעומת כ-35%), ובקרב עולי בריה"מ רק 10% מדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת (לוח 2.16).
- ◆ על פי סקר הבריאות הלאומי, 41% מבני 65 ומעלה מדווחים על עיסוק בפעילות גופנית (שלוש פעמים בשבוע או יותר, במשך 20 דקות רצופות או יותר). בקרב הגברים, 49% מדווחים על עיסוק בפעילות גופנית ובקרב הנשים 35%. בקרב כלל האוכלוסייה, רק 29% מדווחים על עיסוק בפעילות גופנית (לוח 2.17).
- ◆ **מדד מסת הגוף (BMI)** מחושב על-פי גובה ומשקל. ערכים שמעל 30 נחשבים להשמנת יתר. על פי סקר הבריאות הלאומי, בקרב כלל האוכלוסייה ל-16% יש BMI של 30 ויותר. לעומת זאת, ל-22% מבני 65 ומעלה יש BMI של 30 ויותר (24% מבני 65-74 ו-18% מבני 75 ומעלה); (לוח 2.18).
- ◆ עשרה אחוזים מהקשישים **מעשנים** לעומת 27% בכלל האוכלוסייה. בקרב הגברים הקשישים, אחוז המעשנים מעט יותר מכפול מאחוז המעשנות בקרב הנשים הקשישות (15% לעומת 6%). אחוז הקשישים הערבים המעשנים גבוה מאחוז הקשישים היהודים (21% לעומת 9%); (לוח 2.19).

- ◆ ארבעים וחמישה אחוזים מבני 65 ומעלה מדווחים על **שימוש בתרופות ללא מרשם רופא** לעומת 36% בכלל האוכלוסייה. בקרב בני 75 ומעלה השיעור מגיע ל-47%. הקשישים הגברים משתמשים פחות בתרופות ללא מרשם בהשוואה לנשים הקשישות (35% לעומת 52%, בהתאמה); הקשישים היהודים משתמשים יותר בתרופות ללא מרשם לעומת הקשישים הערבים (46% לעומת 21%, בהתאמה); (לוח 2.20).
- ◆ שמונים ושישה אחוזים מבני 65 ומעלה מדווחים על שימוש **בתרופות עם מרשם רופא** (81% מבני 65-74 ו-94% מבני 75 ומעלה), וזאת לעומת 46% בקרב כלל האוכלוסייה. בתרופות עם מרשם רופא אין הבדל בדיווח על שימוש בין יהודים לערבים (לוח 2.21).
- ◆ ארבעים ואחד אחוזים מהקשישים **ביקרו אצל רופא** משפחה לפחות פעם אחת בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות לאומי); כפול מהאחוז בקרב בני 21+. אצל רופא מומחה ביקרו 22% מבני 65+ ו-15% מבני 21+. אחוז המבקרים אצל רופא עולה עם הגיל: 39% מבני 65-74 ביקרו אצל רופא ו-45% מבני 75+ (לוח 2.22).
- ◆ קשיש **מבקר אצל רופא** משפחה בממוצע כ-16 פעמים בשנה, 8 פעמים אצל רופא מומחה ופעמיים אצל רופא שיניים. ממוצע הביקורים בשנה אצל רופא משפחה בקרב בני 21+ הוא 8, אצל רופא מומחה 5 ואצל רופא שיניים 3 (לוח 2.23).
- עשרים ושמונה אחוזים מסך הביקורים אצל רופא נעשים על ידי בני 65+. מכלל הביקורים אצל רופא משפחה, 29% אחוזים מהביקורים הם של בני 65+; מסך הביקורים אצל רופא מומחה, 25% הם של בני 65+; ומסך הביקורים אצל רופא שיניים, 10% הם של בני 65+ (לוח 2.24).
- ◆ על פי סקר הבריאות הלאומי, מחצית מבני 65 ומעלה מדווחים על **בעיות שינה** (שנמשכות שבועיים ויותר) לעומת 30% בקרב כלל האוכלוסייה. ארבעים ושניים אחוזים מהגברים בני 65 ומעלה ו-57% מהנשים מדווחים על בעיות שינה (לוח 2.26).
- ◆ ארבעים ואחד אחוזים מבני 65+ דיווחו על **כאב כרוני** בגב או בצוואר, 31% מהגברים ו-48% מהנשים. עשרים וחמישה אחוזים מבני 21+ דיווחו כי הם סובלים מכאבים אלו. רבע מהקשישים דיווחו כי הם סובלים מכאבי ראש חזקים, ושיעור דומה בקרב בני 21+ דיווחו על כך (24%); (לוח 2.27).

- ♦ ארבעה-עשר אחוזים מבני +65 דיווחו כי לקו **בהתקף לב**: 20% מהגברים ו-9% מהנשים. ארבעה אחוזים מבני +21 דיווחו כי לקו בהתקף לב. 11% מהקשישים סובלים ממחלת ריאות כרונית ו-10% מסרטן לעומת 6% ו-3% בקרב בני +21, בהתאמה (לוח 2.28).
- ♦ חמישים ואחד אחוזים מבני +65 דיווחו **שהרופא אבחן אצלם לחץ-דם גבוה**, לעומת 20% בקרב בני +21 (לפי סקר בריאות לאומי). 22% מהקשישים דיווחו כי הרופא אבחן אצלם סוכרת או סוכר גבוה בדם ו-24% דיווחו על דלקת פרקים: 14% בקרב הגברים ו-31% בקרב הנשים. 34% מהגברים בני +65 דיווחו כי רופא אבחן אצלם בלוטת ערמונית מוגדלת (לוח 2.29).
- ♦ שיעור בני 65 ומעלה המקבלים **טיפול בדיאליזה** הוא 266 לכל 100,000 נפש בני 65 ומעלה. השיעור בקרב הגברים גבוה לעומת השיעור בקרב הנשים: 376 לעומת 185 לכל 100,000 נפש בהתאמה. בקרב כלל האוכלוסייה השיעור הוא 52 לכל 100,000 נפש (לוח 2.30). 612 חולים חדשים בני 65 ומעלה קיבלו טיפול בדיאליזה בשנת 2001 (לוח 2.31).
- ♦ בשנת 2003 נרשמו 12,961 **מקרים חדשים של שאתות ממאירות** בקרב בני +65, אשר מהווים 1,784 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. השיעור בקרב הגברים גבוה יותר מאשר בקרב הנשים (2,168 לעומת 1,400 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.32).
- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים (2,235 לעומת 1,568 לכל 100,000 נפש בהתאמה). גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,450 לעומת 821 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.33).
- ♦ על פי מחקר שנערך על ידי מאיירס-גיוינט-מכון ברוקדייל בקרב האוכלוסייה היהודית לגבי שכיחות **מחלת הדמנטיה** נמצא כי 19% מבני +65 (כ-117 אלף איש) סבלו מהמחלה. 84% מהם מתגוררים בקהילה והיתר במוסדות (לוח 2.35).
- מקרב החולים בני +65 המתגוררים בקהילה, 47% לוקים במחלה בדרגת חומרה קלה, 24% לוקים ברמת חומרה בינונית ואילו 30% לוקים בה ברמת חומרה גבוהה. בהשוואה לפי מין נמצא כי 19% מהנשים לוקות במחלה לעומת

14% מהגברים. שכיחות המחלה בקרב בני +65 עולה עם הגיל ומגיעה לשיא בקבוצת בני +85 : 47% מבני קבוצת גיל זו לוקים במחלה (לוח 2.36).

◆ על פי סקר הבריאות הלאומי, 25% מבני 65 ומעלה מדווחים על **בעיה גופנית** שנמשכת 6 חודשים ויותר וגורמת קושי גדול או גדול מאוד בביצוע פעולות יום-יומיות, לעומת 10% מכלל האוכלוסייה. 18% מהגברים בני 65 ומעלה דיווחו על בעיה גופנית לעומת 31% מהנשים. 25% מהקשישים היהודים דיווחו על בעיה גופנית לעומת 30% מהקשישים הערבים (לוח 2.37).

◆ אומדן היכולת של הקשישים לבצע **פעולות יום-יומיות ללא עזרה** מצביע על כך ש-79% מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים להתלבש לבד ללא קושי; 75% מסוגלים להתקלח או להתרחץ ללא קושי; 91% מסוגלים לאכול ללא קושי ו-81% מסוגלים להיכנס ולצאת מהמיטה או להתיישב על כיסא ולקום ממנו ללא קושי. 7% מהקשישים הגרים בקהילה אינם מסוגלים להתלבש לבדם, ו-12% מהם אינם מסוגלים להתקלח או להתרחץ לבד (לוח 2.38).

- בחינת אומדן **מידת הניידות** של בני +65 הגרים בקהילה מראה כי 13% מהם אינם מסוגלים להסתובב מחוץ לבית והם מרותקים לביתם, ו-8% מסוגלים לצאת מביתם רק בעזרת אדם אחר או באמצעות כיסא גלגלים. 72% מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים ללכת מחוץ לביתם מרחק של 400 מ' ללא עזרה. חמישה אחוזים מהקשישים הגרים בקהילה מוגבלים בניידות בתוך הבית (לוח 2.39).

◆ אומדן **אחוז הקשישים המוגבלים**, דהיינו **הזקוקים לעזרה באחת מפעולות היום-יום לפחות**, עומד בסוף 2005 על 17% (12% בקרב הגברים ו-20% בקרב הנשים). אחוז המוגבלים עולה בצורה חדה עם העלייה בגיל: 40% בקרב בני +80 לעומת 7% בקרב בני 65-74. אחוז הקשישים המוגבלים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה פי שניים בערך מהאחוז המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית (31% ו-16%, בהתאמה); (לוח 2.40).

* (להתרחץ או להתקלח, להתלבש, לאכול, לשבת ולקום מהמיטה, להיכנס ולצאת מהמיטה, להסתובב בתוך הבית); (ADL = Activities of Daily Living)

- אומדן **מספר הקשישים המוגבלים** (הזקוקים לעזרה בפעולות טיפול אישי) בסוף 2005 עומד על 114 אלף איש. עשרים ושלושה אחוזים מהקשישים המוגבלים הם דיירי המוסדות לטיפול ממושך ו-77% גרים בקהילה (לוח 2.41).
- ♦ בשנת 2005 נפגעו **בתאונות דרכים** 1,905 קשישים. מתוכם, 4% נהרגו (83 קשישים), 16% נפצעו קשה (295 קשישים) ו-80% נפצעו קל (1,527 קשישים). שלושים ושישה אחוזים מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 34% נהגו ברכב ו-27% נסעו ברכב. 58% מהקשישים שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (לוח 2.42).
- שיעור הקשישים שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2005 נמוך מזה שבקרב כלל האוכלוסייה (277 ו-512 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך **שיעור ההרוגים** בקרב הקשישים כפול לעומת השיעור בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב הקשישים. שיעור הקשישים שנפגעו בתאונות דרכים בקרב הערבים גבוה מאשר בקרב היהודים (354 ו-273 בהתאמה); (לוח 2.43).
- **שיעור הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בקרב כלל האוכלוסייה בשנת 2005 גבוה ב-30% משיעור הנהגים בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים (לוח 2.45).
- ♦ שיעור **הביקורים של בני +65 בחדר מיון** לכל 1,000 נפש הוא 644 לעומת 380 בקרב כלל האוכלוסייה. ביקורים של בני +65 בחדר מיון מהווים 17% מכלל הביקורים במיון. שיעור הביקורים במיון עולה עם הגיל: 524 בקרב בני 65-74 ו-1,139 בקרב בני +85 (לוח 2.46). 89% מהביקורים של בני +65 בחדר מיון נגרמו בגלל מחלות, לעומת 72% מהביקורים של כלל האוכלוסייה (לוח 2.47).
- ♦ עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים דיווחו על **אשפוז** בשנה האחרונה (לפי סקר הבריאות הלאומי), 26% בקרב הגברים ו-22% בקרב הנשים. שיעור האשפוזים בקרב הערבים גבוה יותר ועומד על 28% לעומת שיעור האשפוזים בקרב קבוצת היהודים ואחרים (24%). בקרב היהודים, שיעור האשפוז הנמוך ביותר הוא של קשישים שיבשת המוצא שלהם היא אסיה (20%) והגבוה ביותר הוא של קשישים שיבשת המוצא שלהם היא אפריקה (26%); (לוח 2.49).
- ♦ **שיעורי האשפוז של הקשישים במחלקות האשפוז הכלליות** גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. בשנת 2002 נרשמו 543 אשפוזים

ל-1,000 קשישים במחלקות האשפוז הכלליות, בהשוואה ל-155 ל-1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-423 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-900 בגיל +85). שיעור האשפוז נמצא במגמת עלייה, הן בקרב כלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב הקשישים (לוח 2.50).

- בבחינת שיעור אשפוז הקשישים מכלל האשפוזים נמצא, כי בשנת 2002, כשליש (35%) מהאשפוזים היו של בני +65 (המהווים פחות מ-10% מכלל האוכלוסייה), ו-20% מהאשפוזים היו של בני +75 (המהווים כ-4% מכלל האוכלוסייה). שיעור אשפוז הקשישים מכלל האשפוזים נמצא במגמת עלייה (לוח 2.51). חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים במחלקות הפנימיות גבוה במיוחד והגיע ל-59% בשנת 2002 (לוח 2.52).

- התפלגות האשפוזים של הקשישים במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר, ומהווה קצת מעל מחצית האשפוזים (לוח 2.53).

♦ שיעור האשפוזים של בני 65-74 במחוז הצפון הוא הגבוה ביותר בין המחוזות: 442 ל-1,000 נפש בתקופה שבין 2000 ל-2002. במחוז תל-אביב שיעור האשפוזים הוא 378 ל-1,000 נפש ובמחוז ירושלים 355 ל-1,000 נפש. בקרב בני +75 שיעור האשפוזים הגבוה ביותר הוא במחוז המרכז (701 לכל 1,000 נפש) והשיעורים הנמוכים הם במחוז חיפה (548 ל-1,000 נפש) ובאזורי יהודה, שומרון וחבל עזה (500 ל-1,000 נפש); (לוח 2.55).

♦ ב-2004 קיבלו 6,411 בני +65 (כ-1% מבני +65) טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי. בני +65 מהווים 12% מכלל המטופלים ב-2004. 38% מהמטופלים בני +65 הם גברים ו-62% הן נשים. בקרב כלל האוכלוסייה היחס בין גברים לנשים שונה: 53% מהמטופלים הם גברים, ו-47% נשים (לוח 2.57).

♦ ב-2004 היו 19 קשישים באשפוז יום פסיכיאטרי, והם היוו 3% מסך השוהים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 74% מכלל הקשישים השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.58).

♦ בסוף 2004 היו 609 קשישים מאושפוזים באשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 0.9 מאושפוזים ל-1,000 נפש. זאת, בהשוואה ל-0.7 מאושפוזים ל-1,000 נפש בקרב כלל האוכלוסייה. שלושה-עשר אחוזים מכלל המאושפוזים הפסיכיאטריים היו בני +65

- (לוח 2.59). משנת 1990 ועד שנת 2003 חלה ירידה בשיעור הקשישים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.9 ל-1,000 נפש); (לוח 2.60).
- במהלך 2004 היו 1,808 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, ואלה היו 9% מסך הקבלות לאשפוז. 61% מהקבלות של בני +65 היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (לוח 2.61). שלוש האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (88% מהקבלות) היו: הפרעות אפקטיביות, סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות והפרעות אורגניות (לוח 2.62).
 - שנים עשר אחוזים מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי בשנת 2004 היו של בני +65 (מרביתם בני 65-84, ורק מיעוטם בני +85); (לוח 2.63).
 - שיעור המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מבני +65 במחוז חיפה עומד על 285 ל-100,000 תושבים, והוא הגבוה בין המחוזות. במחוז הצפון השיעור הוא 159, והוא בין המחוזות שבהם שיעור האשפוז הפסיכיאטרי נמוך (לוח 2.64).
- ◆ בנובמבר שנת 2005 היו 69% מהקשישים מבוטחים בשירותי בריאות כללית (בהשוואה ל-54% מכלל האוכלוסייה), 17% במכבי שירותי בריאות (בהשוואה ל-24% מכלל האוכלוסייה), 8% בקופת חולים לאומית ו-6% בקופת חולים מאוחדת (בהשוואה ל-10% ו-12% מכלל האוכלוסייה בהתאמה). יש ירידה לאורך השנים באחוז הקשישים המבוטחים בשירותי בריאות כללית (לוח 2.66). שלושה עשר אחוזים מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם קשישים, בהשוואה ל-7% במכבי שירותי בריאות, ל-8% בקופת חולים לאומית ול-6% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.67).
 - ◆ על פי סקרים שנערכו במאירס-גיוינט-מכון-ברוקדייל, ב-2005 היה ל-67% מהקשישים ביטוח בריאות משלים, לעומת 79% בקרב כלל האוכלוסייה. מאז שנת 1997 גדל מספר הקשישים בעלי הביטוח המשלים ביותר מפי שניים (בשנת 1997 ל-27% מהקשישים היה ביטוח משלים). ל-22% מהגברים הקשישים, ול-15% מהנשים הקשישות יש ביטוח בריאות פרטי. אחוז הקשישים בעלי ביטוח בריאות פרטי נמוך יחסית לאוכלוסייה הכללית (37% מהגברים ו-31% מהנשים בכלל האוכלוסייה); (לוח 2.68).

הגדרות והסברים

כלל האוכלוסייה: המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד, וקבוצת "בני דתות אחרות" הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אומדני המוגבלות בקרב הקשישים מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בסקר בני 60 ומעלה שנערך ע"י הלמ"ס בשנת 1997. שיעורים אלה יוחסו לקבוצות הדמוגרפיות המרכיבות את אוכלוסיית הקשישים הנוכחית על מנת לקבל אומדני מוגבלות נוכחיים.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים עד 1995 מבוססים על קובצי האשפוזים בבתי חולים לאשפוז כללי שהוכנו בלמ"ס. הנתונים לשנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכז-אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. המאגר כולל 93% מכלל האשפוזים לפי גיל ומין באשפוז הכללי ונופח לסך כל האשפוזים, בהתאם ל"מוסדות האשפוז בישראל". הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

אשפוז פסיכיאטרי: אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

אשפוז מלא: מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

אשפוז יום: מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

קבלות: קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

קבלות ראשונות: קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

נתונים מסקר בריאות

אשפוז: אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוז יום בבתי חולים.

רופא משפחה: רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים.

רופא שיניים: רופא שיניים ומרפא שיניים, אורתודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

ביקור אצל רופא: ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים, במרפאת חוץ של בית חולים, בתחנת "מגן דוד אדום", בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית בביתו של הרופא וביקור בבית החולה. לא נכללו התייעצויות בטלפון או ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

מבקר: אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

חולה במחלות כרוניות: אדם המדווח שאי-פעם הרופא אבחן אצלו מחלה כרונית.

סקר בריאות לאומי: נערך ביוזמת משרד הבריאות ובוצע על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 2004/2003. במסגרת הסקר רואיינו קרוב ל-5,000 משיבים בני 21 ומעלה. הסקר נועד בין היתר לאמוד את שכיחותם של מצבי בריאות גופנית ונפשית באוכלוסייה הכללית. הסקר הוא חלק מפרויקט בין-לאומי שמוביל ארגון הבריאות העולמי במטרה להרחיב את המידע על תחלואה נפשית באוכלוסייה הכללית.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים

.. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-40%

() = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומאירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.2	75.1	80.3	76.6	80.0	76.3	1996
76.8	74.3	80.6	76.4	80.1	76.0	1997
76.8	74.4	80.7	76.4	80.3	76.1	1998
78.1	74.9	80.7	77.0	80.4	76.6	1999
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
77.8	74.5	81.6	77.7	81.2	77.3	2001
77.9	74.7	81.9	77.9	81.5	77.5	2002
78.2	74.9	82.2	78.1	81.8	77.6	2003
79.6	75.4	82.7	78.5	82.4	78.0	2004
78.7	75.0	82.7	78.8	82.3	78.3	2005

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת חיים בגיל 65, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.7	15.3	14.8	13.7	14.9	13.8	1974-1970
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
16.4	16.0	17.9	15.8	17.9	15.8	1995-1991
16.8	16.1	18.1	16.0	18.0	16.0	1996-1992
17.0	16.4	18.3	16.2	18.2	16.2	1997-1993
17.0	16.4	18.5	16.3	18.4	16.3	1998-1994
17.2	16.6	18.6	16.4	18.5	16.4	1999-1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
16.6	16.5	18.8	16.7	18.7	16.6	2000-1996
16.7	16.3	19.0	16.8	18.8	16.8	2001-1997
16.7	16.1	19.2	17.1	19.1	17.1	2002-1998
17.0	16.1	19.5	17.4	19.3	17.3	2003-1999
17.3	15.9	20.1	17.9	19.9	17.7	2005-2001

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.3: תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין

בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
5.8	5.5	8.0	7.3	10.8	9.7	1995-1991
5.8	5.5	8.0	7.4	10.8	9.8	1996-1992
5.9	5.5	8.2	7.4	11.0	9.9	1997-1993
5.9	5.5	8.2	7.4	11.1	10.0	1998-1994
5.8	5.6	8.1	7.5	11.1	10.1	1999-1995
5.9	5.7	8.2	7.6	11.3	10.2	2000-1996
5.9	5.8	8.3	7.8	11.4	10.4	2001-1997
6.0	6.1	8.4	8.1	11.6	10.7	2002-1998
6.2	6.3	8.7	8.3	11.8	10.9	2003-1999
6.7	6.5	9.1	8.6	12.3	11.1	2005-2001

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין ולפי מחוז ונפה, 2002-1998

	בגיל 65			בלידה		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
סה"כ	19.0	17.1	18.2	80.8	76.8	78.9
מחוז ירושלים	20.0	17.8	19.0	81.9	78.1	80.1
מחוז הצפון	18.4	16.4	17.5	79.9	75.9	77.9
נפת צפת	18.0	16.1	17.1	79.7	75.7	77.7
נפת כנרת	18.5	16.5	17.6	80.6	76.0	78.3
נפת יזרעאל	18.7	16.2	17.6	80.1	75.7	77.9
נפת עכו	18.2	16.6	17.5	79.7	75.9	77.8
מחוז חיפה	18.5	16.9	17.8	80.1	76.2	78.2
נפת חיפה	18.8	17.0	18.0	80.6	76.4	78.6
נפת חדרה	17.4	16.4	17.0	78.8	75.6	77.2
מחוז המרכז	19.5	17.2	18.5	81.7	77.6	79.7
נפת השרון	19.4	17.4	18.5	81.2	77.2	79.3
נפת פתח תקווה	20.3	17.4	19.0	82.6	78.3	80.5
נפת רמלה	17.7	15.7	16.8	79.6	75.6	77.6
נפת רחובות	19.5	17.4	18.6	81.9	78.2	80.1
מחוז תל אביב	19.3	17.5	18.5	81.3	77.4	79.5
מחוז הדרום	18.3	16.1	17.3	79.6	75.0	77.3
נפת אשקלון	18.2	16.1	17.3	79.9	75.7	77.9
נפת באר שבע	18.3	16.1	17.3	79.4	74.5	77.0
אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה	20.1	18.9	19.4	82.1	79.3	80.6

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.5: תוחלת חיים בגילים נבחרים, ביישובים שמנו מעל 50,000 תושבים, לפי מין, 1998-2002

	בגיל 65			בלידה			סה"כ
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
	19.0	17.1	18.2	80.8	76.8	78.9	
אילת	18.8	78.9	
אשדוד	18.1	16.3	17.3	79.9	75.9	78.0	
אשקלון	18.6	16.6	17.7	79.9	75.6	77.9	
באר שבע	18.6	16.1	17.6	80.3	75.1	77.8	
בית שמש	18.1	79.1	
בני ברק	19.6	17.8	18.8	81.6	78.7	80.2	
בת ים	19.1	17.0	18.2	81.0	75.9	78.6	
גבעתיים	19.2	81.1	
הרצליה	18.7	80.5	
חזרה	17.3	77.6	
חולון	19.1	17.5	18.4	81.3	78.0	79.8	
חיפה	19.2	17.1	18.3	81.0	76.5	78.9	
ירושלים	20.0	17.8	19.1	81.8	78.8	80.0	
כפר סבא	18.3	79.8	
כרמיאל	17.9	78.7	
לוד	16.8	76.7	
נהריה	17.8	78.0	
נצרת	16.0	75.7	
נצרת עילית	17.3	77.4	
נתניה	20.0	17.6	18.9	81.9	77.0	79.5	
עכו	16.5	76.4	
פתח תקווה	20.5	17.1	19.0	82.7	77.6	80.3	
קריית אתא	17.3	77.5	
קריית גת	17.2	77.9	
ראשון לציון	19.2	17.7	18.5	81.8	78.3	80.1	
רחובות	18.5	79.9	
רמלה	15.9	76.1	
רמת גן	20.1	18.2	19.3	82.2	79.0	80.7	
רעננה	21.5	83.7	
תל אביב-יפו	19.1	17.0	18.3	80.6	75.9	78.4	

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.6: פטירות של בני +65, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2004

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

	יהודים ואחרים ⁽¹⁾			סה"כ						
	ערבים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים				
בני +65	41	50	46	41	49	44	41	49	44	65+
בני 65-69	15	27	21	10	17	13	10	18	14	בני 65-69
בני 70-74	28	44	35	18	29	23	19	30	24	בני 70-74
בני +75	83	86	84	70	82	75	71	83	75	בני +75
בני 75-79	55	64	59	34	47	39	35	48	40	בני 75-79
בני 80-84	76	84	79	60	78	67	61	78	68	בני 80-84
בני +85	175	129	150	157	171	162	158	168	162	בני +85
										שיעורים מתוקננים
	51	57	54	39	50	45	40	51	45	בני +65 ⁽²⁾

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. אוכלוסיית התקן היא ממוצע (גברים ונשים) של כלל האוכלוסייה בשנת 2004 לפי קבוצת גיל

לוח 2.7: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, 2001-2005

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
2001			
66.7	68.6	67.6	בני 65+
70.3	68.7	69.4	בני 65-74
65.7	68.5	67.0	בני 75+
68.8	52.8	58.8	בני 0-64
67.0	64.3	65.6	כלל האוכלוסייה
2002			
66.6	68.5	67.5	בני 65+
69.9	67.6	68.6	בני 65-74
65.8	68.8	67.2	בני 75+
65.2	52.3	57.1	בני 0-64
66.4	64.0	65.2	כלל האוכלוסייה
2003			
65.5	69.3	67.2	בני 65+
70.8	68.1	69.3	בני 65-74
65.5	69.3	67.2	בני 75+
68.3	51.9	58.1	בני 0-64
66.8	64.4	65.6	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות

* כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות



לוח 2.7: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, 2001-2005 (המשך)

אחוזים

	נשים	גברים	סה"כ	
2004				
	66.0	67.8	66.8	בני +65
	69.2	67.6	68.3	בני 74-65
	65.2	67.9	66.4	בני +75
	67.9	53.6	58.8	בני 0-64
	66.3	64.0	65.1	כלל האוכלוסייה
2005				
	66.1	68.5	67.2	בני +65
	69.5	67.5	68.4	בני 74-65
	65.3	68.8	66.8	בני +75
	68.8	55.8	60.6	בני 0-64
	66.5	65.1	65.8	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות

* כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

לוח 2.8: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2004

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

בני +75			בני 65-74			65+	
80+	79-75	סה"כ	74-70	69-65	סה"כ		
105	39	75	23	13	18	44	סה"כ
113	47	82	29	17	22	48	גברים
100	34	70	18	10	14	41	נשים
67	32	46	18	11	13	22 ⁽²⁾	סה"כ ילידי ישראל⁽²⁾
64	40	50	22	14	17	25	גברים
68	25	43	15	8	10	20	נשים
109	43	76	25	14	19	41	סה"כ ילידי אסיה
116	48	83	32	17	24	46	גברים
103	39	71	19	10	15	37	נשים
121	50	82	28	15	20	42	סה"כ ילידי אפריקה
133	57	91	35	19	26	48	גברים
113	43	76	22	11	16	37	נשים
106	37	76	22	14	18	49	סה"כ ילידי אירופה- אמריקה
114	45	84	28	18	23	54	גברים
100	32	71	18	10	14	46	נשים
99	39	68	25	14	18	40	מזה: עולי בריה"מ לשעבר⁽³⁾
110	50	76	32	19	24	44	גברים
95	33	64	19	10	14	37	נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.9: פטירות של בני +65, לפי גיל, מין ולפי מחוז ונפה, 1998-2002
 שיעורים ל-1,000 תושבים

	75+			74-65		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
סה"כ	75.4	88.6	80.8	17.2	26.7	21.3
מחוז ירושלים	69.3	83.4	75.1	15.6	24.5	19.5
מחוז הצפון	76.9	90.8	82.7	20.0	29.4	24.2
נפת צפת	77.0	83.6	79.8	18.6	31.8	24.6
נפת כנרת	80.3	86.4	87.2	19.9	29.1	24.1
נפת יזרעאל	76.5	93.7	83.6	19.3	29.0	23.6
נפת עכו	76.1	89.4	81.6	20.9	29.7	24.8
מחוז חיפה	79.6	89.7	83.7	18.5	27.7	22.5
נפת חיפה	77.2	89.1	82.1	17.9	27.1	21.9
נפת חדרה	90.0	91.9	90.8	20.5	29.9	24.7
מחוז המרכז	70.1	87.3	77.0	16.7	25.7	20.7
נפת השרון	70.3	84.5	76.1	16.5	25.9	20.6
נפת פתח תקווה	65.0	86.0	73.3	15.1	24.9	19.5
נפת רמלה	79.9	95.7	86.5	21.1	31.8	25.9
נפת רחובות	73.1	88.3	79.1	16.8	24.0	20.0
מחוז תל אביב	77.2	89.6	82.4	15.2	24.8	19.3
מחוז הדרום	79.3	90.6	83.8	19.1	29.6	23.8
נפת אשקלון	79.3	91.0	83.9	18.5	28.9	23.1
נפת באר שבע	79.3	90.2	83.6	19.7	30.4	24.5
אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה	63.2	68.4	65.1	12.8	23.0	17.9

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.10: פטירות של בני +65, לפי גיל, מין ולפי רשות מקומית, 2002-1998

שיעורים ל-1,000 תושבים

	75+			74-65		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
סה"כ	75.4	88.6	80.8	17.2	26.7	21.3
עיריות ומועצות מקומיות						
אבו סנאן	113.1	88.1	99.0	(23.1)	33.7	28.0
אום אל-פחם	107.5	103.9	105.6	35.7	40.8	38.0
אופקים	87.3	97.5	91.5	21.0	32.0	25.8
אור יהודה	82.3	114.8	94.8	24.4	36.1	29.7
אור עקיבא	96.1	97.5	96.6	22.1	38.7	29.1
אילת	47.7	74.1	56.8	12.9	30.1	20.9
אכסאל	(78.4)	(95.2)	87.3	(20.8)	(39.3)	(28.1)
אעבלין	104.2	(78.0)	91.5	(35.5)	49.7	41.9
אריאל	68.0	83.7	72.9	(10.4)	32.3	19.8
אשדוד	79.4	88.1	82.7	17.9	26.3	21.7
אשקלון	77.9	92.0	83.4	18.5	29.0	23.2
באקה אל-גרביה	113.6	84.2	100.1	37.6	41.5	39.3
באר שבע	78.9	91.1	83.6	19.3	30.6	24.3
בית שאן	80.9	115.1	95.7	23.8	30.9	27.1
בית שמש	73.3	72.8	73.1	18.9	27.9	22.8
ביתר עילית	(84.2)	(87.0)	(85.4)
בני ברק	72.5	89.3	79.7	16.2	23.0	19.0
בת ים	73.8	84.9	78.4	15.8	27.8	21.0
גבעת זאב	(62.4)	(71.8)	66.4	..	(21.2)	(15.5)
גבעת שמואל	81.0	79.7	80.4	13.2	22.2	17.3
גבעתיים	80.4	82.0	81.1	12.0	19.5	15.2
גידידה-מכר	119.6	105.5	113.7	26.9	46.0	36.3
גדרה	32.6	45.6	37.0	12.6	(13.8)	13.1
גן יבנה	75.3	159.7	103.7	(19.4)	(21.3)	20.4

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)



לוח 2.10: פטירות של בני +65, לפי גיל, מין ולפי רשות מקומית, 1998-2002 (המשך)

שיעורים ל-1,000 תושבים

	75+			74-65		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
גני תקווה	56.8	91.7	71.1	(15.0)	20.3	17.5
גיסר א-זרקא	(146.1)	(65.0)	100.8	(53.4)	(61.9)	56.8
דאלית אל-כרמל	117.8	76.8	93.7	34.1	27.6	30.9
דימונה	89.4	116.2	99.2	23.4	29.6	26.2
הוד השרון	66.1	90.3	75.7	15.3	25.4	19.8
הרצליה	73.5	85.1	78.2	13.5	24.5	18.5
זכרון יעקב	59.0	73.9	65.1	14.4	19.0	16.5
חדרה	83.2	86.6	84.6	17.7	29.2	22.8
חולון	75.8	85.0	79.7	15.5	24.6	19.6
חיפה	76.5	88.8	81.5	16.7	25.8	20.6
טבריה	90.3	100.3	94.5	21.7	35.7	27.9
טורעאן	63.4	119.9	90.5	(15.5)	(39.9)	25.8
טייבה	121.0	114.3	117.9	25.6	33.5	29.2
טירה	85.4	108.2	94.8	33.1	39.6	36.2
טירת כרמל	102.3	113.1	106.7	21.5	36.1	28.0
טמרה	108.6	119.7	114.0	27.9	30.4	29.0
יבנה	69.1	95.4	79.6	23.0	32.7	27.2
יהוד	68.9	92.1	78.0	16.9	24.3	20.2
יפיע	81.4	96.6	88.1	(12.9)	38.4	24.8
יקנעם עילית	84.5	81.3	83.3	18.1	39.8	27.5
ירושלים	69.5	83.9	75.5	15.3	24.4	19.3
ירכא	97.8	82.4	89.1	(20.8)	(27.7)	24.1
כפר יונה	122.0	88.5	107.0	(15.8)	36.1	24.9
כפר כנא	80.1	71.1	75.4	33.3	(29.1)	31.6
כפר מנדא	72.2	(64.2)	68.3	(24.3)	(23.3)	(23.9)
כפר סבא	66.9	88.2	75.2	14.2	25.5	19.1
כפר קאסם	62.0	93.3	73.9	(18.3)	(20.7)	19.2
כפר קרע	125.0	126.8	125.9	(28.5)	(33.2)	30.7

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)



לוח 2.10: פטירות של בני +65, לפי גיל, מין ולפי רשות מקומית, 1998-2002 (המשך)

שיעורים ל-1,000 תושבים

75+			74-65			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
73.7	95.6	81.9	20.3	27.9	23.6	כרמיאל
77.6	95.0	84.5	22.9	35.2	28.3	לוד
64.7	77.9	70.4	15.4	19.6	17.7	מבשרת ציון
73.5	97.1	84.9	(21.0)	(24.5)	22.6	מגאר
66.2	97.6	80.1	(35.0)	(24.1)	29.9	מגיד אל כרום
76.9	113.6	90.4	20.8	38.4	28.5	מגדל העמק
68.3	92.8	79.4	(5.9)	(15.2)	10.5	מודיעין
..	(50.0)	(32.8)	מודיעין עילית
67.0	52.6	61.7	(13.6)	23.8	18.3	מעלה אדומים
(85.9)	(67.4)	74.9	(35.9)	(23.5)	30.3	מעלה עירון
70.8	78.6	73.6	15.8	28.0	21.2	מעלות-תרשיחא
72.3	96.3	81.0	18.7	29.0	23.2	נהריה
73.7	99.2	83.9	15.3	29.4	21.5	נס ציונה
93.7	99.8	96.1	23.5	33.0	27.7	נצרת
79.5	98.9	87.1	19.1	29.8	23.7	נצרת עילית
84.3	103.6	91.4	19.7	31.4	24.8	נשר
78.6	76.4	77.7	19.4	29.1	23.8	נתיבות
66.6	81.4	72.6	15.8	25.6	20.0	נתניה
97.0	75.9	85.1	25.9	34.8	29.8	סחינין
79.6	99.4	87.2	22.6	33.6	27.4	עכו
71.4	95.2	80.3	17.3	28.9	22.5	עפולה
86.9	72.2	79.3	(22.8)	(26.3)	24.3	עראבה
71.8	72.9	72.2	21.5	27.4	24.0	ערד
87.7	112.0	101.1	(17.3)	(14.7)	16.2	ערערה
(144.9)	(92.7)	115.9	(18.2)	ערערה-בנגב
50.8	74.6	60.0	17.4	25.8	21.1	פרדס חנה-כרכור
65.8	88.9	74.9	15.6	27.2	20.7	פתח תקווה
65.8	77.0	70.4	16.8	35.0	24.9	צפת

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)



לוח 2.10: פטירות של בני +65, לפי גיל, מין ולפי רשות מקומית, 1998-2002 (המשך)

שיעורים ל-1,000 תושבים

	75+			74-65		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
קלנסווה	128.0	133.6	130.5	(28.4)	36.1	32.2
קריית אונו	67.3	84.8	74.3	15.0	21.6	17.9
קריית אתא	81.4	93.4	86.3	22.2	30.9	265.0
קריית ביאליק	74.9	85.5	79.4	16.5	26.3	20.8
קריית גת	72.8	86.3	78.3	20.3	33.4	25.9
קריית טבעון	57.8	80.8	66.4	17.8	25.6	21.2
קריית ים	82.5	88.3	84.7	21.0	32.0	25.6
קריית מוצקין	74.5	87.1	79.9	17.9	24.3	20.7
קריית מלאכי	117.1	113.8	115.7	19.4	38.6	28.3
קריית שמונה	84.0	85.1	84.5	21.7	38.5	29.0
ראש העין	80.8	91.9	85.2	13.5	26.4	19.7
ראשון לציון	72.8	86.6	78.2	16.9	23.9	20.0
רהט	92.5	68.3	78.2	34.9	30.7	32.6
רחובות	78.0	92.0	83.7	15.4	23.8	19.1
ריינה	84.0	68.5	75.1	(22.9)	(21.7)	22.4
רמלה	93.4	99.5	96.0	22.8	34.7	28.1
רמת גן	71.2	82.7	76.3	12.6	20.7	16.0
רמת השרון	72.8	70.8	71.9	12.2	18.2	15.1
רעננה	52.2	68.5	58.4	15.3	20.7	17.7
שדרות	89.8	114.7	99.0	28.6	44.8	35.9
שוהם	..	(100.0)	(62.3)	(11.4)
שפרעם	87.8	103.0	94.8	24.6	28.5	26.5
תל אביב-יפו	80.8	96.3	87.1	16.3	27.1	20.7
תל שבע	(67.2)	(85.1)	(73.3)	..	(63.2)	(37.9)
מועצות אזוריות						
אל-בטוף	(51.3)	(48.6)	(50.0)	(35.5)	..	(28.2)
אלונה	(45.0)	(151.5)	(84.7)	(47.2)	..	(36.7)

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)



לוח 2.10: פטירות של בני +65, לפי גיל, מין ולפי רשות מקומית, 1998-2002 (המשך)

שיעורים ל-1,000 תושבים

	75+			74-65		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
אפעל	162.2	205.1	174.0	(18.4)	(12.6)	15.7
אשכול	89.7	72.3	82.6	(7.8)	21.9	14.9
באר טוביה	77.0	80.8	78.9	11.2	21.6	16.1
בוסתן אל-מרג'י	(93.2)	(135.9)	109.8	(31.7)	(52.0)	39.8
בני שמעון	59.4	80.4	69.4	(6.5)	(18.8)	12.2
בקעת בית שאן	54.9	86.1	67.6	(15.4)	(10.8)	13.2
ברנר	116.9	107.3	112.7	(15.1)	(18.0)	(16.6)
גדרות	69.2	52.6	61.9	(14.9)	(19.0)	(16.8)
גוש עציון	(41.2)	(78.9)	(51.9)	(13.8)
גזר	80.3	98.2	88.3	18.2	17.3	17.8
גן רווה	141.7	147.7	144.2	(21.7)	(13.7)	(17.6)
דרום השרון	77.1	86.0	81.0	11.9	20.4	16.2
הגלבוש	76.8	93.6	83.6	19.1	20.6	19.8
הגליל העליון	77.0	85.0	80.3	13.4	18.8	16.1
הגליל התחתון	73.8	74.3	74.0	(20.3)	(17.9)	19.2
זבולון	71.8	81.1	75.5	(9.7)	(20.1)	14.8
חבל יבנה	72.0	73.8	72.7	(30.6)	(22.7)	26.9
חבל מודיעין	76.8	84.8	80.5	14.8	21.5	17.7
חוף אשקלון	62.4	80.8	70.5	(12.8)	24.6	17.9
חוף הכרמל	60.3	77.7	68.6	11.7	21.3	15.7
חוף השרון	60.4	93.1	72.5	(11.8)	(22.8)	16.5
יואב	83.0	113.6	95.3	(14.0)	(16.7)	(15.2)
לב השרון	79.2	86.8	82.8	12.1	21.7	16.5
לכיש	85.0	106.9	96.2	(20.1)	(20.0)	20.1
מבואות החרמון	(73.9)	(91.8)	82.4	(23.7)	(20.1)	(22.0)
מגידו	76.7	89.0	81.6	(9.2)	(12.7)	10.9
מטה אשר	59.8	67.8	63.6	16.4	26.0	20.4
מטה בנימין	(41.9)	(55.3)	46.9	(14.8)	(28.7)	22.4

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)



לוח 2.10: פטירות של בני +65, לפי גיל, מין ולפי רשות מקומית, 1998-2002 (המשך)

שיעורים ל-1,000 תושבים

	75+			74-65		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
מטה יהודה	61.6	79.0	68.9	18.3	23.7	20.8
מנשה	80.7	88.2	83.7	15.4	22.3	18.7
מעלה יוסף	65.0	(75.9)	69.8	(22.6)	40.0	31.1
מרום הגליל	77.2	97.6	87.0	(18.4)	29.7	23.4
מרחבים	102.8	96.3	99.6	28.4	(26.3)	27.5
משגב	(38.8)	(57.9)	(46.0)	(17.7)	..	(15.2)
נחל שורק	(59.0)	(61.5)	60.3	(22.2)	..	(18.6)
עמק הירדן	76.8	102.8	87.1	(12.0)	17.1	14.4
עמק חפר	79.1	86.0	82.1	10.6	18.4	14.3
עמק יזרעאל	74.7	68.6	71.8	12.6	14.1	13.3
עמק לוד	55.4	100.6	75.3	(18.7)	30.6	24.3
רמת נגב	(50.0)	(62.9)	(54.7)	(9.1)
שדות הנגב	93.5	66.1	78.7	(14.0)	27.9	20.2
שומרון	60.4	(44.4)	54.4	(18.1)	(16.7)	(17.3)
שער הנגב	80.2	75.6	78.4	(10.1)	30.9	20.4
שפיר	77.5	114.0	92.4	(17.5)	(22.0)	19.5

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.11: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2003

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני +65			סה"כ	
סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים		
562	585	576	4,187	5,042	4,551	סה"כ*	
16	16	16	126	142	133	מחלות זיהומיות	
141	144	143	894	1,253	1,047	שאתות ממאירות	
45	38	42	364	384	373	סוכרת	
12	7	10	105	70	90	יתר לחץ-דם	
26	30	28	212	284	242	אוטם חריף של שריר הלב	
47	57	52	406	591	485	מחלת לב איסכמית אחרת	
37	32	35	300	302	301	מחלות לב אחרות	
40	34	37	333	355	342	מחלות של כלי דם במוח	
6	6	6	46	61	52	מחלות אחרות של מחזור הדם	
10	10	10	80	104	90	דלקת ריאות	
15	18	17	126	184	151	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	
13	11	12	105	109	107	יתר מחלות מערכת הנשימה	
5	7	6	33	46	39	מחלות כבד	
18	23	21	146	242	187	מחלות כליה	
3	4	4	0	0	0	מומים מולדים	
21	30	26	147	190	165	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	
84	65	75	671	618	648	כל המחלות האחרות	
4	11	8	9	21	14	תאונות דרכים	
2	10	6	5	21	12	פגיעה עצמית מכוונת	
13	25	19	77	87	81	כל הסיבות החיצוניות האחרות	

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.12: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2003

שיעורים ל-100,000 נפש

	נשים			גברים			סה"כ*
	85+	84-75	74-65	85+	84-75	74-65	
	16,094	4,649	1,511	17,365	6,311	2,423	
מחלות זיהומיות	485	150	38	480	187	64	
שאתות ממאירות	2,012	1,044	570	2,870	1,625	788	
סוכרת	1,090	461	153	1,030	500	218	
יתר לחץ-דם	495	109	25	309	91	22	
אוטם חריף של שריר הלב	842	256	56	1,058	352	126	
מחלת לב איסכמית אחרת	1,932	433	86	2,337	746	235	
מחלות לב אחרות	1,437	301	74	1,270	378	110	
מחלות של כלי דם במוח	1,340	388	95	1,262	438	169	
מחלות אחרות של מחזור הדם	182	52	15	204	71	33	
דלקת ריאות	407	83	13	505	120	33	
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	462	153	40	704	224	82	
יתר מחלות מערכת הנשימה	550	89	28	460	141	36	
מחלות כבד	57	46	20	106	48	35	
מחלות כליה	590	153	54	1,095	293	82	
מומים מולדים	0	0	0	0	0	0	
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	660	158	38	574	222	112	
כל המחלות האחרות	3,157	682	170	2,965	708	209	
תאונות דרכים	18	9	7	33	23	18	
פגיעה עצמית מכוונת		4	6	49	17	19	
כל הסיבות החיצוניות האחרות	367	76	20	322	122	31	

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.13: פטירות וסיבות פטירה של בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2003

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות - במספרים מוחלטים*
בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני +65	האוכלוסייה	
10,705	12,484	6,970	30,159	38,359	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
2.9	3.1	2.6	2.9	2.8	מחלות זיהומיות
14.1	24.0	34.8	23.0	24.8	שאותות ממאירות
6.4	9.0	9.5	8.2	7.2	סוכרת
2.6	1.9	1.2	2.0	1.7	יתר לחץ-דם
5.6	5.5	4.5	5.3	4.9	אוטם חריף של שריר הלב
12.6	10.5	7.9	10.7	9.1	מחלת לב איסכמית אחרת
8.3	6.2	4.7	6.6	6.0	מחלות לב אחרות
7.9	7.7	6.7	7.5	6.5	מחלות של כלי דם במוח
1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	מחלות אחרות של מחזור הדם
2.7	1.8	1.1	2.0	1.7	דלקת ריאות
3.3	3.4	3.1	3.3	2.9	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.1	2.1	1.6	2.3	2.1	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.5	0.9	1.4	0.8	1.0	מחלות כבד
4.7	3.9	3.5	4.1	3.6	מחלות כליה
0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	מומים מולדים
3.8	3.5	3.7	3.6	4.4	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
18.6	13.0	9.8	14.2	13.0	כל המחלות האחרות
0.1	0.3	0.6	0.3	1.3	תאונות דרכים
0.1	0.2	0.6	0.3	1.0	פגיעה עצמית מכוונת
2.1	1.8	1.3	1.8	3.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.13: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני +65 ובקרב כלל הגברים, לפי גיל, 2003

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות - במספרים מוחלטים*
בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני +65	הגברים	
4,266	6,031	3,920	14,217	19,332	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
2.8	3.0	2.6	2.8	2.7	מחלות זיהומיות
16.5	25.7	32.5	24.9	24.6	שאותות ממאירות
5.9	7.9	9.0	7.6	6.5	סוכרת
1.8	1.4	0.9	1.4	1.2	יתר לחץ-דם
6.1	5.6	5.2	5.6	5.1	אוטם חריף של שריר הלב
13.5	11.8	9.7	11.7	9.7	מחלת לב איסכמית אחרת
7.3	6.0	4.5	6.0	5.5	מחלות לב אחרות
7.3	6.9	7.0	7.0	5.8	מחלות של כלי דם במוח
1.2	1.1	1.4	1.2	1.0	מחלות אחרות של מחזור הדם
2.9	1.9	1.4	2.1	1.7	דלקת ריאות
4.1	3.5	3.4	3.7	3.1	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
2.6	2.2	1.5	2.2	1.9	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.6	0.8	1.4	0.9	1.2	מחלות כבד
6.3	4.6	3.4	4.8	3.9	מחלות כליה
0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	מומים מולדים
3.3	3.5	4.6	3.8	5.1	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
17.1	11.2	8.6	12.3	11.1	כל המחלות האחרות
0.2	0.4	0.7	0.4	1.9	תאונות דרכים
0.3	0.3	0.8	0.4	1.7	פגיעה עצמית מכוונת
1.9	1.9	1.3	1.7	4.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.13: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +65 ובקרב כלל הנשים, לפי גיל, 2003

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות - במספרים מוחלטים*
85+	84-75	74-65	בנות +65	הנשים	
6,439	6,453	3,050	15,942	19,027	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3.0	3.2	2.5	3.0	2.8	מחלות זיהומיות
12.5	22.5	37.7	21.4	25.1	שאתות ממאירות
6.8	9.9	10.1	8.7	8.0	סוכרת
3.1	2.3	1.7	2.5	2.1	יתר לחץ-דם
5.2	5.5	3.7	5.1	4.6	אוטם חריף של שריר הלב
12.0	9.3	5.7	9.7	8.4	מחלת לב איסכמית אחרת
8.9	6.5	4.9	7.2	6.6	מחלות לב אחרות
8.3	8.3	6.3	7.9	7.1	מחלות של כלי דם במוח
1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	מחלות אחרות של מחזור הדם
2.5	1.8	0.9	1.9	1.8	דלקת ריאות
2.9	3.3	2.6	3.0	2.7	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.4	1.9	1.9	2.5	2.3	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.4	1.0	1.3	0.8	0.9	מחלות כבד
3.7	3.3	3.6	3.5	3.2	מחלות כליה
0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	מומים מולדים
4.1	3.4	2.5	3.5	3.7	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
19.6	14.7	11.3	16.0	14.9	כל המחלות האחרות
0.1	0.2	0.5	0.2	0.7	תאונות דרכים
0.0	0.1	0.4	0.1	0.4	פגיעה עצמית מכוונת
2.3	1.6	1.3	1.8	2.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.14: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ וכלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, 2004

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	סה"כ בני 65+
5.6	9.4	7.2	טוב מאוד
26.7	34.4	30.0	טוב
43.4	40.3	42.1	לא כל כך טוב
24.2	15.9	20.6	בכלל לא טוב
100.0	100.0	100.0	כלל האוכלוסייה*
40.0	48.6	44.1	טוב מאוד
33.9	31.3	32.6	טוב
19.0	15.0	17.1	לא כל כך טוב
7.1	5.1	6.1	בכלל לא טוב
			דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאד בדרך כלל
32.3	43.8	37.2	סה"כ בני 65+
			גיל
38.6	50.9	44.3	74-65
24.2	32.7	27.6	75+
73.9	79.9	76.7	כלל האוכלוסייה*

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.15: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בריאות גופנית טובה מאוד או מצוינת, לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה ⁽¹⁾	75+	74-65	65+	
49.7	8.0	15.9	12.9	סה"כ
				מין
52.0	10.7	22.6	18.3	גברים
47.6	(6.1)	10.5	8.7	נשים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים⁽²⁾
49.2	7.9	16.7	13.3	סה"כ יהודים ואחרים
78.9	..	(53.7)	(47.6)	ישראל
50.9	..	17.2	14.9	אסיה
53.6	..	(10.9)	(8.7)	אפריקה
37.9	8.3	15.9	12.5	אירופה-אמריקה
				קופת החולים
45.8	6.9	15.5	12.2	כללית
54.6	(11.8)	19.2	17.0	מכבי
56.7	(12.8)	מאוחדת
49.5	(11.2)	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה

2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.16: בני +65 וכלל האוכלוסייה המדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת, לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה ⁽¹⁾	75+	74-65	65+	
63.5	29.3	38.0	34.7	סה"כ
				מין
66.1	36.4	42.0	40.0	גברים
61.1	24.3	34.8	30.7	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
63.9	29.3	39.0	35.3	יהודים ואחרים ⁽²⁾
60.9	..	(24.6)	25.4	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים ⁽²⁾
86.5	..	(72.2)	(75.4)	ישראל
67.9	32.6	35.9	34.9	אסיה
68.0	(27.8)	39.5	37.1	אפריקה
53.9	28.1	38.0	33.6	אירופה-אמריקה
25.4	(9.8)	(9.6)	9.7	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
				קופת החולים
61.9	28.7	39.9	35.6	כללית
65.6	25.9	34.5	31.9	מכבי
69.4	(34.6)	41.9	38.4	מאוחדת
59.8	(33.9)	(27.4)	30.2	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.17: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על עיסוק בפעילות גופנית⁽¹⁾ שלוש פעמים בשבוע או יותר, לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה ⁽²⁾
סה"כ	40.9	41.6	41.3	28.7
מין				
גברים	54.1	46.4	49.1	31.5
נשים	31.6	37.7	35.3	26.2
יבשת מוצא של יהודים ואחרים⁽³⁾				
סה"כ יהודים ואחרים	41.4	43.9	43.0	30.8
ישראל	..	(64.0)	(68.1)	30.7
אסיה	37.4	30.8	32.8	26.9
אפריקה	(31.6)	32.2	32.0	23.9
אירופה-אמריקה	42.5	50.6	46.9	35.0
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽⁴⁾	33.2	56.1	47.1	34.7
קופת החולים				
כללית	39.0	43.5	41.8	28.7
מכבי	50.5	41.6	44.3	31.3
מאוחדת	(31.1)	(32.5)	31.9	27.1
לאומית	52.5	(34.3)	42.2	25.1

- מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי
- עיסוק בפעילות גופנית בשלושים הימים האחרונים לפני הסקר, כגון: הליכה, שחייה, או התעמלות, שנמשכה 20 דקות רצופות או יותר
 - אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
 - כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
 - שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.18: בני +65 וכלל האוכלוסייה המדווחים על מסת גוף BMI של 30 ויותר⁽¹⁾, לפי גיל, מין, וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	75+	74-65	65+	
15.6	(17.6)	24.3	21.8	סה"כ
מין				
14.3	..	(17.3)	(16.6)	גברים
16.8	(19.3)	30.1	26.0	נשים
קופת החולים				
15.7	(15.8)	(20.1)	18.5	כללית
15.5	..	(32.0)	(30.2)	מכבי
(13.9)	..	(42.0)	(32.1)	מאוחדת
(16.9)	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. דיווח על גובה ומשקל שלפיהם חושב מדד מסת הגוף (Body Mass Index). ערכי BMI שבין 18.5 ל-25 נחשבים כמשקל תקין; מעל 25 - משקל עודף; מעל 30 - השמנת יתר; מעל 40 - השמנה במידה מסוכנת
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.19: בני 65+ ובני 20+ אשר מעשנים סיגרייה אחת לפחות ביום (בהווה), לפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, 2004/2003

אחוזים

כלל האוכלוסייה ⁽¹⁾	75+	74-65	65+	
27.0	6.5	11.9	9.9	סה"כ
				מין
36.1	(8.5)	18.4	14.8	גברים
18.6	(5.2)	6.6	6.0	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
26.6	6.2	11.2	9.3	יהודים ואחרים ⁽²⁾
29.8	..	(21.9)	(20.6)	ערבים
				יבשת מוצא של
				יהודים ואחרים ⁽²⁾
28.8	ישראל
30.3	16.3	16.4	16.4	אסיה
31.1	..	(14.7)	(12.5)	אפריקה
22.8	(4.5)	8.6	6.8	אירופה-אמריקה
30.1	..	(9.0)	(6.0) ⁽³⁾	מזה: עולי בריה"מ לשעבר

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.20: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על שימוש בתרופות ללא מרשם רופא⁽¹⁾, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה ⁽²⁾
סה"כ	47.1	43.2	44.7	36.1
מין				
גברים	39.9	31.9	34.8	27.0
נשים	52.2	52.3	52.3	44.6
קבוצת אוכלוסייה				
יהודים ואחרים ⁽³⁾	48.5	44.4	46.0	37.6
ערבים	..	(26.9)	(21.3)	26.1
יבשת מוצא של יהודים ואחרים⁽³⁾				
ישראל	..	(60.4)	(64.9)	34.7
אסיה	46.3	44.5	45.1	29.2
אפריקה	54.4	31.6	36.2	34.7
אירופה-אמריקה	48.0	46.8	47.3	43.0
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽⁴⁾	37.9	38.4	38.2	41.3
קופת החולים				
כללית	50.7	43.2	46.0	35.8
מכבי	51.4	46.0	47.6	37.2
מאוחדת	(28.5)	41.9	35.6	34.7
לאומית	36.7	43.1	40.3	40.6

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. מדווחים כי לקחו תרופה אחת לפחות שאינה מחייבת מרשם רופא בשבעת הימים שקדמו לריאיון
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.21: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על שימוש בתרופות עם
 מרשם רופא⁽¹⁾, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא
 וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	75+	74-65	65+	
46.4	93.6	81.0	85.8	סה"כ
				מין
38.8	93.6	75.9	82.2	גברים
53.5	93.7	85.2	88.6	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
47.2	93.8	80.8	85.8	יהודים ואחרים ⁽³⁾
41.4	(89.8)	84.4	85.6	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים ⁽³⁾
35.4	..	(55.6)	(60.6)	ישראל
44.4	89.3	80.3	83.0	אסיה
39.2	92.3	74.8	78.3	אפריקה
54.9	94.7	84.1	88.9	אירופה-אמריקה
52.2	95.4	84.8	89.0	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽⁴⁾
				קופת החולים
50.5	95.3	84.2	88.4	כללית
43.8	98.2	79.6	85.2	מכבי
42.2	96.2	73.4	84.0	מאוחדת
41.6	87.1	70.4	77.7	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. מדווחים כי לקחו תרופה אחת לפחות המחייבת מרשם רופא בשבעת הימים שקדמו לריאיון
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.22: בני 65+ וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא בשבועיים האחרונים, לפי מין, גיל, יבשת לידה והתמחות הרופא, 2004/2003

אחוזים		
רופא מומחה	רופא משפחה ⁽¹⁾	
21.8	41.1	סה"כ בני 65+
15.3	23.7	כלל האוכלוסייה⁽²⁾
		מין
21.2	41.3	גברים
22.2	41.0	נשים
		גיל
20.7	38.6	בני 65-74
23.6	45.3	בני 75+
		יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽³⁾
(23.9)	(30.6)	ישראל
(26.3)	46.8	אסיה
..	44.6	אפריקה
(18.9)	38.3	אירופה-אמריקה
(23.7)	45.0	בריה"מ לשעבר ⁽⁴⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות לאומי, 2003/2004

1. רופא משפחה או רופא כללי
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.23: ביקורים של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהלך שנה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, 2004/2003

ממוצע לנפש

רופא משפחה ⁽¹⁾	רופא מומחה	רופא שיניים ⁽²⁾	
בני +65			
15.6	8.0	1.8	סה"כ
17.2	7.6	1.3	גברים
14.3	8.3	2.2	נשים
קבוצות אוכלוסייה			
14.8	8.2	1.8	יהודים ואחרים ⁽³⁾
28.7	3.8	..	ערבים
בני +75			
16.0	8.9	1.1	סה"כ
17.9	9.6	..	גברים
14.8	8.4	..	נשים
כלל האוכלוסייה⁽⁴⁾			
8.4	5.1	2.8	סה"כ
7.9	4.0	2.5	גברים
8.8	6.1	3.1	נשים

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות לאומי

1. רופא משפחה או רופא כללי
2. רופא שיניים, אורטודנט או מומחה לחניכיים
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה

לוח 2.24: ביקורים של בני 65+ אצל רופא מתוך סך הביקורים של כלל האוכלוסייה⁽¹⁾, לפי התמחות הרופא ומין, 2004/2003

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
26.2	29.5	27.6	סה"כ ⁽²⁾
27.9	31.0	29.3	רופא משפחה ⁽³⁾
23.7	26.7	24.8	רופא מומחה
12.3	7.4	10.2	רופא שיניים ⁽⁴⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות לאומי

1. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
2. לא כולל רופא שיניים
3. רופא משפחה או רופא כללי
4. רופא שיניים, אורתודנט או מומחה לחניכיים

לוח 2.25: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על ביצוע בדיקות מעבדה בשבועיים האחרונים לפני הסקר, לפי גיל, 2004/2003

אחוזים

כלל האוכלוסייה*	75+	65-74	65+	
9.2	20.0	(13.6)	16.0	סה"כ

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

* אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה

לוח 2.26: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה⁽¹⁾, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	75+	74-65	65+	
29.8	52.2	49.4	50.5	סה"כ
				מין
23.3	40.0	42.9	42.0	גברים
35.7	61.1	54.2	56.9	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
29.8	52.6	49.5	50.7	יהודים ואחרים ⁽³⁾
30.0	(38.4)	48.3	46.2	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים ⁽³⁾
19.7	..	(48.4)	(47.0)	ישראל
30.3	48.9	51.0	50.4	אסיה
35.6	48.2	61.0	58.4	אפריקה
30.4	53.8	46.0	49.5	אירופה-אמריקה
33.3	58.0	48.6	52.3	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽⁴⁾
				קופת החולים
33.6	53.5	52.8	53.1	כללית
23.3	44.5	43.9	44.1	מכבי
25.7	(36.5)	(35.3)	35.9	מאוחדת
30.5	58.8	39.6	47.9	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. בעיית שינה בשנים עשר החודשים הקודמים לריאיון (שנמשכה שבועיים ויותר)
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.27: בני +65 וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהיו להם אי פעם כאבים, לפי גיל ומין, 2004/2003

אחוזים

	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה*
סה"כ				
כאב כרוני בגב או בצוואר	41.7	40.4	40.9	25.1
כאבי ראש חזקים	26.7	24.6	25.4	23.7
גברים				
כאב כרוני בגב או בצוואר	27.5	33.0	31.1	22.4
כאבי ראש חזקים	(15.0)	16.5
נשים				
כאב כרוני בגב או בצוואר	51.6	46.3	48.4	27.5
כאבי ראש חזקים	34.5	32.6	33.4	30.3

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

* אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה

לוח 2.28: בני +65 וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלה כרונית או שדיווחו כי לקו באירוע מוחי או בהתקף לב, לפי גיל ומין, 2004/2003

שיעורים ל-100 באוכלוסייה

כלל האוכלוסייה*	+75	74-65	+65	
סה"כ				
5.9	11.5	9.9	10.5	מחלת ריאות כרונית
7.2	8.6	7.7	8.0	אסטמה
1.6	8.1	1.6	4.1	מחלה נירולוגית
6.3	15.6	11.1	12.8	מחלה או בעיה בכליות
3.4	10.1	10.1	10.1	סרטן
7.3	13.8	13.5	13.6	מחלה בבלוטת התריס
1.5	8.1	4.8	6.0	דיווחו כי לקו באירוע מוחי
3.6	15.3	12.8	13.8	דיווחו כי לקו בהתקף לב
גברים				
5.6	11.7	8.8	9.8	מחלת ריאות כרונית
6.8	8.6	6.3	7.1	אסטמה
1.5	9.4	..	4.2	מחלה נירולוגית
6.3	15.2	12.8	13.6	מחלה או בעיה בכליות
2.9	12.5	11.0	11.5	סרטן
2.4	5.3	4.5	4.8	מחלה בבלוטת התריס
2.1	13.9	(5.1)	8.2	דיווחו כי לקו באירוע מוחי
5.1	19.9	20.2	20.1	דיווחו כי לקו בהתקף לב
נשים				
6.1	11.4	10.9	11.1	מחלת ריאות כרונית
7.6	8.6	8.9	8.8	אסטמה
1.7	7.1	..	4.0	מחלה נירולוגית
6.3	15.9	9.8	12.2	מחלה או בעיה בכליות
4.0	8.4	9.5	9.1	סרטן
11.7	19.8	20.8	20.4	מחלה בבלוטת התריס
1.0	(4.0)	(4.6)	4.3	דיווחו כי לקו באירוע מוחי
2.3	12.0	6.9	8.9	דיווחו כי לקו בהתקף לב

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

* אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה

לוח 2.29: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל ומין, 2004/2003

שיעורים ל-100 באוכלוסייה

כלל האוכלוסייה*	75+	74-65	65+	
סה"כ				
				מחלת לב
8.7	36.8	23.0	28.2	
20.0	58.6	46.6	51.1	לחץ דם גבוה
8.1	21.9	21.6	21.7	סוכרת או סוכר גבוה בדם
9.7	27.6	21.3	23.7	דלקת מפרקים
גברים				
				מחלת לב
8.7	36.8	23.0	28.2	
17.0	47.5	39.8	42.5	לחץ דם גבוה
7.6	21.6	22.4	22.1	סוכרת או סוכר גבוה בדם
6.2	13.2	13.9	13.7	דלקת מפרקים
7.2	43.5	29.0	34.2	בלוטת ערמונית מוגדלת
נשים				
				מחלת לב
7.8	35.5	19.2	25.6	
22.9	66.4	52.1	57.7	לחץ דם גבוה
8.5	22.1	20.9	21.4	סוכרת או סוכר גבוה בדם
12.9	37.7	27.3	31.4	דלקת מפרקים

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי
* אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה

לוח 2.30: חולים בני +65 ובכלל האוכלוסייה בטיפול בדיאליזה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

שיעור ל-100,000 נפש באוכלוסייה המתאימה, סוף שנה

	2000	1995	1990	
סה"כ בני +65	266	159	106	
גברים	376	243	157	
נשים	185	96	62	
סה"כ בני 65-74	289	185	123	
גברים	375	165	173	
נשים	220	122	81	
סה"כ בני +75	248	127	83	
גברים	383	207	131	
נשים	155	69	43	
כלל האוכלוסייה	52	40	30	
גברים	65	49	36	
נשים	41	31	24	

מקור: משרד הבריאות, חולים בטיפול בדיאליזה בישראל מדדי מעקב, 1989-2001 (פורסם באינטרנט)

לוח 2.31: חולים חדשים המקבלים טיפול בדיאליזה, בקרב בני 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים, סוף שנה

	2001	2000	1995	1990	
סה"כ בני 65+	612	577	331	179	
גברים	361	360	228	122	
נשים	251	217	103	54	
סה"כ בני 65-74	336	314	217	112	
גברים	186	189	144	73	
נשים	150	125	73	37	
סה"כ בני 75+	276	263	114	67	
גברים	175	171	84	49	
נשים	101	92	30	17	
כלל האוכלוסייה	1,090	1,053	696	462	
גברים	657	654	464	297	
נשים	433	399	232	160	

מקור: משרד הבריאות, חולים בטיפול בדיאליזה בישראל מדדי מעקב, 1989-2001 (פורסם באינטרנט)

לוח 2.32: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2003

סוף שנה

85+	84-80	79-75	74-70	69-65	65+	
						מספרים מוחלטים
1,530	2,254	3,098	3,187	2,892	12,961	סה"כ בני 65+
748	1,148	1,625	1,753	1,615	6,889	גברים
782	1,106	1,473	1,434	1,277	6,072	נשים
						שיעורים ל-100,000 נפש
2,169	2,962	2,124	1,770	1,422	1,784	סה"כ בני 65+
2,576	3,489	2,579	2,199	1,724	2,168	גברים סה"כ
145	176	122	103	59	95	מזה: קיבה
544	629	482	314	246	347	מעני גס וחלחולת
165	313	230	236	191	216	ריאה
475	763	560	571	480	537	ערמונית
303	398	246	217	173	221	שלפוחית השתן
72	155	127	110	81	101	לימפומה ממארת
114	97	87	36	51	59	ליקמיה
1,763	2,434	1,668	1,341	1,119	1,400	נשים סה"כ
99	108	66	45	32	51	מזה: קיבה
358	519	325	216	159	239	מעני גס וחלחולת
65	132	98	74	56	73	ריאה
334	434	285	342	321	331	שד
22	51	37	36	27	32	שחלה
45	64	49	28	28	35	שלפוחית השתן
63	152	97	69	56	73	לימפומה ממארת
68	64	44	24	26	34	ליקמיה

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

לוח 2.33: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני +65, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, 1999-2003⁽¹⁾
שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

2003	2002	2001	2000	1999	
גברים					
2,235	2,304	2,348	2,230	2,248	סה"כ יהודים ואחרים ⁽²⁾
98	101	100	107	98	מזה: קיבה
357	385	386	370	402	מעג גס וחלחולת
214	227	231	228	243	ריאה
557	547	532	470	465	ערמונית
227	242	236	222	242	שלפוחית השתן
103	102	96	117	105	לימפומה ממארת
61	49	64	78	50	ליקמיה
1,568	1,463	1,487	1,215	1,388	סה"כ ערבים
52	66	49	48	66	מזה: קיבה
247	175	144	127	174	מעג גס וחלחולת
256	338	316	247	328	ריאה
238	202	255	226	200	ערמונית
205	202	160	99	137	שלפוחית השתן
74	38	84	63	40	לימפומה ממארת
34	17	49	58	38	ליקמיה
נשים					
1,450	1,545	1,623	1,600	1,559	סה"כ יהודיות ואחרות ⁽²⁾
77	48	59	54	45	מזה: קיבה
202	274	266	278	271	מעג גס וחלחולת
77	78	93	90	90	ריאה
381	368	357	396	384	שד
36	36	39	40	42	שחלה
36	43	42	39	47	שלפוחית השתן
62	74	91	82	76	לימפומה ממארת
41	32	47	43	35	ליקמיה
821	665	711	728	759	סה"כ ערביות
59	30	21	25	31	מזה: קיבה
106	116	82	106	97	מעג גס וחלחולת
43	35	31	19	52	ריאה
104	130	147	115	190	שד
16	13	13	27	14	שלפוחית השתן

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

1. כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. נתונים לשנים קודמות אינם עם אלו שפורסמו בעבר. ההבדל נובע מרישומי מחלה ותעודות פטירה שהגיעו מאוחר ותיקונים שנעשו בעקבות כך

לוח 2.34: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים*
בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2003

סוף שנה

	75+	74-70	69-65	65+	
מספרים מוחלטים					
	6,772	3,133	2,768	12,673	סה"כ יהודים ואחרים בני +65
	3,442	1,708	1,544	6,694	גברים
	3,330	1,425	1,224	5,979	נשים
שיעורים ל-100,000 נפש					
גברים					
	2,991	1,533	2,426	2,332	ילידי ישראל
	3,027	2,697	1,745	2,384	ילידי אירופה-אמריקה
	2,529	2,377	1,594	2,086	ילידי אסיה
	2,764	1,761	1,895	2,105	ילידי אפריקה
נשים					
	1,811	1,242	1,712	1,606	ילידות ישראל
	1,960	1,763	1,128	1,548	ילידות אירופה-אמריקה
	1,626	1,261	1,055	1,277	ילידות אסיה
	1,566	1,070	1,089	1,220	ילידות אפריקה

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות
* כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.35: אומדן בני +65 יהודים ואחרים⁽¹⁾ הסובלים מדמנטיה, 2002
סוף שנה

סה"כ	בקהילה	במוסדות ⁽²⁾	
116.8	98.1	18.7	אלפים
100.0	84.0	16.0	אחוזים
19.0	16.7	69.8	אחוז מתוך האוכלוסייה המתאימה

מקור: ורטמן, א'; ברודסקי, ג'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2005, קשישים הלוקים בדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, מאיירס-גוינט-מכון ברוקדייל

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת (ראו מבוא)

2. כולל: בתי אבות, בתי חולים לחולים כרוניים ומחלקות סיעודיות

לוח 2.36: אומדן בני 65+ יהודים ואחרים⁽¹⁾ הגרים בקהילה אשר סובלים מדמנטיה, לפי חומרת המחלה, גיל ומין, 2002

אחוזים, סוף שנה

	רמת החומרה של המחלה				סה"כ חולים	
	גבוהה	בינונית	קלה	סה"כ ⁽²⁾		
						גיל
	30.0	24.0	47.0	100.0	16.7	בני 65+
	34.0	28.0	39.0	100.0	23.8	בני 75+
	27.0	9.0	64.0	100.0	9.7	69-65
	18.0	22.0	59.0	100.0	12.6	74-70
	41.0	23.0	36.0	100.0	19.2	79-75
	12.0	42.0	47.0	100.0	17.4	84-80
	39.0	24.0	37.0	100.0	46.6	בני 85+
						מין
	28.0	28.0	44.0	100.0	13.6	גברים
	31.0	22.0	48.0	100.0	19.0	נשים

מקור: ורטמן, א'; ברודסקי, ג'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2005, קשישים הלוקים בדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, מאיירס-גיוינט-מכון ברוקדייל

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת
2. הנתונים לגבי חומרת המחלה מתייחסים ל-95% מבני 65+ הגרים בקהילה שעבורם התקבל דיווח בנוגע לכך

לוח 2.37: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיה גופנית⁽¹⁾, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	75+	74-65	65+	
9.9	34.2	19.4	25.0	סה"כ
				מין
8.0	25.6	13.0	17.5	גברים
11.7	40.2	24.6	30.7	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
9.2	34.2	18.7	24.7	יהודים ואחרים ⁽³⁾
15.2	(33.9)	(29.3)	30.2	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים⁽³⁾
2.1	ישראל
10.4	36.0	28.5	30.8	אסיה
11.7	(41.5)	33.3	35.0	אפריקה
9.8	33.6	12.4	22.0	אירופה-אמריקה
12.4	47.8	15.1	27.9	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽⁴⁾
				קופת החולים
12.7	33.7	22.4	26.7	כללית
6.1	33.0	(14.4)	20.0	מכבי
5.3	(34.4)	..	(19.8)	מאוחדת
8.4	36.5	..	21.6	לאומית

מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי

1. בעיה שנמשכת 6 חודשים או יותר, עקב מחלה, תאונה או מלידה וגורמת כיום קושי גדול או גדול מאוד בביצוע פעולות יום-יומיות כמו ניקיון הבית או קניות
2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.38: אומדנים* של מידת יכולתם של בני +65 הגרים בקהילה לבצע פעולות יום-יומיות ללא עזרה, 2005

אחוזים, סוף שנה

לא יכול	יכול אך בקושי	יכול ללא קושי	סה"כ	
6.7	14.6	78.7	100.0	להתלבש
11.6	13.8	74.5	100.0	להתקלח או להתרחץ
2.7	6.0	91.4	100.0	לאכול
4.0	15.3	80.8	100.0	להיכנס למיטה ולצאת ממנה
4.0	15.4	80.5	100.0	להתיישב על כיסא ולקום ממנו

מקור: משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה

* לגבי מקור האומדנים ראו במבוא

לוח 2.39: אומדנים⁽¹⁾ של מידת הניידות של בני +65 הגרים בקהילה, 2005

אחוזים, סוף שנה

מסוגל להיות נייד/לניידות				
סה"כ	ללא עזרת אדם או מכשיר (מקל, מכוון)	בעזרת מכשיר	בעזרת אדם	
			אחר או יושב מרותק	בניסא גלגלים לבית
100.0	71.2	7.7	7.8	13.3
100.0	95.4	2.7	2.7	1.9

ניידות מחוץ לבית⁽²⁾

ניידות בתוך הבית

מקור: משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה

1. לגבי מקור האומדנים ראו במבוא

2. יכולת ללכת (להסתובב) מרחק של 400 מטר

לוח 2.40: אומדן⁽¹⁾ בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היום-יומיות (ADL)⁽²⁾, 2005

אחוזים, סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
19.8	12.0	16.5	כלל בני 65+
			גיל
7.9	5.0	6.6	בני 74-65
14.4	10.8	12.9	בני 79-75
46.8	30.0	40.2	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
18.5	11.4	15.5	יהודים ואחרים ⁽³⁾
20.6	10.7	16.7	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽⁴⁾
40.0	19.8	30.6	ערבים
			יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽³⁾
21.0	14.0	17.9	אסיה-אפריקה
17.6	10.2	14.5	אירופה-אמריקה וישראל

מקור: משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה

1. לגבי מקור האומדנים - ראו במבוא
2. כולל שתי אוכלוסיות:
 - (א) קשישים הגרים בקהילה הזקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, נידות בתוך הבית;
 - (ב) קשישים דיירי מוסדות לטיפול ממושך: תשושים סיעודיים ותשושי נפש
3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.41: אומדן⁽¹⁾ בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היום-יומיות (ADL), שנים נבחרות

סוף שנה

אחוז המוגבלים מתוך בני 65+ ⁽²⁾	אחוזים	אלפים	
1990			
13.2	100.0	58.3	סה"כ מוגבלים
11.0	80.1	46.7	בקהילה ⁽³⁾
67.2	19.9	11.6	במוסדות לטיפול ממושך ⁽⁴⁾
1999			
14.5	100.0	88.4	סה"כ מוגבלים
11.8	78.1	69.0	בקהילה ⁽³⁾
77.7	21.9	19.4	במוסדות לטיפול ממושך ⁽⁴⁾
2005			
16.5	100.0	114.3	סה"כ מוגבלים
13.2	76.7	87.6	בקהילה ⁽³⁾
95.2	23.3	26.7	במוסדות לטיפול ממושך ⁽⁴⁾

מקור: משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה

1. לגבי מקור האומדנים - ראו במבוא לפרק זה ב"הגדרות והסברים"
2. מתוך האוכלוסייה המתאימה
3. זקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, ניידות בתוך הבית
4. דיירים תשושים, סיעודיים ותשושי נפש

לוח 2.42: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2005

מספרים מוחלטים

סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל	
בני +65				
סה"כ	83	295	1,527	
גברים	53	149	863	
נשים	30	146	664	
בני 65-74				
סה"כ	30	124	1,001	
גברים	15	63	572	
נשים	15	61	429	
בני +75				
סה"כ	53	171	526	
גברים	38	86	291	
נשים	15	85	235	
בני +65 לפי מעמד הנפגע				
הולך רגל	48	198	431	
נהג רכב	16	37	593	
נוסע ברכב	15	47	459	
אחר	4	13	44	
בני +65 לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	72	267	1,365	
ערבים	10	22	126	
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	448	2,352	32,673	
גברים	322	1,588	19,964	
נשים	126	764	12,709	

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.43: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2005
שיעורים ל-100,000 נפש

פצועים קשה	פצועים קל	הרוגים	סה"כ	
				בני +65
222	43	12	277	סה"כ
294	51	18	363	גברים
168	37	8	213	נשים
				בני 65-74
269	33	8	310	סה"כ
343	38	9	390	גברים
209	30	7	246	נשים
				בני +75
167	54	17	238	סה"כ
230	68	30	328	גברים
124	45	8	177	נשים
				קבוצת אוכלוסייה*
219	43	12	273	יהודים
283	49	22	354	ערבים
				כלל האוכלוסייה
471	34	6	512	סה"כ
583	46	9	639	גברים
362	22	4	388	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; שנתון סטטיסטי * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.44: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות
 שיעורים ל-100,000 נפש

מזה: הרוגים		סה"כ נפגעים		
כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	
9	24	442	378	1985
9	23	594	459	1990
9	23	818	408	1996
9	21	814	385	1997
9	21	826	379	1998
8	18	743	363	1999
8	12	584	219	2001
8	16	581	290	2002
7	12	554	273	2003
7	13	542	283	2004
4	12	512	277	2005

מקור: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.45: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2005

חומרת התאונות				
קלות	קשות	קטלניות	סה"כ	
1,448	147	30	1,625	מספרים מוחלטים
				נהגים מעורבים בני 65+
				גיל
1,016	97	15	1,128	בני 65-74
432	50	15	497	בני 75+
				מין
1,232	125	27	1,384	גברים
216	22	3	241	נשים
				כלל הנהגים המעורבים
28,403	2,900	619	31,922	סה"כ ⁽¹⁾
20,921	2,380	544	23,845	גברים
6,735	443	55	7,233	נשים
				שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾
				בני 65+
71	7	1	80	סה"כ
83	8	2	93	גברים
39	4	1	43	נשים
				כלל הנהגים
92	9	2	104	סה"כ
114	13	3	129	גברים
55	4	0	59	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מצבת הנהגים בישראל

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2004 ובסוף 2005

לוח 2.46: ביקורים בחדרי מיון* של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, 2002

שיעור ביקורים ל-1,000 נפש	אחוז הביקורים של בני +65 מתוך כלל הביקורים	מספר ביקורים	
644	17.0	416,512	כלל בני +65
			גיל
524	7.2	176,151	בני 65-74
766	6.8	167,089	בני 75-84
1,139	3.0	73,272	בני +85
380		2,452,101	כלל האוכלוסייה

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)
 * מבוסס על דיווח של 28 חדרי מיון בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים כוללים את הביקורים בכל חדרי המיון במוסדות לאשפוז כללי פרט לביקורים בחדרי מיון בבתי חולים במזרח ירושלים

לוח 2.47: סיבות כניסה לחדרי מיון* של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2002

אחוזים

אחוז מכלל הסיבות		סה"כ	
סיבות חיצוניות	מחלות		
סה"כ			
10.7	89.3	100.0	כלל בני +65
11.3	88.7	100.0	בני 65-74
9.8	90.2	100.0	בני 75-84
11.1	88.9	100.0	בני +85
27.9	72.1	100.0	כלל האוכלוסייה
גברים			
9.5	90.5	100.0	כלל בני +65
10.6	89.4	100.0	בני 65-74
8.3	91.7	100.0	בני 75-84
9.3	90.7	100.0	בני +85
36.0	64.0	100.0	כלל האוכלוסייה
נשים			
11.7	88.3	100.0	כלל בני +65
12.1	87.9	100.0	בני 65-74
11.0	89.0	100.0	בני 75-84
12.4	87.6	100.0	בני +85
18.8	81.2	100.0	כלל האוכלוסייה

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)
 * מבוסס על דיווח של 19 בתי חולים בבעלות ממשלתית, עירונית-ממשלתית ובעלותה של שירותי בריאות כללית, הכוללים 85% מכלל הביקורים בחדרי מיון בשנת 2002

לוח 2.48: ביקורים בחדרי מיון* עקב סיבות חיצוניות של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2002

אחוזים

פגיעה לא מכוונת/ כוונה לא ברורה	פגיעה מכוונת	פעולת איבה	תאונות עבודה	תאונות דרכים	סה"כ	
84.6	1.9	0.3	1.8	11.4	100.0	כלל בני +65
75.5	2.7	0.4	3.6	17.8	100.0	בני 74-65
89.0	1.5	0.2	0.7	8.6	100.0	בני 84-75
96.6	0.9	0.1	0.0	2.4	100.0	בני +85
60.0	3.7	0.5	10.8	25.0	100.0	כלל האוכלוסייה

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)
 * מבוסס על דיווח של 19 בתי חולים בבעלות ממשלתית, עירונית-ממשלתית ובעלותה של שירותי בריאות כללית, הכוללים 85% מכלל הביקורים בחדרי מיון בשנת 2002

לוח 2.49: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המדווחים על אשפוז בבית חולים⁽¹⁾, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים, 2004/2003

אחוזים				
כלל האוכלוסייה ⁽²⁾	75+	74-65	65+	
13.9	25.1	23.2	24.0	סה"כ
				מין
13.1	24.1	27.4	26.2	גברים
14.7	25.9	19.8	22.2	נשים
				קבוצת אוכלוסייה
13.6	24.9	23.0	23.7	יהודים ואחרים ⁽³⁾
15.9	..	(26.2)	(27.9)	ערבים
				יבשת מוצא של יהודים ואחרים ⁽³⁾
12.6	ישראל
13.1	(24.3)	18.7	20.4	אסיה
15.0	(24.9)	26.5	26.2	אפריקה
13.6	24.9	23.9	24.3	אירופה-אמריקה
12.3	25.3	21.2	22.8	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽⁴⁾
				קופת החולים
16.7	29.6	26.0	27.4	כללית
10.5	(14.8)	(16.0)	15.6	מכבי
12.0	(25.2)	..	(19.6)	מאוחדת
11.4	..	(24.3)	(17.3)	לאומית

- מקור: למ"ס, משרד הבריאות, סקר בריאות לאומי
1. אשפוז בשנים עשר החודשים הקודמים לריאיון, לצורך ניתוח או טיפול רפואי במסגרת אשפוז או אשפוז יום
 2. אוכלוסיית הסקר היא בני 21 ומעלה
 3. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
 4. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.50: אשפוזים⁽¹⁾ של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות כלליות, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

	2002	2001	⁽²⁾ 2000	1995	1990	
בני 65+						
סה"כ	543	546	527	483	407	
גברים	626	629	609	567	471	
נשים	481	486	467	418	354	
בני 65-74						
סה"כ	423	433	420	402	342	
גברים	502	508	496	479	401	
נשים	360	373	360	343	294	
בני 75+						
סה"כ	689	687	664			
גברים	793	791	764			
נשים	619	617	596			
בני 75-84						
סה"כ	628	632	609	573	477	
גברים	726	729	707	673	548	
נשים	559	564	539	499	419	
בני 85+						
סה"כ	900	868	840	717	586	
גברים	1,042	1,010	956	826	671	
נשים	814	780	766	638	521	
כלל האוכלוסייה						
סה"כ	155	156	150	144	123	
גברים	155	156	151	142	122	
נשים	155	157	150	146	125	

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים בבתי חולים לאשפוז כללי, 1995

- שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד
- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך-הכול כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)

לוח 2.51: אשפוזים⁽¹⁾ של בני 65+ במחלקות כלליות מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות
אחוזים

	2002	2001	2000 ⁽²⁾	1995	1990	
בני 65+						
סה"כ	34.5	34.2	34.3	31.9	30.0	
גברים	34.4	34.1	34.2	33.1	31.8	
נשים	34.6	34.3	34.4	30.9	28.2	
בני 75+						
סה"כ	19.7	19.2	19.0	15.9	15.4	
גברים	18.5	18.2	18.1	16.1	16.1	
נשים	20.7	20.1	19.9	15.8	14.7	
בני 85+						
סה"כ	5.8	5.7	5.8	4.1	3.0	
גברים	5.1	5.1	5.2	4.0	3.1	
נשים	6.4	6.2	6.4	4.1	3.0	

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

- שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד
- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך-הכול כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)

לוח 2.52: בני +65 מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות

אחוזים

2002	2001	⁽¹⁾ 2000	1995	1990	
34.5	34.2	34.3	31.9	30.0	כלל המחלקות הכלליות ⁽²⁾
58.9	58.2	58.3	57.9	55.2	פנימית
45.9	45.8	45.9	48.0	46.4	ריאות
96.4	96.2	95.9	91.8	79.4	גריאטרייה אקוטית
33.5	32.7	34.1	34.9	33.7	נירולוגיה
38.4	37.5	38.2	38.0	38.5	אונקולוגיה
29.9	32.3	32.1	33.7	31.1	עור ומין
6.4	4.4	4.0			השתלת מוח עצם
49.3	48.3	47.0	47.2	43.8	טיפול נמרץ כללי
49.7	50.4	50.2	45.3	44.4	טיפול נמרץ לב
73.5	71.8	73.9	52.7	47.2	טיפול נמרץ נשימתי
26.5	26.5	27.0	27.5	26.2	כירורגייה כללית
32.8	33.0	32.4	30.0	25.2	אורתופדיה
41.8	40.7	40.3	40.4	41.7	אורולוגיה
29.9	27.9	28.8	22.6	23.7	נירוכירורגייה
49.3	47.9	47.4	43.8	36.4	כירורגייה חזה ולב
56.4	57.0	56.2	49.4	45.8	כירורגייה כלי דם
29.5	29.1	28.2	15.1	22.0	כירורגייה פלסטית
60.3	60.0	58.3	55.5	56.4	עיניים
13.0	12.4	12.8	10.6	10.0	אף-אוזן-גרון
13.1	12.9	11.8	14.8	15.1	פה ולסת
4.7	4.5	4.1	5.5	4.0	נשים
31.9	33.8	36.3	38.9	39.7	השהיה

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים";

למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

1. הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים", המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (כלל המחלקות הכלליות), ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי).
2. לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות.

לוח 2.53: התפלגות האשפוזים בקרב בני +65 במחלקות כלליות, לפי מין, 2002⁽¹⁾

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	כלל המחלקות הכלליות ⁽²⁾
54.6	52.6	53.6	פנימית
0.4	0.5	0.4	ריאות
5.1	3.7	4.4	גריאטרייה אקוטית
1.4	1.6	1.5	נירולוגיה
1.0	1.3	1.1	אונקולוגיה
0.4	0.4	0.4	עור ומין
0.0	0.0	0.0	השתלת מוח עצם
1.4	1.6	1.5	טיפול נמרץ כללי
2.6	4.2	3.4	טיפול נמרץ לב
0.1	0.1	0.1	טיפול נמרץ נשימתי
11.6	12.3	12.0	כירורגייה כללית
6.2	3.2	4.8	אורתופדיה
1.4	6.0	3.7	אורולוגיה
0.5	0.6	0.5	נירוכירורגייה
1.2	2.1	1.6	כירורגייה חזה ולב
1.0	1.9	1.4	כירורגייה כלי דם
0.6	0.8	0.7	כירורגייה פלסטית
5.2	3.9	4.6	עיניים
0.9	1.1	1.0	אף-אוזן-גרון
0.1	0.1	0.1	פה ולסת
2.2	0.0	1.1	נשים
2.3	1.8	2.1	השהיה

- מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"
- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך-הכול כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
 - לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות

לוח 2.54: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי, 2002⁽¹⁾

ימים

כלל האוכלוסייה			בני 65+			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
4.3	4.5	4.4	5.9	5.7	5.8 ⁽²⁾	כלל המחלקות הכלליות
4.6	4.2	4.4	5.1	4.9	5.0	פנימית
9.0	12.0	10.7	9.1	8.9	8.9	ריאות
12.1	11.2	11.7	11.9	11.1	11.5	גריאטרייה אקוטית
6.0	6.1	6.1	7.8	7.9	7.9	נירולוגיה
6.8	6.0	6.4	8.6	7.3	7.9	אונקולוגיה
7.6	8.2	7.9	9.4	9.8	9.6	עור ומין
12.6	11.7	12.0	7.8	9.3	8.8	השתלת מוח עצם
5.8	6.2	6.0	6.6	7.0	6.8	טיפול נמרץ כללי
2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	טיפול נמרץ לב
9.1	8.0	8.5	10.0	8.6	9.3	טיפול נמרץ נשימתי
2.9	3.2	3.0	4.8	4.7	4.7	כירורגייה כללית
6.2	5.0	5.5	8.0	7.7	7.9	אורתופדיה
4.5	4.4	4.4	5.2	5.3	5.3	אורולוגיה
7.7	7.3	7.5	9.2	8.7	8.9	נירוכירורגייה
7.3	6.9	7.0	8.2	7.5	7.8	כירורגייה חזה ולב
4.7	5.3	5.1	5.4	5.6	5.6	כירורגייה כלי דם
5.7	6.5	6.1	7.6	5.3	6.3	כירורגייה פלסטית
2.7	2.9	2.8	2.5	2.6	2.6	עיניים
3.2	3.1	3.1	4.6	4.4	4.5	אף-אוזן-גרון
3.6	3.7	3.6	4.1	3.9	4.0	פה ולסת
2.4	1.2	2.4	4.1	1.0	4.1	נשים
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	השהיה

מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"

- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים", המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (כלל המחלקות הכלליות), ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
- לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל שהייה במחלקות יולדות

לוח 2.55: שחרורים מאשפוז כללי* של בני +65, לפי גיל ומין ולפי מחוז ונפה, 2002-2000
 סוף שנה, שיעורים ל-1,000 תושבים

+75			74-65			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
568.1	726.9	632.5	338.8	464.7	394.4	סה"כ
563.1	673.8	608.6	312.4	406.7	354.5	מחוז ירושלים
587.8	733.8	648.1	393.0	503.1	442.3	מחוז הצפון
613.7	798.6	692.0	397.0	543.2	464.4	נפת צפת
735.0	922.1	814.6	407.1	533.7	463.8	נפת כנרת
450.6	609.3	514.8	343.2	441.1	386.5	נפת יזרעאל
682.7	793.0	728.1	437.3	546.9	486.4	נפת עכו
490.8	632.7	548.3	312.8	421.8	360.2	מחוז חיפה
471.2	617.1	530.0	295.5	406.1	343.2	נפת חיפה
576.4	698.0	626.6	374.0	473.9	418.8	נפת חדרה
625.8	815.9	701.2	358.5	493.5	419.0	מחוז המרכז
572.1	772.9	653.3	356.5	479.7	410.8	נפת השרון
648.7	860.4	731.7	341.7	500.5	412.9	נפת פתח תקווה
704.0	869.1	772.1	423.5	557.5	483.8	נפת רמלה
616.6	779.7	680.3	351.9	469.1	404.9	נפת רחובות
571.1	740.2	641.0	314.6	463.1	378.2	מחוז תל אביב
549.5	694.3	606.7	359.0	482.1	414.3	מחוז הדרום
555.0	697.9	611.3	354.9	477.5	409.8	נפת אשקלון
543.0	690.0	601.1	363.8	487.3	419.5	נפת באר שבע
419.9	635.4	500.2	259.3	364.0	312.0	אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)
 * לא כולל יולדות

לוח 2.56: שחרורים מאשפוז כללי* של בני +65, לפי גיל ומין ולפי רשות מקומית, 2002-2000

סוף שנה, שיעורים ל-1000 תושבים

75+			74-65			סה"כ
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
568.1	726.9	632.5	338.8	464.7	394.4	סה"כ
עיריות ומועצות מקומיות						
773.0	638.7	696.6	424.2	610.6	507.6	אבו סנאן
608.8	714.9	663.7	507.2	441.3	477.8	אום אל-פחם
478.6	617.9	535.6	296.1	408.3	345.3	אופקים
705.9	834.7	755.8	509.8	589.7	545.8	אור יהודה
654.6	806.7	708.6	422.9	537.4	471.3	אור עקיבא
401.1	533.5	446.1	370.7	542.3	450.1	אילת
311.4	667.4	494.4	509.8	571.6	534.7	אכסאל
667.1	934.9	808.1	685.1	529.6	594.6	אלעד
867.8	828.3	849.1	522.7	583.9	550.3	אעבלין
443.3	552.1	478.1	201.4	419.3	294.5	אריאל
449.4	566.4	494.4	308.5	428.5	362.2	אשדוד
705.5	856.9	764.4	423.4	546.0	478.2	אשקלון
737.6	705.1	722.9	562.4	678.7	615.8	באקה אל-גרביה
558.2	723.4	621.9	369.5	510.5	431.7	באר שבע
488.8	661.6	561.8	345.7	452.2	394.0	בית שאן
564.2	626.7	588.4	334.1	484.4	400.5	בית שמש
805.2	892.8	843.7	217.8	747.2	508.5	ביתר עילית
699.1	862.4	767.9	398.6	585.7	478.5	בני ברק
534.4	715.3	608.9	331.6	469.9	391.9	בת ים
459.9	809.1	612.0	458.0	382.9	418.8	גבעת זאב
468.1	809.6	620.9	264.1	487.1	367.1	גבעת שמואל
528.3	676.4	595.2	236.5	395.6	303.0	גבעתיים
1,091.6	836.9	982.1	911.0	734.9	825.3	גידידה-מכר
393.4	496.1	428.5	371.9	520.9	438.0	גדרה

מקור למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

* לא כולל יולדות



לוח 2.56: שחרורים מאשפוז כללי* של בני +65, לפי גיל ומין ולפי רשות מקומית, 2000-2002 (המשך)

סוף שנה, שיעורים ל-1000 תושבים

75+			74-65			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
521.1	833.3	620.2	318.9	533.1	430.4	גן יבנה
493.4	688.6	570.6	271.7	445.4	356.4	גני תקווה
904.9	1,019.1	970.0	588.0	524.0	561.5	גיסר א-זרקא
287.2	397.2	352.6	335.8	401.4	368.3	דאלית אל-כרמל
600.6	785.7	667.9	410.0	490.9	445.7	דימונה
778.6	1,042.0	882.8	362.4	553.7	448.6	הוד השרון
528.7	693.0	595.4	274.8	395.2	330.4	הרצליה
464.7	687.5	555.8	278.4	434.5	350.5	זכרון יעקב
619.6	723.3	660.8	354.1	490.1	414.8	חדרה
592.1	738.5	652.7	321.1	467.4	387.1	חולון
485.0	642.2	548.6	295.3	398.3	339.1	חיפה
863.0	1,043.0	939.0	436.7	562.0	491.9	טבריה
530.3	951.3	728.4	462.5	625.0	530.0	טורעאן
678.7	867.7	766.3	588.4	723.3	649.6	טייבה
636.0	847.3	723.1	514.9	518.3	516.5	טירה
501.1	611.2	546.4	276.9	455.1	355.6	טירת כרמל
497.4	750.0	618.7	423.8	428.2	425.8	טמרה
630.2	695.0	655.5	409.7	547.1	469.8	יבנה
590.2	955.7	730.9	348.1	501.6	417.2	יהוד
574.9	608.9	589.6	384.4	389.9	387.0	יפיע
378.4	449.5	404.7	281.7	367.7	319.3	יקנעם עילית
573.7	685.3	619.6	311.6	402.9	352.0	ירושלים
696.8	550.0	616.3	411.1	491.7	450.5	ירכא
887.1	604.2	758.7	421.7	555.4	482.2	כפר יונה
689.6	682.9	686.2	621.9	643.9	630.7	כפר כנא
495.2	976.3	725.9	357.1	572.8	440.0	כפר מנדא
649.2	828.2	718.1	360.6	508.7	425.6	כפר סבא

מקור למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

* לא כולל יולדות



לוח 2.56: שחרורים מאשפוז כללי* של בני +65, לפי גיל ומין ולפי רשות מקומית, 2000-2002 (המשך)

סוף שנה, שיעורים ל-1000 תושבים

75+			74-65			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
442.2	870.5	605.0	410.4	625.5	494.4	כפר קאסם
656.1	1,125.4	886.2	577.5	643.2	608.5	כפר קרע
477.1	595.9	521.0	317.1	442.7	372.1	כרמיאל
653.2	817.6	718.1	435.4	583.3	500.2	לוד
355.0	541.9	434.9	367.0	414.4	393.6	מבשרת ציון
509.1	538.1	522.7	434.7	632.0	521.4	מגאר
821.0	666.8	753.3	547.8	681.2	610.9	מגיד אל כרום
423.5	595.3	486.1	309.8	403.9	350.9	מגדל העמק
446.4	721.5	572.6	218.7	351.1	284.2	מודיעין
43.5	45.1	44.2	75.8	23.0	49.2	מודיעין עילית
572.7	278.5	463.3	222.1	362.9	296.4	מכבים-רעות
628.6	1,221.5	855.1	438.5	531.0	482.8	מעלה אדומים
302.5	544.6	443.7	365.0	288.4	331.0	מעלה עירון
537.3	713.3	601.5	372.6	509.2	432.7	מעלות-תרשיחא
878.6	1,043.2	938.6	427.5	622.7	514.4	נהריה
661.7	755.4	699.1	358.8	553.3	444.8	נס ציונה
697.0	819.0	746.1	539.8	623.9	577.5	נצרת
413.0	548.0	465.1	283.3	377.9	324.2	נצרת עילית
494.3	667.5	557.1	336.0	448.8	386.9	נשר
557.0	585.9	569.2	366.2	502.8	428.4	נתיבות
567.3	767.9	647.5	333.6	462.1	389.3	נתניה
671.9	550.9	605.4	527.7	643.6	579.3	סחינין
700.0	816.6	744.6	480.6	598.2	532.5	עכו
438.2	611.8	502.5	289.7	419.4	347.9	עפולה
630.6	620.0	625.2	400.4	506.1	447.8	עראבה
436.9	558.2	485.3	316.4	473.1	383.5	ערד
612.1	776.8	700.9	413.0	430.3	420.6	ערערה

מקור למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

* לא כולל יולדות



לוח 2.56: שחרורים מאשפוז כללי* של בני +65, לפי גיל ומין ולפי רשות מקומית, 2000-2002 (המשך)

סוף שנה, שיעורים ל-1000 תושבים

75+			74-65			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
534.3	626.3	584.6	353.3	726.5	569.5	ערעה-בנגב
557.9	624.0	583.2	364.6	482.9	417.1	פרדס חנה-כרכור
686.0	893.3	766.9	346.0	521.1	422.7	פתח תקווה
629.9	833.0	714.1	424.0	612.1	508.5	צפת
529.4	941.7	706.4	507.7	783.1	646.4	קלנסווה
512.0	701.9	587.5	277.4	405.1	333.9	קריית אונו
468.7	653.4	542.9	330.6	452.6	384.1	קריית אתא
459.3	556.0	499.8	251.2	385.1	310.1	קריית ביאליק
536.0	671.2	589.9	334.7	448.3	384.0	קריית גת
471.6	606.3	522.2	304.0	430.8	359.7	קריית טבעון
428.6	540.0	471.3	309.8	410.5	352.4	קריית ים
416.0	527.1	462.4	262.6	396.7	321.1	קריית מוצקין
583.2	697.1	631.3	309.7	475.3	387.1	קריית מלאכי
538.4	673.4	591.8	352.9	488.5	412.4	קריית שמונה
666.6	905.3	759.4	360.8	514.7	434.9	ראש העין
685.1	850.1	748.4	361.2	479.0	414.3	ראשון לציון
844.0	852.4	848.9	579.9	436.8	503.5	רהט
544.8	718.1	614.4	324.8	430.3	372.0	רחובות
797.7	905.4	858.5	487.9	474.9	482.3	ריינה
714.5	933.4	806.5	444.7	598.6	512.5	רמלה
499.1	652.8	565.7	267.1	414.8	328.3	רמת גן
457.1	580.8	513.2	237.3	373.7	302.0	רמת השרון
572.8	734.7	633.5	331.5	439.6	380.6	רעננה
574.8	901.3	696.8	430.2	554.2	485.7	שדרות
403.4	405.2	404.0	251.1	286.4	271.3	שוהם
693.9	680.9	688.0	404.3	455.7	429.4	שפרעם
583.1	774.2	659.9	328.6	489.4	394.2	תל אביב-יפו
631.2	920.3	725.1	654.0	932.9	790.8	תל שבע

מקור למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

* לא כולל יולדות



לוח 2.56: שחרורים מאשפוז כללי* של בני +65, לפי גיל ומין ולפי רשות מקומית, 2000-2002 (המשך)

סוף שנה, שיעורים ל-1000 תושבים

75+			74-65			מועצות אזוריות
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
435.1	598.7	512.8	369.2	457.9	401.9	אל-בטוף
476.3	815.9	592.0	481.0	384.7	430.7	אלונה
873.1	1,195.3	959.5	190.9	189.3	190.1	אפעל
541.9	626.4	578.4	252.9	378.6	315.9	אשכול
633.0	729.2	680.9	342.9	481.1	407.8	באר טוביה
(131.7)	607.3	296.3	174.3	359.5	250.5	בוסתן אל-מרג'י
404.2	622.5	509.5	263.4	406.5	328.1	בני שמעון
419.7	583.8	485.8	300.6	444.4	369.1	בקעת בית שאן
764.2	950.9	847.4	283.9	419.7	354.4	ברנר
570.2	472.5	527.1	366.7	409.8	387.2	גדרות
369.6	1,582.7	739.3	(290.9)	462.4	372.0	גולן
(92.7)	(141.4)	106.2	170.6	(36.6)	98.4	גוש עציון
670.3	864.5	759.3	413.8	435.7	424.4	גזר
706.2	1,499.5	1,021.9	346.4	415.7	381.9	גן רווה
499.3	821.3	639.8	257.1	360.5	309.0	דרום השרון
400.0	628.1	491.6	242.8	424.1	330.3	הגלבוש
592.8	745.9	655.1	246.8	357.5	303.1	הגליל העליון
456.1	818.0	625.3	281.6	582.3	422.9	הגליל התחתון
..	(222.3)	(203.2)	הערבה התיכונה
..	..	(128.0)	(117.6)	הר חברון
435.8	611.6	505.1	371.5	392.1	381.9	זבולון
769.3	1,117.8	875.1	1,481.5		571.4	חבל אילות
439.6	908.6	643.5	425.7	450	437.3	חבל יבנה
540.5	664.0	596.7	360.5	521.6	429.3	חבל מודיעין
630.0	858.5	727.6	(431.7)	513.1	467.2	חוף אשקלון
350.2	556.6	445.5	249.4	262.7	255.1	חוף הכרמל

מקור למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

* לא כולל יולדות

לוח 2.56: שחרורים מאשפוז כללי* של בני +65, לפי גיל ומין ולפי רשות מקומית, 2000-2002 (המשך)

סוף שנה, שיעורים ל-1000 תושבים

	75+			74-65		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
חוף השרון	500.4	837.5	622.9	347.7	411.4	374.9
חוף עזה	(135.3)	(711.5)	353.2	(109.1)	(104.4)	(106.7)
יואב	527.0	733.8	607.9	320.7	404.7	360.3
לב השרון	555.7	725.3	635.4	281.1	507.0	384.0
לכיש	545.5	754.8	654.7	512.6	525.1	518.8
מבואות החרמון	842.7	877.6	858.8	504.3	732.4	609.7
מגידו	336.9	449.9	382.3	204.6	329.7	266.3
מטה אשר	686.4	843.1	757.7	441.9	425.1	434.8
מטה בנימין	189.4	295.9	229.2	156.7	211.5	186.4
מטה יהודה	375.4	458.6	409.5	254.8	426.6	336.0
מנשה	424.6	558.1	477.7	369.6	374.6	372.0
מעלה יוסף	691.6	898.0	782.6	638.4	769.3	701.7
מרום הגליל	674.4	934.3	796.4	583.4	744.8	654.9
מרחבים	520.2	833.8	674.6	363.3	414.8	385.4
משגב	381.9	614.5	466.8	232.2	203.7	217.8
נחל שורק	494.7	587.8	544.1	339.8	591.0	437.9
עמק הירדן	710.9	872.3	775.1	296.2	378.5	334.7
עמק חפר	521.9	616.8	562.8	274.1	388.8	328.3
עמק יזרעאל	400.0	543.2	466.5	289.0	415.2	345.0
עמק לוד	482.0	582.3	524.8	241.2	330.3	284.2
ערבות הירדן	(850.4)		(327.1)	(144.9)
רמת נגב	339.0	579.9	431.4	135.7	224.2	178.5
שדות הנגב	637.9	734.0	689.1	414.2	551.0	475.7
שומרון	343.5	234.8	302.1	109.7	290.6	222.7
שער הנגב	595.2	713.0	642.2	217.6	378.9	298.8
שפיר	526.2	716.0	603.4	325.6	546.7	423.7
תמר	35.1	(73.7)	(55.2)

מקור למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

* לא כולל יולדות

לוח 2.57: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המטופלים⁽¹⁾ בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי⁽²⁾, לפי מין, 2004

סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
			מספרים מוחלטים
			מטופלים בני 65+
4,005	2,406	6,411	
24,902	28,060	52,962	מטופלים בכלל האוכלוסייה
			אחוזים
16.1	8.6	12.1	בני 65+ מכלל המטופלים
1.0	0.8	0.9	מטופלים בני 65+ מכלל בני 65+
0.7	0.8	0.8	כלל המטופלים מתוך האוכלוסייה

מקור: בריאות הנפש בישראל, שנתון סטטיסטי 2005

1. אנשים שהיה להם מפגש אחד לפחות עם מטפל או עם גורם אחר במחצית השנייה של 2004
2. נתונים אלה אינם ארציים אלא מתייחסים למרפאות ממשלתיות ממוחשבות, אשר לפי ההערכה מהוות כ-50% מכלל המרפאות בארץ

לוח 2.58: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2004

מספרים מוחלטים, סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
12	7	19	בני 65+
7	7	14	בני 65-74
5	0	5	בני 75-84
0	0	0	בני 85+
281	442	723	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.59: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי
מלא, לפי גיל ומין, 2004

סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
מספרים מוחלטים			
334	275	609	כלל בני 65+
211	207	418	בני 65-74
105	55	160	בני 75-84
18	13	31	בני 85+
1,680	2,877	4,557	כלל האוכלוסייה
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
0.9	0.9	0.9	כלל בני 65+
1.0	1.2	1.1	בני 65-74
0.7	0.6	0.7	בני 75-84
0.4	0.5	0.5	בני 85+
0.5	0.8	0.7	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.60: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+,
והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין,

שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש, סוף שנה

	2004	2003	2002	2001	2000	1990
כלל בני 65+						
סה"כ	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	3.5
גברים	0.9	1.0	1.3	1.3	1.4	3.1
נשים	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	3.9
בני 65-74						
סה"כ	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	3.6
גברים	1.2	1.4	1.6	1.6	1.7	3.7
נשים	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	3.5
בני 75-84						
סה"כ	0.7	0.8	1.1	1.2	1.3	3.6
גברים	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0	2.3
נשים	0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	4.5
בני 85+						
סה"כ	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	3.1
גברים	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	1.8
נשים	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	4.0
כלל האוכלוסייה						
סה"כ	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.8
גברים	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	2.1
נשים	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	1.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.61: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

	2004	2003	2002	2001	2000	1990	
כלל בני 65+							
סה"כ	1,808	1,720	1,707	1,751	1,867	1,412	
גברים	714	644	669	636	641	526	
נשים	1,094	1,076	1,038	1,115	1,226	886	
בני 65-74							
סה"כ	1,113	1,098	1,049	1,062	1,117	892	
גברים	451	429	436	401	408	321	
נשים	662	669	613	661	709	571	
בני 75-84							
סה"כ	577	537	583	587	621	467	
גברים	206	180	199	195	186	181	
נשים	371	357	384	392	435	286	
בני 85+							
סה"כ	118	85	75	102	129	53	
גברים	57	35	34	40	47	24	
נשים	61	50	41	62	82	29	
כלל האוכלוסייה							
סה"כ	19,857	19,007	18,264	17,869	18,172	12,262	
גברים	11,903	11,330	10,844	10,594	10,632	6,788	
נשים	7,954	7,677	7,420	7,275	7,540	5,474	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.62: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2004

כלל האוכלוסייה	בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	
מספרים מוחלטים					
סה"כ קבלות					
19,857	118	577	1,113	1,808	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
10,199	11	96	451	558	הפרעות פסיכוטיות חריפות
1,250	4	12	30	46	הפרעות אפקטיביות
3,063	30	288	424	742	הפרעות אורגניות
749	58	138	101	297	הפרעות נירוטיות
1,147	7	16	45	68	הפרעות אישיות
907	2	2	13	17	סמים ואלכוהול
838	1	4	14	19	פיגור שכלי
229	0	1	3	4	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
1,184	5	20	32	57	לא רשום/לא ידוע
291	0	0	0	0	
אחוזים					
סה"כ קבלות					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
51.4	9.3	16.6	40.5	30.9	הפרעות פסיכוטיות חריפות
6.3	3.4	2.1	2.7	2.5	הפרעות אפקטיביות
15.4	25.4	49.9	38.1	41.0	הפרעות אורגניות
3.8	49.2	23.9	9.1	16.4	הפרעות נירוטיות
5.8	5.9	2.8	4.0	3.8	הפרעות אישיות
4.6	1.7	0.3	1.2	0.9	סמים ואלכוהול
4.2	0.8	0.7	1.3	1.1	פיגור שכלי
1.2	0.0	0.2	0.3	0.2	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
6.0	4.2	3.5	2.9	3.2	לא רשום/לא ידוע
1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.63: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2004

נשים	גברים	סה"כ	
			מספרים מוחלטים
308	248	556	כלל בני 65+
133	129	262	בני 74-65
138	89	227	בני 84-75
37	30	67	בני 85+
1,898	2,597	4,495	כלל האוכלוסייה
			שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה
0.8	0.9	0.8	כלל בני 65+
0.6	0.8	0.7	בני 74-65
1.0	0.9	0.9	בני 84-75
0.9	1.2	1.0	בני 85+
0.5	0.8	0.7	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.64: בני +65 שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי לפי מחוז ונפה, 1998-2002

שיעורים ל-100,000 תושבים

קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי	מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי	
85.8	199.3	סה"כ
72.8	201.6	מחוז ירושלים
75.2	159.3	מחוז הצפון
102.8	203.0	נפת צפת
73.7	171.9	נפת כנרת
51.8	99.8	נפת יזרעאל
92.7	205.6	נפת עכו
121.1	284.6	מחוז חיפה
102.9	235.7	נפת חיפה
140.6	382.2	נפת חדרה
67.0	183.1	מחוז המרכז
70.0	190.3	נפת השרון
80.2	197.0	נפת פתח תקווה
70.6	181.1	נפת רמלה
47.5	161.4	נפת רחובות
87.3	196.9	מחוז תל אביב
89.0	162.2	מחוז הדרום
89.2	152.1	נפת אשקלון
88.7	174.0	נפת באר שבע
49.5	85.5	אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.65: בני +65 שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי לפי רשות מקומית, 2002-1998

סוף שנה, שיעורים ל-100,000 תושבים

קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי	מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי	סה"כ
85.8	199.3	
		עיריות ומועצות מקומיות
(99.1)	(148.6)	אופקים
(117.9)	308.2	אור יהודה
(254.7)	410.3	אור עקיבא
..	(78.0)	אילת
53.5	103.6	אשדוד
139.1	217.2	אשקלון
100.2	200.3	באר שבע
(100.9)	(201.8)	בית שאן
(99.7)	199.5	בית שמש
60.6	195.4	בני ברק
116.3	227.4	בת ים
(96.0)	(230.5)	גבעת שמואל
62.7	156.7	גבעתיים
144.1	240.1	דימונה
(56.0)	307.7	הוד השרון
84.8	187.4	הרצליה
(125.1)	(187.7)	זכרון יעקב
150.4	251.5	חדרה
75.0	177.4	חולון
112.1	236.9	חיפה
(79.9)	182.7	טבריה
(101.8)	224.0	טירת כרמל
..	(114.5)	יבנה
..	(130.3)	יהוד

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)



**לוח 2.65: בני +65 שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי לפי רשות מקומית,
1998-2002 (המשך)**

סוף שנה, שיעורים ל-100,000 תושבים

קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי	מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי	
(114.4)	(171.5)	יקנעם עילית
70.8	199.9	ירושלים
87.8	173.1	כפר סבא
119.3	265.2	כרמיאל
(61.1)	132.3	לוד
(151.3)	(194.5)	מבשרת ציון
(81.0)	170.1	מגדל העמק
(185.3)	(259.4)	מודיעין
(110.8)	(155.1)	מעלה אדומים
(115.8)	(147.3)	מעלות-תרשיחא
141.9	254.7	נהריה
(40.2)	281.2	נס ציונה
..	(76.2)	נצרת
117.1	203.4	נצרת עילית
(121.1)	186.3	נשר
(76.0)	(136.8)	נתיבות
68.5	175.0	נתניה
83.6	346.2	עכו
109.4	190.2	עפולה
(109.0)	203.4	ערד
171.7	667.7	פרדס חנה-כרכור
87.3	221.1	פתח תקווה
(135.4)	315.9	צפת
134.2	281.1	קלנסווה
(64.4)	150.3	קריית אתא
110.7	206.2	קריית ביאליק
91.2	148.3	קריית גת
(68.7)	844.1	קריית טבעון

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)



**לוח 2.65: בני +65 שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי לפי רשות מקומית,
1998-2002 (המשך)**

סוף שנה, שיעורים ל-100,000 תושבים

קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי	מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי	
100.5	216.8	קריית ים
94.4	217.9	קריית מוצקין
(111.8)	(159.7)	קריית מלאכי
(138.3)	(172.9)	קריית שמונה
..	(57.3)	ראש העין
60.5	188.1	ראשון לציון
35.3	127.2	רהט
75.2	146.6	רמלה
96.8	209.2	רמת גן
(41.1)	141.6	רמת השרון
102.5	187.9	רעננה
(126.2)	229.5	שדרות
84.7	190.3	תל אביב-יפו
		מועצות אזוריות
(253.7)	(322.9)	אפעל
..	(175.4)	אשכול
(121.2)	(202.0)	בקעת בית שאן
(88.5)	(227.5)	דרום השרון
..	(137.3)	הגלבוע
..	(92.5)	הגליל העליון
..	(222.9)	הגליל התחתון
(144.1)	(230.6)	חוף אשקלון
(98.2)	(131.0)	חוף הכרמל
..	(191.7)	חוף השרון
..	(302.4)	יואב
(96.5)	(154.4)	מגידו
(125.6)	261.6	מטה אשר

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)



**לוח 2.65: בני 65+ שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי לפי רשות מקומית,
1998-2002 (המשך)**

סוף שנה, שיעורים ל-100,000 תושבים

מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי	קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי	
271.3	(70.3)	מטה יהודה
195.3	(168.0)	מנשה
(183.3)	..	מרום הגליל
(193.9)	(88.1)	עמק הירדן
230.9	(95.5)	עמק חפר
205.6	(82.2)	עמק יזרעאל
(260.2)	(144.6)	עמק לוד
(214.9)	..	שפיר

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל (פורסם באינטרנט)

לוח 2.66: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +65 בין קופות החולים,
לפי גיל, 2005-2002

אחוזים

כלל האוכלוסייה	בני +75	בני 65-74	בני +65	
נובמבר 2002				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
55.2	74.9	69.4	71.9	שירותי בריאות כללית
23.7	12.9	16.4	14.8	מכבי שירותי בריאות
10.0	7.1	8.0	7.6	קופת חולים לאומית
11.1	5.1	6.2	5.7	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2003				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
54.9	74.3	68.2	71.0	שירותי בריאות כללית
23.9	13.2	17.3	15.5	מכבי שירותי בריאות
9.9	7.2	8.0	7.6	קופת חולים לאומית
11.4	5.3	6.5	5.9	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2004				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
54.4	73.6	67.0	70.1	שירותי בריאות כללית
24.0	13.6	18.1	16.1	מכבי שירותי בריאות
9.8	7.3	8.0	7.7	קופת חולים לאומית
11.7	5.4	6.9	6.2	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2005				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
53.9	75.6	72.4	69.3	שירותי בריאות כללית
24.1	12.5	14.4	16.6	מכבי שירותי בריאות
9.9	6.7	7.4	7.7	קופת חולים לאומית
12.1	5.3	5.7	6.5	קופת חולים מאוחדת

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.67: בני +65 מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, 1994-2005

אחוזים

קופת חולים מאוחדת	קופת חולים לאומית	מכבי שירותי בריאות	שירותי בריאות כללית	סה"כ	
4.1	7.2	4.9	13.1	10.2	דצמבר 1994
4.4	7.4	5.1	12.9	10.1	דצמבר 1995
4.4	7.3	5.2	13.0	10.0	נובמבר 1996
4.4	7.2	5.4	13.2	10.1	נובמבר 1997
4.6	7.4	5.5	13.2	10.0	נובמבר 1998
4.7	7.4	5.6	13.1	10.0	נובמבר 1999
4.8	7.5	5.8	13.1	10.0	נובמבר 2000
5.0	7.5	6.0	13.1	10.0	נובמבר 2001
5.2	7.7	6.3	13.1	10.1	נובמבר 2002
5.3	7.9	6.6	13.2	10.2	נובמבר 2003
5.4	8.0	6.8	13.2	10.2	נובמבר 2004
5.5	7.9	7.0	13.1	10.2	נובמבר 2005

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.68: בעלי ביטוח בריאות משלים וביטוחי בריאות נוספים בקרב בני 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי מין, שנים נבחרות

אחוזים

כלל האוכלוסייה			בני 65+			סה"כ	
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ		
ביטוח בריאות משלים⁽¹⁾							
40.0	35.0	37.5	30.0	22.0	27.0	1997	
52.0	50.0	51.0	31.5	37.0	34.0	1999	
66.0	62.0	65.0	58.0	58.0	58.0	2001	
73.0	70.0	72.0	58.0	63.0	60.0	2003	
79.0	79.0	79.0	60.0	69.0	67.0	2005	
ביטוח בריאות פרטי⁽²⁾							
22.0	29.0	26.0	5.0	21.0	12.0	2001	
30.0	38.0	34.0	16.0	21.0	18.0	2003	
31.0	37.0	34.0	15.0	22.0	18.0	2005	
ביטוח סיעודי פרטי⁽³⁾							
27.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	2001	
26.0	26.0	26.0	28.0	37.0	32.0	2003	
33.0	35.0	34.0	30.0	43.0	36.0	2005	

- מקורות: גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'. 2000. לקט נתונים על ביטוחי בריאות משלמים ומסחריים 1999-1995, גוינט-מכון ברוקדייל; גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'. 2003. שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל, גוינט-מכון ברוקדייל; גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'; מצליח, ר'. 2004. דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות 2003 והשוואה לשנים קודמות. מאיירס-גוינט-מכון ברוקדייל
1. תוכניות לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) המשוקות למבוטחים של קופות החולים בידי הקופות, שהן מלכ"רים
 2. ביטוחים המשוקים בידי חברות ביטוח, שהן למטרות רווח
 3. הביטוח הסיעודי משוק כולו בידי חברות ביטוח. הנתונים כוללים את המבוטחים בביטוח סיעודי פרט וכן את המבוטחים בביטוח סיעודי של קופות החולים. יתכן שהנתונים שנמצאו בסקר לגבי הביטוח הסיעודי הם נתוני חסר, בגלל חוסר מודעות לקיום הביטוח