

2. מאפיינים בריאותיים של הקשישים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים



מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של הקשישים בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים שונים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד ובשמירה על בריאות הקשישים.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשות באיכות חייו של הקשיש. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, תמותה, סגנון חיים, מחלות ומוגבלות, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. כמו כן, מובאים נתונים על דפוסי שימוש של קשישים בשירותי בריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ◆ **תוחלת החיים בלידה** עולה בהדרגה והגיעה בשנת 2002 ל-81.5 שנים לנשים ו-77.5 שנים לגברים. תוחלת החיים של היהודים גבוהה מזו של האוכלוסייה הערבית; בשנת 2002 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 4 שנים בקרב הנשים, ו-3.2 שנים בקרב הגברים (לוח 2.1).
- **תוחלת החיים בגיל 65** היא 19.1 שנים לנשים ו-17.1 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 84 בממוצע, וגבר - עד גיל 82 (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 11.6 שנים ולגברים 10.7 שנים (לוח 2.3).
- ◆ על פי הסקר החברתי, 40% מבני 65 ומעלה מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד**, לעומת 77% בקרב בני 20 ומעלה. בקרב הקשישים, 45% מהגברים ו-36% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד (לוח 2.4). 60% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם בדרך כלל לא-כל-כך-טוב או בכלל-לא-טוב, לעומת 23% בקרב בני 20 ומעלה (לוח 2.5).
- ◆ כשליש (36%) מבני +65 **עוסקים בפעילות גופנית** באופן קבוע, גברים יותר מנשים (41% ו-31%, בהתאמה). העיסוק בפעילות גופנית יורד עם עליית הגיל. רק 22% מבני +80 עוסקים בפעילות גופנית לעומת 41% מבני 65-74. אחוז העוסקים בפעילות גופנית נמוך מאוד בקרב האוכלוסייה הערבית: 3% לעומת 38% בקרב היהודים (לוח 2.6).
- **הפעילות הגופנית הנפוצה** בקרב קשישים היא הליכה: כ-24% מכלל הקשישים, וכ-67% מבין הקשישים העוסקים בפעילות גופנית, דיווחו על הליכה באופן קבוע (לוח 2.7).
- ◆ תשעה אחוזים מהקשישים **מעשנים**. אחוז הגברים המעשנים יותר מכפול מאחוז הנשים המעשנות (13% לעומת 5%). אחוז הקשישים המעשנים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה מאשר בקרב הקשישים היהודים (13% לעומת 8%). רק 5% מקרב עולי בריה"מ לשעבר מעשנים לעומת 14% מקרב ילידי הארץ (לוח 2.8).
- ◆ עשרים וחמישה מכל 1,000 בני +65 ביצעו **בדיקת MRI** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), לעומת 11 מכל 1,000

- בקרוב כלל האוכלוסייה. בקרב בני +65, שיעורם של הגברים אשר ביצעו בדיקת MRI גבוה פי 1.5 מאשר בקרב הנשים. בתקופה הנדונה ביצעו 163 מכל 1,000 בני +65 בדיקת CT, לעומת 55 איש מכל 1,000 בכלל האוכלוסייה (לוח 2.9).
- ◆ כ-45% מבני +65 קיבלו **חיסון נגד שפעת** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000). שיעורם של המקבלים חיסון נגד שפעת בקרב בני +65 גבוה פי חמישה מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור המקבלים חיסון בקרב עולי בריה"מ לשעבר הוא כמחצית השיעור בקרב קבוצת היהודים ואחרים (23% לעומת 45%, בהתאמה); (לוח 2.9).
 - ◆ מעט פחות משליש מבנות +65 עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה. שיעור בנות ה-75 שעברו את הבדיקה נמוך יותר מאשר בקרב בנות 65-74 (17% לעומת 38% בהתאמה); (לוח 2.10).
 - ◆ כמעט 40% מהקשישים **ביקרו אצל רופא** פעם אחת לפחות בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), כפול מהאחוז בקרב כלל האוכלוסייה. אצל רופא משפחה ביקרו 32% ואצל רופא מומחה כ-10% (לוח 2.11).
 - ◆ קשיש **מבקר אצל רופא** בממוצע כ-15 פעמים בשנה (לא כולל רופא שיניים), מתוכן 11.5 פעמים אצל רופא משפחה ו-3.6 פעמים אצל רופא מומחה. ממוצע הביקורים אצל רופא בשנה בכלל האוכלוסייה הוא כשבעה (לוח 2.12).
 - ממוצע **הביקורים לנפש של קשישים אצל רופא שיניים** בשנה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000) היה 2.5, ובקרב בני +75 היה ממוצע הביקורים לנפש נמוך יותר (2 ביקורים); (לוח 2.12).
 - עשרים ושניים אחוזים מסך הביקורים אצל רופא משפחה, 19% מסך הביקורים אצל רופא מומחה ו-9% מסך הביקורים אצל רופא שיניים נעשים בידי קשישים. חלקן של הנשים הקשישות מתוך סך הביקורים אצל רופא משפחה הוא 13%, לעומת 9% בקרב הגברים הקשישים (לוח 2.13).
 - ◆ קצת למעלה משליש מהקשישים (34%) דיווחו על **בעיות ראייה** (28% מהגברים ו-39% מהנשים); (לפי סקר בני 60 ומעלה שנערך ב-1997). אחוז הסובלים מבעיות ראייה עולה עם הגיל ומגיע ל-47% בקרב בני +80. עשרים ושמונה אחוזים מהקשישים דיווחו על **בעיות שמיעה** (31% מהגברים ו-26% מהנשים). אחוז

הסובלים מבעיות שמיעה מגיע ל-48% בקרב בני 80+ (לוח 2.14). שבעה עשר אחוזים מהקשישים דיווחו על **אי שליטה על סוגר השתן** (13% מהגברים ו-19% מהנשים). אחוז הסובלים מאי שליטה על סוגר השתן מגיע ל-33% בקרב בני 80+ (26% מהגברים ו-39% מהנשים); (לוח 2.15).

◆ שלושים ושמונה אחוזים מהגברים היהודים ואחרים בני 65+ דיווחו **שהרופא אבחן אצלם יתר לחץ-דם**, בעוד שבקרב הגברים באוכלוסייה הערבית רק 24% דיווחו על כך (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000). אחוז גבוה בהרבה של נשים ערביות (44%) ויהודיות (45%) דיווחו על כך. עשרים ואחד אחוזים מהגברים היהודים ו-18% בקרב הגברים באוכלוסייה הערבית **דיווחו על אוטם שריר הלב**, לעומת 10% בקרב הנשים היהודיות ו-14% בקרב הנשים הערביות. על אבחון **סוכרת** דיווחו 15% מבני 65+ היהודים - נשים וגברים, לעומת 26% מהגברים ו-32% מהנשים באוכלוסייה הערבית (לוח 2.16 א' ו-ב').

◆ בשנת 2001 נרשמו 12,492 **מקרים חדשים של שאתות ממאירות** בקרב בני 65+, אשר מהווים 1,761 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. השיעור בקרב הגברים גבוה יותר מאשר בקרב הנשים (2,134 לעומת 1,482 לכל 100,000 נפש בהתאמה). הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.17).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי בקרב יהודים ואחרים שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות גבוה מאשר בקרב האוכלוסייה הערבית (2,180 לעומת 1,426 לכל 100,000 נפש בהתאמה). גם בקרב הנשים שיעור המקרים החדשים גבוה יותר אצל קבוצת היהודיות ואחרות מאשר בקרב האוכלוסייה הערבית: 1,524 לעומת 735 לכל 100,000 נפש בהתאמה (לוח 2.18).

◆ על פי מחקר שנערך על ידי מאיירס-גיוינט-מכון ברוקדייל בקרב האוכלוסייה היהודית לגבי שכיחות **מחלת הדמנטיה** נמצא כי 19% מבני 65+ (כ-117 אלף איש) סבלו מהמחלה. 84% מהם מתגוררים בקהילה והיתר במוסדות (לוח 2.20).

- מקרב החולים המתגוררים בקהילה, 47% לוקים במחלה בדרגת חומרה קלה, 24% לוקים ברמת חומרה בינונית ואילו 30% לוקים בה ברמת חומרה קשה. בהשוואה לפי מין נמצא כי 19% מהנשים לוקות במחלה לעומת 14%

מהגברים. שכיחות המחלה בקרב בני +65 עולה עם הגיל ומגיעה לשיא בקבוצת בני +85; 47% מבני קבוצת גיל זו לוקים במחלה (לוח 2.21).

♦ אומדן היכולת של הקשישים לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה מצביע על כך שכ-80% מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים להתלבש לבד ללא קושי; 75% מסוגלים להתקלח או להתרחץ ללא קושי; 92% מסוגלים לאכול ללא קושי ו-81% מסוגלים להיכנס ולצאת מהמיטה או להתיישב על כיסא ולקום ממנו ללא קושי. 7% מהקשישים הגרים בקהילה אינם מסוגלים להתלבש לבדם, ו-11% מהם אינם מסוגלים להתקלח או להתרחץ לבד (לוח 2.22).

- בחינת אומדן מידת הניידות של בני +65 הגרים בקהילה מראה כי 13% מהם אינם מסוגלים להסתובב מחוץ לבית והם מרותקים לביתם, ו-8% מסוגלים לצאת מביתם רק בעזרת אדם אחר או באמצעות כיסא גלגלים. 72% מהקשישים הגרים בקהילה מסוגלים לניידות מחוץ לביתם למרחק של 400 מ' ללא עזרה. 4.5% מהקשישים הגרים בקהילה מוגבלים בניידות בתוך הבית (לוח 2.23).

♦ אומדן אחוז הקשישים המוגבלים, דהיינו הזקוקים לעזרה באחת מפעולות היומיום לפחות (להתרחץ או להתקלח, להתלבש, לאכול, לשבת ולקום מהכיסא, להיכנס ולצאת מהמיטה, להסתובב בתוך הבית); (ADL = Activities of Daily Living), עומד בסוף 2003 על 16% (12% בקרב הגברים ו-19% בקרב הנשים). אחוז המוגבלים עולה בצורה חדה עם העלייה בגיל: 40% בקרב בני +80 לעומת 7% בקרב בני 65-74. אחוז הקשישים המוגבלים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה פי שניים בערך מהאחוז המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית (31% ו-15%, בהתאמה); (לוח 2.24).

- לפי האומדנים, בשנים 1990-2003 גדל מספר הקשישים המוגבלים בארץ ב-76% והגיע לכ-107 אלף איש בסוף 2003. עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים המוגבלים הם דיירי המוסדות לטיפול ממושך ו-76% גרים בקהילה (לוח 2.25).

♦ כחמישית מהקשישים בקהילה נפלו במהלך חצי השנה האחרונה (לפי סקר בני 60 ומעלה 1997). הגברים סובלים פחות מנפילות (14%) לעומת הנשים (24%). אחוז הקשישים שנפלו מגיע ל-31% בקרב בני +80 (לוח 2.26).

- ◆ בשנת 2003 נפגעו **בתאונות דרכים** 1,807 קשישים. מתוכם, 4% נהרגו (82 קשישים), 16% נפצעו קשה (286 קשישים) ו-80% נפצעו קל (1,439 קשישים). שלושים ושישה אחוזים מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 31% נהגו ברכב ו-29% נסעו ברכב. 73% מהקשישים שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (לוח 2.27).
- שיעור הקשישים שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2003 נמוך מזה שבקרב כלל האוכלוסייה (273 ו-554 ל-100,000 נפש, בהתאמה), אך **שיעור ההרוגים** מתוך הנפגעים כמעט כפול בקרב הקשישים לעומת השיעור בכלל האוכלוסייה. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב הקשישים. שיעור הקשישים שנפגעו בתאונות דרכים בקרב הערבים גבוה מאשר בקרב היהודים (310 ו-222 בהתאמה); (לוח 2.28).
- בשנת 2003 חלה ירידה בשיעור הקשישים **שנפגעו בתאונות דרכים**, לעומת שנת 2002 (מ-290 ל-273 ל-100,000 נפש). זוהי עלייה בשיעור לעומת 2001 (219), אך ירידה בשיעור לעומת שנים קודמות. גם בקרב כלל האוכלוסייה חלה ירידה בשיעור הנפגעים ב-2003 (לוח 2.29).
- **שיעור הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בקרב כלל האוכלוסייה בשנת 2003 גבוה ב-41% משיעור הנהגים בני +65 שהיו מעורבים בתאונות דרכים (לוח 2.30).
- ◆ שיעור **הביקורים של בני +65 בחדר מיון** לכל 1,000 נפש הוא 644 לעומת 380 בקרב כלל האוכלוסייה. ביקורים של בני +65 בחדר מיון מהווים 17% מכלל הביקורים במיון. שיעור הביקורים במיון עולה עם הגיל: 524 בקרב בני 65-74 ו-1,139 בקרב בני +85 (לוח 2.31). 89% מהביקורים של בני +65 בחדר מיון נגרמו בגלל מחלות, לעומת 72% מהביקורים של כלל האוכלוסייה (לוח 2.32).
- ◆ עשרים וארבעה אחוזים מהקשישים דיווחו על **אשפוז** בשנה האחרונה (לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000), 26% בקרב הגברים ו-22% בקרב הנשים. שיעור האשפוזים בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה יותר ועומד על 31% לעומת שיעור האשפוזים בקרב קבוצת היהודים ואחרים (23%). בקרב היהודים, שיעור האשפוז הנמוך ביותר הוא של ילידי ישראל (18%) והגבוה ביותר הוא של ילידי אפריקה (27%); (לוח 2.34).

- ◆ **שיעורי האשפוז של הקשישים במחלקות האשפוז הכלליות** גדולים פי שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. בשנת 2002 נרשמו 543 אשפוזים ל-1,000 קשישים במחלקות האשפוז הכלליות, בהשוואה ל-155 ל-1,000 בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-423 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-900 בגיל +85). שיעור האשפוז נמצא במגמת עלייה, הן בקרב כלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב הקשישים (לוח 2.35).
- בבחינת **שיעור אשפוז הקשישים מכלל האשפוזים** נמצא, כי בשנת 2002, כשליש (35%) מהאשפוזים היו של בני +65 (בעוד שהם מהווים פחות מ-10% מכלל האוכלוסייה), ו-20% מהאשפוזים היו של בני +75 (בעוד שהם מהווים כ-4% מכלל האוכלוסייה). שיעור הקשישים מכלל האשפוזים נמצא במגמת עלייה (לוח 2.36). חלקם של הקשישים מתוך כלל האשפוזים במחלקות הפנימיות גבוה במיוחד והגיע ל-59% בשנת 2002 (לוח 2.37).
- התפלגות **האשפוזים של הקשישים במחלקות האשפוז** מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר, ומהווה קצת מעל מחצית האשפוזים (לוח 2.38).
- ◆ לפי סקר בריאות שנערך בין אוקטובר 1999 לספטמבר 2000, **המתינו** 16,700 בני +65 **לאשפוז** במהלך השנה האחרונה, והם מהווים 3% מבני +65, לעומת 0.1% שהמתינו לאשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. מכלל הקשישים הממתינים לאשפוז, 40% ממתינים לאשפוז שלושה חודשים ויותר (6,600 איש); (לוח 2.40).
- ◆ ב-2002 קיבלו 6,128 בני +65 (כ-10% מבני +65) טיפול **אמבולטורי פסיכיאטרי**. הטיפולים של בני +65 מהווים כ-13% מכלל הטיפולים שניתנו ב-2002. 37% מהטיפולים ניתנו לגברים בני +65 ו-63% לנשים בנות +65. בכלל האוכלוסייה היחס בין גברים לנשים שונה: 53% מהטיפולים ניתנו לגברים, ו-47% לנשים (לוח 2.41).
- ◆ ב-2002 היו 48 קשישים **באשפוז יום פסיכיאטרי**, והם היוו 4% מסך השוהים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב הקשישים הצעירים יותר: בני 65-74 מהווים 88% מכלל הקשישים השוהים במסגרת טיפול יום (לוח 2.42).
- ◆ בסוף 2002 היו 815 קשישים מאושפזים **באשפוז פסיכיאטרי**, שיעור של 1.2 מאושפזים ל-1,000 נפש. זאת, בהשוואה ל-0.7 מאושפזים ל-1,000 נפש בקרב כלל

האוכלוסייה. שבעה-עשר אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני +65 (לוח 2.43). משנת 1990 ועד שנת 2002 חלה ירידה בשיעור הקשישים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-1.2 ל-1,000 נפש); (לוח 2.44).

- במהלך 2002 היו 1,707 **קבלות לאשפוז פסיכיאטרי** של בני +65, ואלה היו 9% מסך הקבלות לאשפוז. 61% מהקבלות של בני +65 היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (לוח 2.45). שלוש **האבחנות השכיחות** לקבלה לאשפוז (86% מהקבלות) היו: הפרעות אפקטיביות, סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות והפרעות אורגניות (לוח 2.46).

- שלושה עשר אחוזים מכלל **הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי** בשנת 2002 היו של בני +65 (מרביתם בני 65-84, ורק מיעוטם בני +85); (לוח 2.47).

♦ ב-2002 עמד **שיעור הפטירה** ל-1,000 בני +65 על 53 בקרב הגברים ועל 41 בקרב הנשים. שיעור הפטירה של הגברים היהודים והאחרים נמוך מזה של הגברים באוכלוסייה הערבית עד גיל 84, ואילו בקרב בני +85 המצב הפוך. שיעור הפטירה של הנשים היהודיות נמוך מזה של הנשים באוכלוסייה הערבית (לוח 2.48).

♦ שישים ושמונה אחוזים מהקשישים **נפטרו בבית חולים** בשנת 2002, לעומת 57% מבני 0-64. בקרב הקשישים 69% מהגברים ו-67% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 52% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 65% מהנשים (לוח 2.49).

- ב-2000 נפטרו 29,318 אנשים בגיל +65, שהם 78% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. **סיבות הפטירה העיקריות** בקרב הקשישים הן מחלות במערכת הדם והלב וכן שאתות ממאירות (35% ו-22% בהתאמה). בקרב הגברים, אין הבדל בין הקשישים לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתוך סך הפטירות (23%); ובקרב הנשים השיעור בכלל האוכלוסייה (23%) גבוה מעט מזה שבקרב הנשים הקשישות (20%); (לוחות 2.52 א, ב, ג).

- עם העלייה בגיל, עולה חלקן היחסי של מחלות לב וכלי דם בין סיבות פטירה: מ-29% בקרב בני 65-74 ל-39% בקרב בני +85. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-32% בקרב בני 65-74 ל-13% בקרב בני +85 (לוח 2.52 א).

- ◆ בנובמבר שנת 2003 היו 71% מהקשישים **מבוטחים** בשירותי בריאות כללית (בהשוואה ל-55% מכלל האוכלוסייה), 16% במכבי שירותי בריאות (בהשוואה ל-24% מכלל האוכלוסייה), 8% בקופת חולים לאומית ו-6% בקופת חולים מאוחדת (בהשוואה ל-10% ו-11% מכלל האוכלוסייה בהתאמה). יש ירידה לאורך השנים באחוז הקשישים המבוטחים בשירותי בריאות כללית (לוח 2.53). שלושה עשר אחוזים מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם קשישים, בהשוואה ל-7% במכבי שירותי בריאות, 8% בקופת חולים לאומית ו-5% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.54).
- ◆ על פי סקרים שנערכו במאירס-גיוינט-מכון-ברוקדייל, ב-2003 היה ל-60% מהקשישים **ביטוח בריאות משלים**, לעומת 72% בקרב כלל האוכלוסייה. מאז שנת 1997 גדל מספר הקשישים בעלי הביטוח המשלים ביותר מפי שניים (בשנת 1997 ל-27% מהקשישים היה ביטוח משלים). ל-21% מהגברים הקשישים, ול-16% מהנשים הקשישות יש **ביטוח בריאות פרטי**. אחוז הקשישים בעלי ביטוח בריאות פרטי נמוך יחסית לאוכלוסייה הכללית (38% מהגברים ו-30% מהנשים בכלל האוכלוסייה); (לוח 2.55).

הגדרות והסברים

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד, וקבוצת "בני דתות אחרות" הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל ושל תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים עד 1995 מבוססים על קבצי האשפוזים בבתי חולים לאשפוז כללי שהוכנו בלמ"ס. הנתונים לשנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכז-אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכל כלליות) ללא יולדות מכל מוסדות האשפוז ולא רק בתי חולים לאשפוז כללי. המאגר כולל 93% מכלל האשפוזים לפי גיל ומין באשפוז הכללי ונופח לסך כל האשפוזים בהתאם ל"מוסדות האשפוז בישראל". הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת **סך-כל המחלקות הכלליות** אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפרסם אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה בידי המחלקה למידע והערכה באגף בריאות הנפש, כתוצאה מעדכונים מאוחרים מבתי החולים.

קבלות ראשונות לאשפוז: אנשים שהתקבלו לראשונה בחייהם לבית חולים פסיכיאטרי.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות. הקבלות לאשפוז אינן כוללות קבלות לטיפול יום.

נתונים מסקר בריאות

אשפוז: אשפוזים בבתי חולים כלליים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, כולל אשפוז יום בבתי חולים.

רופא משפחה: רופא כללי, רופא פנימי, רופא משפחה ורופא ילדים.

רופא שיניים: רופא שיניים ומרפא שיניים, אורתודנט, פריודנט ורופאי שיניים מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.

ביקור אצל רופא: ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל: ביקור אצל רופא במרפאה של קופת חולים, במרפאת חוץ של בית חולים, בתחנת "מגן דוד אדום", בחדר מיון של בית חולים, במרפאה פרטית בביתו של הרופא וביקור בבית החולה. לא נכללו התייעצויות בטלפון או ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב-26 כדי לקבל אומדן ל-12 חודשים.

מבקר: אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים בשבועיים שקדמו לריאיון.

חולה במחלות כרוניות: אדם המדווח שאי-פעם הרופא אבחן אצלו מחלה כרונית.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים

.. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-40%

() = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומאירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.2	75.1	80.3	76.6	80.0	76.3	1996
76.8	74.3	80.6	76.4	80.1	76.0	1997
76.8	74.4	80.7	76.4	80.3	76.1	1998
78.1	74.9	80.7	77.0	80.4	76.6	1999
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
77.8	74.5	81.6	77.7	81.2	77.3	2001
77.9	74.7	81.9	77.9	81.5	77.5	2002

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת חיים בגיל 65, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.7	15.3	14.8	13.7	14.9	13.8	1974-1970
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
16.4	16.0	17.9	15.8	17.9	15.8	1995-1991
16.8	16.1	18.1	16.0	18.0	16.0	1996-1992
17.0	16.4	18.3	16.2	18.2	16.2	1997-1993
17.0	16.4	18.5	16.3	18.4	16.3	1998-1994
אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים*		כלל האוכלוסייה		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
16.6	16.6	18.7	16.5	18.6	16.5	1999-1996
16.6	16.5	18.8	16.7	18.7	16.6	2000-1996
16.7	16.3	19.0	16.8	18.8	16.8	2001-1997
16.7	16.1	19.2	17.1	19.1	17.1	2002-1998

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי * כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.3 : תוחלת חיים בגילים נבחרים, לפי מין

בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
5.8	5.5	8.0	7.3	10.8	9.7	1995-1991
5.8	5.5	8.0	7.4	10.8	9.8	1996-1992
5.9	5.5	8.2	7.4	11.0	9.9	1997-1993
5.9	5.5	8.2	7.4	11.1	10.0	1998-1994
5.8	5.6	8.2	7.6	11.2	10.2	1999-1996
5.9	5.7	8.2	7.6	11.3	10.2	2000-1996
5.9	5.8	8.3	7.8	11.4	10.4	2001-1997
6.0	6.1	8.4	8.1	11.6	10.7	2002-1998

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: בני 65+ ובני 20+ המדווחים שמצב בריאותם בדרך כלל הוא טוב או טוב מאוד, 2002

אחוזים		
נשים	גברים	סה"כ
36.1	44.7	39.8
בני 65+ : ס"ה		
גיל		
42.8	51.2	46.5
26.3	34.9	30.0
קבוצת אוכלוסייה		
36.4	45.4	40.3
14.9	20.8	17.1
(29.1)	(32.1)	30.6
74.7	79.4	76.9
בני 20+		

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.5: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ובני 20+, 2002

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	בני 65+ : סה"כ
7.0	9.2	8.0	טוב מאוד
29.0	35.5	31.9	טוב
40.8	39.4	40.2	לא כל כך טוב
23.1	15.9	20.0	בכלל לא טוב
100.0	100.0	100.0	בני 20+ : סה"כ
39.4	44.6	41.9	טוב מאוד
35.2	34.7	35.0	טוב
18.6	15.0	16.9	לא כל כך טוב
6.7	5.7	6.2	בכלל לא טוב

מקור: למ"ס, הסקר החברתי

לוח 2.6: בני 65+ העוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים		
נשים	גברים	סה"כ
31.4	41.0	35.6
כלל בני 65+		
גיל		
35.5	47.3	40.6
בני 74-65		
31.9	35.7	33.6
בני 79-75		
18.6	26.5	21.9
בני 80+		
קבוצת אוכלוסייה		
33.2	43.5	37.6
יהודים ואחרים ⁽¹⁾		
29.9	48.9	37.3
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽²⁾		
..	(5.3)	3.0
אוכלוסייה ערבית		
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾		
50.2	45.1	48.0
ישראל		
19.6	30.3	24.5
אסיה-אפריקה		
36.8	49.4	42.1
אירופה-אמריקה		

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.7: בני 65+ העוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית, לפי סוג הפעילות, ולפי מין, גיל ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים

שחיה		רכיבה על אופניים		התעמלות או ריקוד		הליכה		
מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	מתוך העוסקים בפעילות גופנית	מתוך כל בני 65+	
15.2	5.4	8.0	2.8	45.2	16.0	66.5	23.6	כלל בני 65+
מין								
16.1	6.6	11.7	4.8	34.0	13.8	73.4	30.0	גברים
14.3	4.4	4.3	1.3	56.3	17.6	59.6	18.7	נשים
גיל								
18.1	7.3	8.7	3.5	45.0	18.2	67.8	27.5	בני 65-74
9.6	3.2	7.1	2.4	39.3	12.9	68.9	23.1	בני 75-79
(7.3)	(1.6)	(5.1)	(1.1)	55.3	12.1	55.3	12.0	בני 80+
יבשת לידה של יהודים ואחרים*								
26.0	12.5	(12.3)	(5.9)	52.7	25.0	59.7	28.7	ישראל
11.2	2.7	10.7	2.6	50.3	12.3	61.0	14.9	אסיה-אפריקה
14.8	6.2	6.7	2.8	43.1	18.0	68.7	28.8	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.8: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר מעשנים סיגרייה אחת לפחות ביום, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

אחוזים			
	נשים	גברים	סה"כ
כלל האוכלוסייה	15.4	34.0	24.1
כלל בני +65	5.2	13.1	8.6
בני 65-74	6.9	16.7	11.1
בני +75	2.7	7.8	4.9
קבוצת אוכלוסייה			
יהודים ואחרים ⁽¹⁾	5.3	12.4	8.4
אוכלוסייה ערבית	..	24.0	13.1
יבשת לידה של יהודים			
ישראל			14.1
אסיה			12.8
אפריקה			8.4
אירופה-אמריקה			7.5
בריה"מ לשעבר ⁽²⁾			4.6

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.9: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות MRI ו-CT או קיבלו חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

שיעורים ל-1,000 נפש

חיסון נגד שפעת	CT	MRI	
90	55	11	כלל האוכלוסייה
447	163	25	כלל בני +65
			מין
473	173	31	גברים
427	155	19	נשים
			גיל
414	153	22	בני 65-74
496	177	28	בני +75
			קבוצות אוכלוסייה
449	161	25	יהודים ואחרים ⁽¹⁾
405	183	..	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾
515	163	..	ישראל
444	157	(26)	אסיה
487	116	30	אפריקה
533	183	(30)	אירופה-אמריקה
230	149	(16)	בריה"מ לשעבר ⁽²⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.10: נשים בנות +65 ובנות +40 אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

שיעורים ל-1,000 נשים

שיעורים ל-1,000 נשים	
298	בנות +65
305	בנות +40
	גיל
382	בנות 65-74
(172)	בנות +75
	קבוצת אוכלוסייה
309	יהודיות ואחרות ⁽¹⁾
(121)	אוכלוסייה ערבית
	יבשת לידה של יהודיות ואחרות⁽¹⁾
468	ישראל
255	אסיה
230	אפריקה
361	אירופה-אמריקה
222	בריה"מ לשעבר ⁽²⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודיות, נוצריות שאינן ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודיות

לוח 2.11: בני +65 וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה, רופא מומחה או רופא שיניים בשבועיים אחרונים, לפי מין, גיל ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

אחוזים

רופא משפחה ומומחה	רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
18.7	14.9	5.0	6.8	כלל האוכלוסייה
38.3	32.0	9.7	5.9	כלל בני +65
מין				
34.6	28.6	9.2	6.4	גברים
41.2	34.6	10.0	5.5	נשים
גיל				
38.0	31.2	10.4	6.8	בני 65-74
38.9	33.4	8.6	4.5	בני +75
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾				
34.1	24.0	11.1	8.2	ישראל
40.1	35.2	7.4	7.0	אסיה
40.3	36.9	6.3	(4.9)	אפריקה
40.5	32.3	12.3	6.4	אירופה-אמריקה
34.0	29.5	8.4	3.6	בריה"מ לשעבר ⁽²⁾

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.12: ביקורים של בני +65, של בני +75 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא בשנה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

ממוצע לנפש

רופא משפחה	רופא מומחה	רופא שיניים	
בני +65			
11.5	3.6	2.5	סה"כ
10.6	3.4	2.7	גברים
12.1	3.7	2.3	נשים
קבוצות אוכלוסייה			
11.1	3.6	2.5	יהודים ואחרים*
17.2	..	(2.0)	אוכלוסייה ערבית
בני +75			
11.5	3.0	2.0	סה"כ
10.9	2.7	2.1	גברים
12.0	3.2	2.0	נשים
כלל האוכלוסייה			
5.3	1.8	2.6	סה"כ
4.8	1.4	2.1	גברים
5.7	2.3	3.1	נשים

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.13: ביקורים של בני +65 אצל רופא מתוך סך הביקורים (של כלל האוכלוסייה), אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000, לפי התמחות הרופא ומין

אחוזים				
	נשים	גברים	סה"כ	
	10.5	7.3	17.8	סה"כ*
רופא משפחה	13.0	8.6	21.5	
רופא מומחה	11.4	8.0	19.4	
רופא שיניים	4.9	4.5	9.4	

מקור: למ"ס, סקר בריאות, 1999/2000
* לא כולל רופא שיניים

לוח 2.14: בני +65 שדיווחו על בעיות ראייה, שמיעה ולעיסה⁽¹⁾, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
	בעיות לעיסה	בעיות שמיעה	בעיות ראייה
כלל בני +65	31.4	27.9	34.3
מין			
גברים	28.7	31.1	27.6
נשים	33.3	25.5	39.3
גיל			
בני 65-74	29.1	21.7	29.6
בני 75-79	32.8	27.7	35.5
בני 80+	36.7	47.5	47.4
קבוצת אוכלוסייה			
יהודים ואחרים ⁽²⁾	30.5	28.0	33.5
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾	34.8	32.4	39.0
אוכלוסייה ערבית	45.0	18.7	44.4
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽²⁾			
ישראל	17.1	17.7	21.3
אסיה-אפריקה	42.0	30.1	42.0
אירופה-אמריקה	27.1	29.1	31.5

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. בעיות ראייה: קשיים בראייה מרחוק ו/או מקרוב (גם כאשר מרכיבים משקפיים)
בעיות שמיעה: קשיים בשמיעה (גם כאשר משתמשים במכשיר שמיעה)
בעיות לעיסה: קשיים באכילה עם שיניים תותבות או בעיות בלעיסה למי שאין להם שיניים תותבות
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.15: בני +65 שדיווחו על אי שליטה על סוגר השתן⁽¹⁾, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
	נשים	גברים	סה"כ
כלל בני +65	19.3	12.7	16.5
גיל			
בני 65-74	12.8	8.1	10.8
בני 75-79	19.6	14.2	17.2
בני 80+	39.1	25.8	33.4
קבוצת אוכלוסייה			
יהודים ואחרים ⁽²⁾	19.7	12.6	16.6
מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾	20.2	12.7	17.2
אוכלוסייה ערבית	13.9	12.6	13.3
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽²⁾			
ישראל	9.5	6.5	8.2
אסיה-אפריקה	24.4	17.4	21.2
אירופה-אמריקה	18.9	11.3	15.7

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

- קורה שיש להם בריחת שתן או שאינם מספיקים להגיע לשירותים
- כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
- שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.16א: גברים בני +65 וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן
אצלם אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה
אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000**

שיעורים ל-1,000 גברים

	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה	
יהודים ואחרים*					
	369	368	377	90	יתר-לחץ דם
	211	205	208	35	אוטם שריר הלב
	134	96	111	23	מחלת לב אחרת
	54	7	שבץ מוח
	130	167	152	33	סוכרת
	46	43	אסתמה
	42	15	מחלת ריאה
	109	99	103	31	כיב במערכת העיכול
	59	48	53	9	מחלה ממארת (סרטן)
אוכלוסייה ערבית					
	(172)	282	237	25	יתר-לחץ דם
	..	(173)	(176)	19	אוטם שריר הלב
	(167)	..	(96)	13	מחלת לב אחרת
	(308)	231	263	27	סוכרת

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

**לוח 2.16: נשים בנות +65 וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן
אצלן אי-פעם מחלות שונות, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה
אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000**

שיעורים ל-1,000 נשים

	75+	74-65	65+	כלל האוכלוסייה	
יהודיות ואחרות*					
	476	430	449	113	יתר-לחץ דם
	109	84	95	16	אוטם שריר הלב
	133	98	112	28	מחלת לב אחרת
	39	6	שבץ מוח
	143	155	150	37	סוכרת
	45	28	58	38	אסתמה
	52	15	מחלת ריאה
	104	89	95	29	כיב במערכת העיכול
	65	54	58	16	מחלה ממארת (סרטן)
אוכלוסייה ערבית					
	444	432	436	41	יתר-לחץ דם
	..	(144)	(143)	10	אוטם שריר הלב
	..	(135)	(129)	11	מחלת לב אחרת
	(248)	345	317	34	סוכרת
	..	(141)	(111)	14	כיב במערכת העיכול

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000
* כולל: יהודיות, נוצריות שאין ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.17: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2001

סוף שנה

85+	84-80	79-75	74-70	69-65	65+	
						מספרים מוחלטים
1,716	1,823	2,993	3,164	2,796	12,492	סה"כ בני 65+
853	930	1,528	1,686	1,464	6,461	גברים
863	893	1,465	1,478	1,332	6,031	נשים
						שיעורים ל- 100,000 נפש
2,456	2,446	2,078	1,781	1,414	1,761	סה"כ בני 65+
3,086	2,970	2,548	2,222	1,642	2,134	גברים סה"כ
166	160	105	88	64	91	מזה: קיבה
593	626	437	349	241	352	מעג גס וחלחולת
203	239	268	256	183	221	ריאה
604	527	534	530	388	475	ערמונית
329	294	262	230	157	215	שלפוחית השתן
72	121	77	76	61	73	לימפומה ממארת
134	73	78	57	39	59	ליקמיה
2,044	2,065	1,743	1,452	1,226	1,482	נשים סה"כ
83	97	74	50	38	54	מזה: קיבה
391	377	314	235	178	243	מעג גס וחלחולת
111	106	93	87	68	83	ריאה
360	416	366	356	339	355	שד
26	32	40	38	35	36	שחלה
54	55	58	35	28	38	שלפוחית השתן
76	76	96	66	57	68	לימפומה ממארת
50	65	62	49	28	43	ליקמיה

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות

לוח 2.18: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני +65, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, 2001-1997

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

2001	2000	1999	1998	1997	
2,134	2,114	2,165	2,175	2,017	גברים סה"כ
2,180	2,177	2,217	2,230	2,068	יהודים ואחרים* סה"כ
94	104	98	115	95	מזה: קיבה
366	364	401	378	346	מעג גס וחלחולת
215	214	222	221	234	ריאה
489	448	451	478	447	ערמונית
219	219	242	239	219	שלפוחית השתן
73	94	102	89	82	לימפומה ממארת
60	71	43	53	50	ליקמיה
1,426	1,192	1,361	1,352	1,267	ערבים סה"כ
49	48	69	30	64	מזה: קיבה
140	124	175	136	129	מעג גס וחלחולת
309	232	312	289	347	ריאה
249	209	182	225	181	ערמונית
159	95	141	153	118	שלפוחית השתן
69	58	48	51	57	לימפומה ממארת
42	60	21	44	16	ליקמיה
1,482	1,509	1,508	1,508	1,401	נשים סה"כ
1,524	1,557	1,554	1,554	1,442	יהודיות ואחרות* סה"כ
56	52	42	50	50	מזה: קיבה
251	267	273	261	233	מעג גס וחלחולת
86	83	82	80	74	ריאה
365	428	409	434	396	שד
37	39	40	44	40	שחלה
39	40	47	46	36	שלפוחית השתן
69	67	72	77	56	לימפומה ממארת
44	38	34	29	24	ליקמיה
735	725	743	697	724	ערביות סה"כ
22	27	31	18	47	מזה: קיבה
84	103	96	140	59	מעג גס וחלחולת
26	19	47	54	35	ריאה
169	121	196	123	109	שד
14	28	25	23	15	שלפוחית השתן
52	42	49	47	56	לימפומה ממארת

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.19: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים*
בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2001

סוף שנה

75+	74-70	69-65	65+	
מספרים מוחלטים				
6,388	3,046	2,674	12,108	סה"כ יהודים ואחרים בני 65+
3,221	1,606	1,395	6,222	גברים
3,167	1,440	1,279	5,886	נשים
שיעורים ל-100,000 נפש				
גברים				
2,086	1,630	1,738	1,807	ילידי ישראל
3,054	2,719	1,743	2,397	ילידי אירופה-אמריקה
2,469	1,617	1,754	1,919	ילידי אסיה
2,784	2,018	1,878	2,177	ילידי אפריקה
נשים				
1,558	1,554	1,532	1,546	ילידות ישראל
2,011	1,862	1,353	1,687	ילידות אירופה-אמריקה
1,482	1,164	1,131	1,241	ילידות אסיה
1,504	1,016	1,090	1,187	ילידות אפריקה

מקור: רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות
* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.20: אומדן בני +65 יהודים ואחרים⁽¹⁾ הסובלים מדמנטיה, 2002

סוף שנה

במוסדות ⁽²⁾	בקהילה	סה"כ	
18.7	98.1	116.8	אלפים
16.0	84.0	100.0	אחוזים
69.8	16.7	19.0	אחוז מתוך האוכלוסייה המתאימה

מקור: ברודסקי, ג'; ורטמן, א'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2004, קשישים הסובלים מדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, גוינט-מכון ברוקדייל (בהכנה)

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת (ראו מבוא)
2. כולל: בתי אבות, בתי חולים לחולים כרוניים ומחלקות סיעודיות

לוח 2.21: אומדן בני +65 יהודים ואחרים⁽¹⁾ הגרים בקהילה אשר סובלים מדמנטיה, לפי חומרת המחלה, גיל ומין, 2002

סוף שנה

רמת החומרה של המחלה				סה"כ חולים	
קשה	בינונית	קלה	סה"כ ⁽²⁾		
27.5	22.1	43.2	92.9	98.1	אלפים
					אחוזים
מתוך החולים בדמנטיה				מתוך האוכלוסייה המתאימה	
				גיל	
30.0	24.0	47.0	100.0	16.7	בני +65
34.0	28.0	39.0	100.0	23.8	בני +75
27.0	9.0	64.0	100.0	9.7	65-69
18.0	22.0	59.0	100.0	12.6	70-74
41.0	23.0	36.0	100.0	19.2	75-79
12.0	42.0	47.0	100.0	17.4	80-84
39.0	24.0	37.0	100.0	46.6	בני +85
					מין
28.0	28.0	44.0	100.0	13.6	גברים
31.0	22.0	48.0	100.0	19.0	נשים

מקור: ברודסקי, ג'; ורטמן, א'; קינג, י'; בנטור, נ'; צ'חמיר, ס'. 2004, קשישים הסובלים מדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים, ג'וינט-מכון ברוקדייל (בהכנה)

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ובלתי מסווגים לפי דת (ראו מבוא)
2. הנתונים לגבי חומרת המחלה מתייחסים ל-95% מבני +65 הגרים בקהילה שעבורם התקבל דיווח בנוגע לכך

לוח 2.22: אומדנים של מידת יכולתם של בני 65+ הגרים בקהילה לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה, 2003

אחוזים, סוף שנה

סה"כ	יכול ללא קושי	יכול אך בקושי	לא יכול	
100.0	79.2	14.3	6.5	להתלבש
100.0	75.1	13.7	11.2	להתקלח או להתרחץ
100.0	91.6	5.8	2.6	לאכול
100.0	81.2	15.0	3.8	להיכנס למיטה ולצאת ממנה
100.0	80.9	15.2	3.9	להתיישב על כיסא ולקום ממנו

מקור: משאב-מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה, אומדן לשנת 2003 מבוסס על נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

לוח 2.23: אומדנים של מידת הניידות של בני 65+ הגרים בקהילה, 2003

אחוזים, סוף שנה

סה"כ	מסוגל להיות נייד/לניידות			
	בעזרת מכשיר (מקל, הליכון)	בעזרת אדם או מכשיר	בעזרת אדם אחר או יושב בכיסא גלגלים	
100.0	71.8	7.5	7.7	ניידות מחוץ לבית*
100.0	95.5	2.6	1.8	ניידות בתוך הבית

מקור: משאב-מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה, אומדן לשנת 2003 מבוסס על נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

* יכולת ללכת (להסתובב) מרחק של 400 מטר

**לוח 2.24: אומדן בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות
(ADL)⁽¹⁾, 2003**

אחוזים, סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
19.1	11.8	16.0	כלל בני 65+
			גיל
7.8	4.9	6.5	בני 65-74
14.2	10.8	12.9	בני 75-79
47.0	30.2	40.3	בני 80+
			קבוצת אוכלוסייה
17.8	11.2	15.0	יהודים ואחרים ⁽²⁾
19.4	10.1	15.8	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
39.8	19.9	30.7	אוכלוסייה ערבית
			יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽²⁾
20.8	14.2	17.9	אסיה-אפריקה
16.7	9.9	13.9	אירופה-אמריקה וישראל

מקור: משאב-מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה, אומדן לשנת 2003 מבוסס על נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל שתי אוכלוסיות:
(א) קשישים הגרים בקהילה הזקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, ניידות בתוך הבית;
(ב) קשישים דיירי מוסדות לטיפול ממושך: תשושים סיעודיים ותשושי נפש
2. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
3. שעלו משנת 1990 ואילך

**לוח 2.25: אומדן בני 65+ המוגבלים בביצוע הפעולות היומיומיות
(ADL), 1990-2003**

סוף שנה

אחוז המוגבלים מתוך בני 65+ ⁽¹⁾	אחוזים	אלפים	
			1990
13.2	100.0	58.3	סה"כ מוגבלים
11.0	80.1	46.7	בקהילה ⁽²⁾
67.2	19.9	11.6	במוסדות לטיפול ממושך ⁽³⁾
			1999
14.5	100.0	88.4	סה"כ מוגבלים
11.8	78.1	69.0	בקהילה ⁽²⁾
77.7	21.9	19.4	במוסדות לטיפול ממושך ⁽³⁾
			2003
16.0	100.0	107.0	סה"כ מוגבלים
12.6	76.0	81.2	בקהילה ⁽²⁾
93.7	24.0	25.7	במוסדות לטיפול ממושך ⁽³⁾

מקור: משאב-מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה, אומדן לשנת 2003 מבוסס על נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. מתוך האוכלוסייה המתאימה
2. זקוקים לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלה: רחצה, הלבשה, אכילה, ישיבה וקימה מהכיסא, כניסה ויציאה מהמיטה, ניידות בתוך הבית
3. דיירים תשושים, סיעודיים ותשושי נפש

לוח 2.26: בני 65+ בקהילה אשר נפלו במהלך חצי השנה האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה - נתוני סקר בני 60 ומעלה, 1997

אחוזים			
נשים	גברים	סה"כ	
23.9	14.0	19.6	כלל בני 65+
גיל			
19.8	9.0	15.1	בני 65-74
26.5	15.6	21.7	בני 75-79
33.7	27.9	31.2	בני 80+
קבוצת אוכלוסייה			
24.4	14.3	20.1	יהודים ואחרים ⁽¹⁾
23.4	10.3	18.3	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽²⁾
15.0	8.1	11.8	אוכלוסייה ערבית
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾			
18.9	12.8	16.2	ישראל
30.6	19.6	25.6	אסיה-אפריקה
22.5	12.1	18.2	אירופה-אמריקה

מקור: למ"ס, סקר בני 60 ומעלה, 1997

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.27: בני +65 שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין
והנפגע, 2003

מספרים מוחלטים

פצועים קל	פצועים קשה	הרוגים	סה"כ	
בני +65				
1,439	286	82	1,807	סה"כ
843	131	51	1,025	גברים
596	155	31	782	נשים
בני 74-65				
926	145	42	1,113	סה"כ
560	70	27	657	גברים
366	75	15	456	נשים
בני +75				
513	141	40	694	סה"כ
283	61	24	368	גברים
230	80	16	326	נשים
בני +65 לפי הנפגע				
405	186	60	651	הולך רגל
526	34	8	568	נהג רכב
470	42	8	520	נוסע ברכב
38	24	6	68	אחר

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים

לוח 2.28: בני +65 וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2003

שיעורים ל-100,000 נפש

פצועים קשה	פצועים קל	הרוגים	סה"כ	
				בני +65
217	43	12	273	סה"כ
299	46	18	363	גברים
157	41	8	205	נשים
				בני 65-74
255	40	12	306	סה"כ
346	43	17	406	גברים
181	37	7	226	נשים
				בני +75
172	47	13	232	סה"כ
235	51	20	306	גברים
129	45	9	182	נשים
				קבוצת אוכלוסייה*
166	44	13	222	יהודים
271	29	10	310	ערבים
				כלל האוכלוסייה
512	36	7	554	סה"כ
642	49	10	701	גברים
384	24	4	412	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; שנתון סטטיסטי * שנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.29: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש

מזה: הרוגים		סה"כ נפגעים		
כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	
9	24	442	378	1985
9	23	594	459	1990
9	23	818	408	1996
9	21	814	385	1997
9	21	826	379	1998
8	18	743	363	1999
8	12	584	219	2001
8	16	581	290	2002
7	12	554	273	2003

מקור: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.30: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2003

חומרת התאונות				
קלות	קשות	קטלניות	סה"כ	
1,338	142	36	1,516	מספרים מוחלטים
				סה"כ בני 65+
				גיל
960	100	27	1,087	בני 65-74
378	42	9	429	בני 75+
				מין
1,148	128	31	1,307	גברים
190	14	5	209	נשים
				כלל הנהגים
30,133	3,004	635	33,772	סה"כ ⁽¹⁾
22,336	2,502	553	25,391	גברים
6,685	433	60	7,178	נשים
				שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾
				בני 65+
73	8	2	82	סה"כ
84	9	2	96	גברים
40	3	1	44	נשים
				כלל הנהגים
103	10	2	116	סה"כ
126	14	3	143	גברים
58	4	1	63	נשים

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מצבת הנהגים בישראל

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2002 ובסוף 2003

לוח 2.31: ביקורים בחדרי מיון* של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, 2002

שיעור ביקורים ל-1,000 נפש	אחוז הביקורים של בני +65 מתוך כלל הביקורים		מספר ביקורים	
	644	17.0		
				כלל בני +65
				גיל
524	7.2	176,151		בני 65-74
766	6.8	167,089		בני 75-84
1,139	3.0	73,272		בני +85
380		2,452,101		כלל האוכלוסייה

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)
 * מבוסס על דיווח 28 חדרי מיון בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים כוללים את הביקורים בכל חדרי המיון במוסדות לאשפוז כללי פרט לביקורים במיון בבתי חולים במזרח ירושלים

לוח 2.32: סיבות כניסה לחדרי מיון* של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2002

אחוזים

אחוז מכלל הסיבות		סה"כ	
סיבות חיצוניות	מחלות		
			סה"כ
10.7	89.3	100.0	כלל בני +65
11.3	88.7	100.0	בני 74-65
9.8	90.2	100.0	בני 84-75
11.1	88.9	100.0	בני +85
27.9	72.1	100.0	כלל האוכלוסייה
			גברים
9.5	90.5	100.0	כלל בני +65
10.6	89.4	100.0	בני 74-65
8.3	91.7	100.0	בני 84-75
9.3	90.7	100.0	בני +85
36.0	64.0	100.0	כלל האוכלוסייה
			נשים
11.7	88.3	100.0	כלל בני +65
12.1	87.9	100.0	בני 74-65
11.0	89.0	100.0	בני 84-75
12.4	87.6	100.0	בני +85
18.8	81.2	100.0	כלל האוכלוסייה

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)
 * מבוסס על דיווח של 19 בתי חולים בבעלות ממשלתית, עירונית ממשלתית ובעלותה של שירותי בריאות כללית

לוח 2.33: ביקורים בחדרי מיון* עקב סיבות חיצוניות של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2002

אחוזים

פגיעה לא מכוונת/ כוונה לא ברורה	פגיעה מכוונת	פעולת איבה	תאונות עבודה	תאונות דרכים	סה"כ	
84.6	1.9	0.3	1.8	11.4	100.0	כלל בני +65
75.5	2.7	0.4	3.6	17.8	100.0	בני 74-65
89.0	1.5	0.2	0.7	8.6	100.0	בני 84-75
96.6	0.9	0.1	0.0	2.4	100.0	בני +85
60.0	3.7	0.5	10.8	25.0	100.0	כלל האוכלוסייה

מקור: פרסום "ביקורים בחדרי מיון, 2002" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)
* מבוסס על דיווח של 19 בתי חולים בבעלות ממשלתית, עירונית ממשלתית ובעלותה של שירותי בריאות כללית

לוח 2.34: בני+65 אשר אושפזו בשנה האחרונה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

אחוזים			
	נשים	גברים	סה"כ
כלל בני +65	22.1	25.7	23.7
גיל			
בני 65-74	18.8	23.9	21.0
בני 75+	27.2	28.5	27.0
קבוצת אוכלוסייה			
יהודים ואחרים ⁽¹⁾	21.7	25.2	23.2
אוכלוסייה ערבית	28.9	34.6	31.4
יבשת לידה של יהודים ואחרים⁽¹⁾			
ישראל	15.6	20.4	17.8
אסיה	22.1	26.5	24.1
אפריקה	25.7	27.9	26.7
אירופה-אמריקה	23.5	25.8	24.5
בריה"מ לשעבר ⁽²⁾	18.8	23.7	20.7

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. שעלו משנת 1990 ואילך, כולל לא-יהודים

לוח 2.35: אשפוזים⁽¹⁾ של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות כלליות, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

2002	2001	2000 ⁽²⁾	1995	1990	
					בני +65
542.5	546.3	527.2	482.5	407.0	סה"כ
625.9	628.5	608.9	567.4	470.9	גברים
480.7	485.5	466.8	418.1	354.3	נשים
					בני 65-74
					סה"כ
423.3	432.8	419.7	402.1	342.2	גברים
502.4	508.4	495.7	478.7	400.8	נשים
360.3	373.1	360.2	342.9	294.3	
					בני +75
					סה"כ
688.6	687.2	664.4			גברים
792.5	791.2	763.8			נשים
618.5	616.5	595.7			
					בני 75-84
					סה"כ
627.6	632.0	608.6	572.7	477.4	גברים
725.9	729.0	706.8	673.0	548.1	נשים
559.3	564.0	538.8	498.8	419.3	
					בני +85
					סה"כ
900.2	867.7	839.5	716.9	586.4	גברים
1,041.7	1,010.3	955.9	825.7	671.2	נשים
813.6	779.5	765.9	638.3	520.5	
					כלל האוכלוסייה
					סה"כ
155.0	156.4	150.4	144.1	123.3	גברים
154.6	155.6	150.5	142.0	121.8	נשים
155.4	157.2	150.4	145.7	124.8	

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים בבתי חולים לאשפוז כללי, 1995

- שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד
- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכל כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)

לוח 2.36: אשפוזים⁽¹⁾ של בני 65+ במחלקות כלליות מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

אחוזים					
2002	2001	2000 ⁽²⁾	1995	1990	
בני 65+					
34.5	34.2	34.3	31.9	30.0	סה"כ
34.4	34.1	34.2	33.1	31.8	גברים
34.6	34.3	34.4	30.9	28.2	נשים
בני 75+					
19.7	19.2	19.0	15.9	15.4	סה"כ
18.5	18.2	18.1	16.1	16.1	גברים
20.7	20.1	19.9	15.8	14.7	נשים
בני 85+					
5.8	5.7	5.8	4.1	3.0	סה"כ
5.1	5.1	5.2	4.0	3.1	גברים
6.4	6.2	6.4	4.1	3.0	נשים

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

- שחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד
- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכל כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)

לוח 2.37: בני +65 מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות

אחוזים

2002	2001	⁽¹⁾ 2000	1995	1990	
34.5	34.2	34.3	31.9	30.0	כלל המחלקות הכלליות ⁽²⁾
58.9	58.2	58.3	57.9	55.2	פנימית
45.9	45.8	45.9	48.0	46.4	ריאות
96.4	96.2	95.9	91.8	79.4	גריאטרייה אקוטית
33.5	32.7	34.1	34.9	33.7	נירולוגיה
38.4	37.5	38.2	38.0	38.5	אונקולוגיה
29.9	32.3	32.1	33.7	31.1	עור ומין
6.4	4.4	4.0			השתלת מוח עצם
49.3	48.3	47.0	47.2	43.8	טיפול נמרץ כללי
49.7	50.4	50.2	45.3	44.4	טיפול נמרץ לב
73.5	71.8	73.9	52.7	47.2	טיפול נמרץ נשימתי
26.5	26.5	27.0	27.5	26.2	כירורגייה כללית
32.8	33.0	32.4	30.0	25.2	אורתופדיה
41.8	40.7	40.3	40.4	41.7	אורולוגיה
29.9	27.9	28.8	22.6	23.7	נירוכירורגייה
49.3	47.9	47.4	43.8	36.4	כירורגייה חזה ולב
56.4	57.0	56.2	49.4	45.8	כירורגייה כלי דם
29.5	29.1	28.2	15.1	22.0	כירורגייה פלסטית
60.3	60.0	58.3	55.5	56.4	עיניים
13.0	12.4	12.8	10.6	10.0	אף-אוזן-גרון
13.1	12.9	11.8	14.8	15.1	פה ולסת
4.7	4.5	4.1	5.5	4.0	נשים
31.9	33.8	36.3	38.9	39.7	השהיה

מקורות: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"; למ"ס, עיבוד מתוך קובץ אשפוזים 1995

- הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכל כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
- לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות

לוח 2.38: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2002⁽¹⁾

אחוזים

נשים	גברים	סה"כ	
100.0	100.0	100.0	סה"כ מחלקות כלליות ⁽²⁾
54.6	52.6	53.6	פנימית
0.4	0.5	0.4	ריאות
5.1	3.7	4.4	גריאטרייה אקוטית
1.4	1.6	1.5	נירולוגיה
1.0	1.3	1.1	אונקולוגיה
0.4	0.4	0.4	עור ומין
0.0	0.0	0.0	השתלת מוח עצם
1.4	1.6	1.5	טיפול נמרץ כללי
2.6	4.2	3.4	טיפול נמרץ לב
0.1	0.1	0.1	טיפול נמרץ נשימתי
11.6	12.3	12.0	כירורגייה כללית
6.2	3.2	4.8	אורתופדיה
1.4	6.0	3.7	אורולוגיה
0.5	0.6	0.5	נירוכירורגייה
1.2	2.1	1.6	כירורגייה חזה ולב
1.0	1.9	1.4	כירורגייה כלי דם
0.6	0.8	0.7	כירורגייה פלסטית
5.2	3.9	4.6	עיניים
0.9	1.1	1.0	אף-אוזן-גרון
0.1	0.1	0.1	פה ולסת
2.2	0.0	1.1	נשים
2.3	1.8	2.1	השהיה

- מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"
 1. הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכל כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
 2. לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל יולדות

לוח 2.39: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי, 2002⁽¹⁾

ימים

כלל האוכלוסייה			בני +65			
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
4.3	4.5	4.4	5.9	5.7	5.8 ⁽²⁾	כלל המחלקות הכלליות
4.6	4.2	4.4	5.1	4.9	5.0	פנימית
9.0	12.0	10.7	9.1	8.9	8.9	ריאות
12.1	11.2	11.7	11.9	11.1	11.5	גריאטרייה אקוטית
6.0	6.1	6.1	7.8	7.9	7.9	נירולוגיה
6.8	6.0	6.4	8.6	7.3	7.9	אונקולוגיה
7.6	8.2	7.9	9.4	9.8	9.6	עור ומין
12.6	11.7	12.0	7.8	9.3	8.8	השתלת מוח עצם
5.8	6.2	6.0	6.6	7.0	6.8	טיפול נמרץ כללי
2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	טיפול נמרץ לב
9.1	8.0	8.5	10.0	8.6	9.3	טיפול נמרץ נשימתי
2.9	3.2	3.0	4.8	4.7	4.7	כירורגייה כללית
6.2	5.0	5.5	8.0	7.7	7.9	אורתופדיה
4.5	4.4	4.4	5.2	5.3	5.3	אורולוגיה
7.7	7.3	7.5	9.2	8.7	8.9	נירוכירורגייה
7.3	6.9	7.0	8.2	7.5	7.8	כירורגייה חזה ולב
4.7	5.3	5.1	5.4	5.6	5.6	כירורגייה כלי דם
5.7	6.5	6.1	7.6	5.3	6.3	כירורגייה פלסטית
2.7	2.9	2.8	2.5	2.6	2.6	עיניים
3.2	3.1	3.1	4.6	4.4	4.5	אף-אוזן-גרון
3.6	3.7	3.6	4.1	3.9	4.0	פה ולסת
2.4	1.2	2.4	4.1	1.0	4.1	נשים
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	השהיה

- מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב - "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים"
 1. הנתונים משנת 2000 ואילך מבוססים על "מאגר מידע מרכזי - אשפוזים" המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכל כלליות) ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז (לא רק בתי חולים לאשפוז כללי)
 2. לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, לא כולל שהייה במחלקות יולדות

לוח 2.40: בני 65+ וכלל האוכלוסייה הממתינים לאשפוז, לפי משך ההמתנה, אוקטובר 1999 - ספטמבר 2000

3 חודשים ויותר	2-1 חודשים	עד חודש	סה"כ	
אלפים				
6.6	(2.6)	7.1	16.7	כלל בני 65+
19.8	10.7	18.2	50.0	כלל האוכלוסייה
שיעורים ל-1,000 נפש				
11.0	(5.0)	12.0	29.0	כלל בני 65+
3.0	2.0	3.0	9.0	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבודים מתוך סקר בריאות, 1999/2000

לוח 2.41: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המטופלים⁽¹⁾ בטיפול אמבולטורי פסיכיאטרי⁽²⁾, לפי מין, 2002

סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
מספרים מוחלטים			
3,876	2,252	6,128	מטופלים בני 65+
22,280	25,380	47,660	מטופלים בכלל האוכלוסייה
אחוזים			
17.4	8.9	12.9	בני 65+ מכלל המטופלים
1.0	0.8	0.9	מטופלים בני 65+ מכלל בני 65+
0.7	0.8	0.7	כלל המטופלים מתוך האוכלוסייה

מקור: בריאות הנפש בישראל, שנתון סטטיסטי 2003 (פורסם באינטרנט)

1. אנשים שהיה להם לפחות מפגש אחד עם מטפל או עם גורם אחר במחצית השנייה של 2002
2. הנתונים מתייחסים למרפאות הממשלתיות הממוחשבות (דהיינו כל המרפאות הממשלתיות, מלבד אלה שנמצאות בבתי החולים הכלליים)

לוח 2.42: בני 65+ וכלל האוכלוסייה המאושפזים במסגרת טיפול יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2002

מספרים מוחלטים, סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
25	23	48	בני 65+
23	19	42	בני 65-74
2	4	6	בני 75-84
0	0	0	בני 85+
439	652	1,091	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.43: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז מלא פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2002

סוף שנה

נשים	גברים	סה"כ	
מספרים מוחלטים			
464	351	815	כלל בני 65+
263	256	519	בני 74-65
168	84	252	בני 84-75
33	11	44	בני 85+
1,862	2,957	4,819	כלל האוכלוסייה
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
1.2	1.3	1.2	כלל בני 65+
1.3	1.6	1.4	בני 74-65
1.2	0.9	1.1	בני 84-75
0.8	0.5	0.7	בני 85+
0.6	0.9	0.7	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.44: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+,
והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין,
שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש, סוף שנה

2002	2001	2000	1999	1998	1990	
						כלל בני 65+
1.2	1.4	1.5	2.0	2.3	3.5	סה"כ
1.3	1.3	1.4	1.9	2.1	3.1	גברים
1.2	1.4	1.5	2.0	2.4	3.9	נשים
						בני 65-74
1.4	1.5	1.7	2.1	2.5	3.6	סה"כ
1.6	1.6	1.7	2.3	2.5	3.7	גברים
1.3	1.5	1.6	2.0	2.4	3.5	נשים
						בני 75-84
1.1	1.2	1.3	1.8	2.0	3.6	סה"כ
0.9	0.9	1.0	1.5	1.7	2.3	גברים
1.2	1.4	1.5	2.0	2.3	4.5	נשים
						בני 85+
0.7	0.9	1.0	1.6	1.9	3.1	סה"כ
0.5	0.6	0.6	1.2	1.4	1.8	גברים
0.8	1.0	1.2	1.9	2.2	4.0	נשים
						כלל האוכלוסייה
0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.8	סה"כ
0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	2.1	גברים
0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.5	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.45: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה,
לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

2002	2001	2000	1999	1998	1997	1990	
							כלל בני 65+
1,707	1,751	1,867	1,814	1,983	1,869	1,412	סה"כ
669	636	641	643	674	652	526	גברים
1,038	1,115	1,226	1,171	1,309	1,217	886	נשים
							בני 65-74
1,049	1,062	1,117	1,111	1,272	1,246	892	סה"כ
436	401	408	391	442	440	321	גברים
613	661	709	720	830	806	571	נשים
							בני 75-84
583	587	621	568	594	498	467	סה"כ
199	195	186	179	171	157	181	גברים
384	392	435	389	423	341	286	נשים
							בני 85+
75	102	129	135	117	125	53	סה"כ
34	40	47	73	61	55	24	גברים
41	62	82	62	56	70	29	נשים
							כלל האוכלוסייה
18,264	17,869	18,172	17,640	17,210	16,181	12,262	סה"כ
10,844	10,594	10,632	10,350	9,971	9,331	6,788	גברים
7,420	7,275	7,540	7,290	7,239	6,850	5,474	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.46: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני +65, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2002

בני +85	בני 74-84	בני 65-74	בני +65	
מספרים מוחלטים				
75	583	1,049	1,707	סה"כ קבלות
6	100	408	514	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
3	17	35	55	הפרעות פסיכוטיות חריפות
26	258	395	679	הפרעות אפקטיביות
30	138	112	280	הפרעות אורגניות
2	27	35	64	הפרעות נירוטיות
0	5	14	19	הפרעות אישיות
0	2	4	6	סמים ואלכוהול
0	1	2	3	פיגור שכלי
7	31	41	79	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
1	4	3	8	לא רשום/לא ידוע
אחוזים				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ קבלות
8.0	17.2	38.9	30.1	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
4.0	2.9	3.3	3.2	הפרעות פסיכוטיות חריפות
34.7	44.3	37.7	39.8	הפרעות אפקטיביות
40.0	23.7	10.7	16.4	הפרעות אורגניות
2.7	4.6	3.3	3.7	הפרעות נירוטיות
0.0	0.9	1.3	1.1	הפרעות אישיות
0.0	0.3	0.4	0.4	סמים ואלכוהול
0.0	0.2	0.2	0.2	פיגור שכלי
9.3	5.3	3.9	4.6	גורמי פנייה אחרים (Z codes)
1.3	0.7	0.3	0.5	לא רשום/לא ידוע

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.47: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2002

נשים	גברים	סה"כ	
			מספרים מוחלטים
307	228	535	כלל בני 65+
136	111	247	בני 74-65
143	89	232	בני 84-75
41	30	71	בני 85+
1,783	2,450	4,233	כלל האוכלוסייה
			שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה
0.8	0.8	0.8	כלל בני 65+
0.7	0.7	0.7	בני 74-65
1.0	0.9	1.0	בני 84-75
1.0	1.2	1.1	בני 85+
0.5	0.7	0.6	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.48: פטירות של בני +65, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2002

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

אוכלוסייה ערבית		יהודים ואחרים ⁽¹⁾				סה"כ		סה"כ גברים נשים		
סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים	סה"כ גברים נשים		
בני +65										
44.2	54.8	49.1	41.4	50.9	45.7	42.3	50.7	45.9	שיעורים גולמיים	
55.7	60.2	57.9	40.2	52.3	46.2	40.9	52.8	46.8	שיעורים מתוקננים ⁽²⁾	
17.1	30.2	23.2	10.6	18.0	13.9	11.1	19.0	14.7	בני 65-69	
33.9	45.4	38.9	20.2	31.9	25.3	21.0	32.8	26.1	בני 70-74	
86.9	91.9	89.2	72.0	84.7	77.1	72.6	85.1	77.6	בני 75+	
55.5	65.0	59.5	35.6	49.5	41.2	36.5	50.3	42.1	בני 75-79	
92.8	82.3	88.0	64.3	76.8	69.5	65.4	77.1	70.3	בני 80-84	
178.1	148.0	160.7	158.2	180.9	166.6	158.8	178.7	166.4	בני 85+	

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. אוכלוסיית התקן היא ממוצע (גברים ונשים) של כלל האוכלוסייה בשנת 2002 לפי קבוצת גיל

לוח 2.49: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

אחוזים			
נשים	גברים	סה"כ	
1999			
67.7	69.7	68.6	בני 65+
70.0	69.9	70.0	בני 65-74
67.0	69.6	68.2	בני 75+
71.1	56.5	62.1	בני 0-64
68.3	66.2	67.2	כלל האוכלוסייה
2000			
67.3	69.8	68.5	בני 65+
71.6	69.8	70.6	בני 65-74
66.1	69.8	67.8	בני 75+
69.4	55.8	60.8	בני 0-64
67.6	65.9	66.8	כלל האוכלוסייה
2001			
66.7	68.6	67.6	בני 65+
70.3	68.7	69.4	בני 65-74
65.7	68.5	67.0	בני 75+
68.8	52.8	58.8	בני 0-64
67.0	64.3	65.6	כלל האוכלוסייה
2002			
66.6	68.5	67.5	בני 65+
69.9	67.6	68.6	בני 65-74
65.8	68.8	67.2	בני 75+
65.2	52.3	57.1	בני 0-64
66.4	64.0	65.2	כלל האוכלוסייה

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות * כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות

לוח 2.50: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני +65, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2002

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

בני +75	בני 65-74	בני +65	
			גברים ונשים
			סה"כ⁽²⁾
75	19	45	
78	18	41	אסיה
82	23	43	אפריקה
77	20	50	אירופה-אמריקה
66	19	40	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
			גברים
			סה"כ⁽²⁾
83	24	49	
83	22	45	אסיה
91	27	49	אפריקה
85	26	56	אירופה-אמריקה
73	27	44	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
			נשים
			סה"כ⁽²⁾
70	15	41	
74	15	39	אסיה
74	19	38	אפריקה
72	15	46	אירופה-אמריקה
63	14	36	מזה: עולות בריה"מ לשעבר ⁽³⁾

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל ילידי ישראל ויבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.51: סיבות פטירה של בני +65 ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2000

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני +65			סה"כ	
גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ		
581	618	599	4,390	5,293	4,774	סה"כ*	
19	19	19	153	168	159	מחלות זיהומיות	
139	143	141	877	1,227	1,026	שאתות ממאירות	
41	34	38	339	336	337	סוכרת	
12	8	10	104	78	93	יתר לחץ-דם	
28	34	31	237	304	266	אוטם חריף של שריר הלב	
53	68	60	461	696	561	מחלת לב איסכמית אחרת	
40	34	37	326	312	320	מחלות לב אחרות	
45	39	42	382	397	389	מחלות של כלי דם במוח	
6	7	6	45	57	50	מחלות אחרות של מחזור הדם	
11	11	11	97	116	105	דלקת ריאות	
19	22	20	159	228	188	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	
15	14	15	116	133	123	יתר מחלות מערכת הנשימה	
5	7	6	33	48	39	מחלות כבד	
17	21	19	139	215	172	מחלות כליה	
3	4	3	3	0	2	מומים מולדים	
20	30	25	154	205	176	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	
83	67	75	667	633	653	כל המחלות האחרות	
4	13	8	8	30	17	תאונות דרכים	
3	10	6	7	22	14	פגיעה עצמית מכוונת	
13	26	19	80	85	82	כל הסיבות החיצוניות האחרות	

מקור: למ"ס שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד
* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.52: פטירות וסיבות פטירה של בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה,
לפי גיל, 2000

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות במספרים מוחלטים*
בני +85	בני 74-84	בני 65-74	בני +65	האוכלוסייה	
10,492	11,430	7,396	29,318	37,685	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3.6	3.3	3.1	3.3	3.2	מחלות זיהומיות
13.0	22.3	32.3	21.5	23.5	שאתות ממאירות
5.5	7.5	8.7	7.1	6.3	סוכרת
2.5	1.9	1.3	2.0	1.7	יתר לחץ-דם
5.3	5.9	5.5	5.6	5.2	אוטם חריף של שריר הלב
13.3	11.7	9.6	11.8	10.1	מחלת לב איסכמית אחרת
7.8	6.5	5.4	6.7	6.2	מחלות לב אחרות
9.0	8.4	6.5	8.1	7.0	מחלות של כלי דם במוח
1.0	1.2	0.8	1.0	1.1	מחלות אחרות של מחזור הדם
3.1	2.0	1.3	2.2	1.8	דלקת ריאות
4.2	3.8	3.8	3.9	3.4	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.3	2.3	2.0	2.6	2.4	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.3	0.9	1.4	0.8	1.0	מחלות כבד
4.0	3.4	3.4	3.6	3.2	מחלות כליה
0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	מומים מולדים
4.0	3.5	3.6	3.7	4.2	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
17.4	13.3	8.8	13.7	12.5	כל המחלות האחרות
0.2	0.4	0.6	0.4	1.4	תאונות דרכים
0.1	0.3	0.5	0.3	1.1	פגיעה עצמית מכוונת
2.3	1.5	1.3	1.7	3.2	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: למ"ס שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד
* הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.52: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני +65 ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2000

סה"כ פטירות במספרים מוחלטים*	קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה
	בני 85+	בני 75-84	בני 65-74	בני +65	
19,158	4,362	5,468	4,040	13,870	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
3.1	3.8	2.9	2.8	3.2	מחלות זיהומיות
23.1	15.2	23.2	31.7	23.2	שאתות ממאירות
5.5	4.5	6.8	7.7	6.3	סוכרת
1.3	1.6	1.6	1.2	1.5	יתר לחץ-דם
5.5	5.3	6.0	5.9	5.7	אוטם חריף של שריר הלב
11.0	14.2	13.4	11.6	13.1	מחלת לב איסכמית אחרת
5.5	7.1	5.7	4.9	5.9	מחלות לב אחרות
6.3	8.1	7.8	6.4	7.5	מחלות של כלי דם במוח
1.1	0.8	1.4	1.0	1.1	מחלות אחרות של מחזור הדם
1.8	2.9	2.3	1.3	2.2	דלקת ריאות
3.6	4.8	4.0	4.2	4.3	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
2.3	3.5	2.2	1.9	2.5	יתר מחלות מערכת הנשימה
1.1	0.4	1.0	1.3	0.9	מחלות כבד
3.4	5.0	3.9	3.3	4.1	מחלות כליה
0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	מומים מולדים
4.9	4.1	3.4	4.2	3.9	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
10.8	15.7	11.9	8.1	12.0	כל המחלות האחרות
2.1	0.4	0.6	0.7	0.6	תאונות דרכים
1.6	0.3	0.5	0.5	0.4	פגיעה עצמית מכוונת
4.2	2.0	1.4	1.4	1.6	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: למ"ס שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.52: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +65 ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2000

קבוצת גיל				כלל	סה"כ פטירות במספרים מוחלטים*
85+	75-84	65-74	בנות +65	האוכלוסייה	
6,130	5,962	3,356	15,448	18,527	אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3.5	3.6	3.3	3.5	3.3	מחלות זיהומיות
11.4	21.4	33.0	20.0	23.9	שאתות ממאירות
6.1	8.1	10.0	7.7	7.1	סוכרת
3.1	2.2	1.4	2.4	2.1	יתר לחץ-דם
5.3	5.8	5.0	5.4	4.8	אוטם חריף של שריר הלב
12.6	10.2	7.2	10.5	9.1	מחלת לב איסכמית אחרת
8.3	7.3	6.1	7.4	6.9	מחלות לב אחרות
9.6	8.9	6.7	8.7	7.7	מחלות של כלי דם במוח
1.2	1.1	0.6	1.0	1.0	מחלות אחרות של מחזור הדם
3.1	1.8	1.3	2.2	1.9	דלקת ריאות
3.8	3.5	3.4	3.6	3.3	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.2	2.3	2.2	2.6	2.6	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.3	0.8	1.6	0.7	0.9	מחלות כבד
3.3	2.9	3.5	3.2	2.9	מחלות כליה
0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	מומים מולדים
3.9	3.5	2.8	3.5	3.4	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
18.6	14.7	9.8	15.2	14.3	כל המחלות האחרות
0.0	0.2	0.5	0.2	0.7	תאונות דרכים
0.0	0.2	0.5	0.2	0.5	פגיעה עצמית מכוונת
2.5	1.5	1.1	1.8	2.2	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: למ"ס שנתון סטטיסטי, עיבוד מיוחד * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות

לוח 2.53: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +65 בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

75+	בני 74-65	בני +65	כלל האוכלוסייה	
נובמבר 2000				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
76.4	72.0	73.9	56.3	שירותי בריאות כללית
11.9	14.6	13.4	23.1	מכבי שירותי בריאות
7.0	7.9	7.5	9.9	קופת חולים לאומית
4.8	5.5	5.2	10.7	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2001				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
75.5	70.8	72.9	55.6	שירותי בריאות כללית
12.5	15.5	14.1	23.5	מכבי שירותי בריאות
7.1	7.9	7.5	10.0	קופת חולים לאומית
4.9	5.8	5.4	10.9	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2002				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
74.9	69.4	71.9	55.2	שירותי בריאות כללית
12.9	16.4	14.8	23.7	מכבי שירותי בריאות
7.1	8.0	7.6	10.0	קופת חולים לאומית
5.1	6.2	5.7	11.1	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2003				
100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
74.3	68.2	71.0	54.9	שירותי בריאות כללית
13.2	17.3	15.5	23.9	מכבי שירותי בריאות
7.2	8.0	7.6	9.9	קופת חולים לאומית
5.3	6.5	5.9	11.4	קופת חולים מאוחדת

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.54: בני +65 מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות

אחוזים

קופת חולים מאוחדת	קופת חולים לאומית	מכבי שירותי בריאות	שירותי בריאות כללית	סה"כ	
4.1	7.2	4.9	13.1	10.2	דצמבר 1994
4.4	7.4	5.1	12.9	10.1	דצמבר 1995
4.4	7.3	5.2	13.0	10.0	נובמבר 1996
4.4	7.2	5.4	13.2	10.1	נובמבר 1997
4.6	7.4	5.5	13.2	10.0	נובמבר 1998
4.7	7.4	5.6	13.1	10.0	נובמבר 1999
4.8	7.5	5.8	13.1	10.0	נובמבר 2000
5.0	7.5	6.0	13.1	10.0	נובמבר 2001
5.2	7.7	6.3	13.1	10.1	נובמבר 2002
5.3	7.9	6.6	13.2	10.2	נובמבר 2003

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.55: בעלי ביטוח בריאות משלים וביטוחי בריאות נוספים בקרב בני 65+ ובכלל האוכלוסייה, לפי מין, שנים נבחרות

אחוזים

כלל האוכלוסייה			בני 65+			סה"כ	
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ		
(1) ביטוח בריאות משלים							
40.0	35.0	37.5	30.0	22.0	27.0	1997	
52.0	50.0	51.0	31.5	37.0	34.0	1999	
66.0	62.0	65.0	58.0	58.0	58.0	2001	
73.0	70.0	72.0	58.0	63.0	60.0	2003	
(2) ביטוח בריאות פרטי							
22.0	29.0	26.0	5.0	21.0	12.0	2001	
30.0	38.0	34.0	16.0	21.0	18.0	2003	
(3) ביטוח סיעודי פרטי							
27.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	2001	
26.0	26.0	26.0	28.0	37.0	32.0	2003	

מקורות: גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'. 2000. לקט נתונים על ביטוחי בריאות משלימים ומסחריים 1995-1999, ג'וינט-מכון ברוקדייל; גרוס, ר'; ברמלי-גרינברג, ש'. 2003. שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל, ג'וינט-מכון ברוקדייל; גרוס, א'; ברמלי-גרינברג, ש'; מצליח, ר'. 2004. דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות 2003 והשוואה לשנים קודמות. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל

1. תכניות לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) המשוקות למבוטחים של קופות החולים בידי הקופות, שהן מלכ"רים
2. ביטוחים המשוקים בידי חברות ביטוח, שהן למטרות רווח
3. ביטוח הסיעודי משוק כולו בידי חברות ביטוח. הנתונים לגבי הביטוח הסיעודי הם נתוני חסר, הכיסוי הביטוחי בפועל גדול יותר ממה שנמצא בנתוני הסקר, כנראה בגלל חוסר מודעות לקיום הביטוח